



آزمون ویژه ۲۱ فروردین ۱۴۰۵

دفترچه پاسخ

اختصاصی دوازدهم ریاضی

نام طراحان	نام درس	اختصاصی
کاظم اجلائی-سعید اکبرزاده-شاهین پروازی-روح اله حسنی-افشین خاصه-خان-سینا خیرخواه-محمد زنگنه علی شهبابی-حمید علیزاده-مهسان گودرزی-سیدسپهر متولیان-حامد معنوی-جهانبخش نیکنام	حسابان ۲	
امیرحسین ابومحبوب-عباس الهی-علی پسندیده-روح اله حسنی-سیدمحمدرضا حسینی-فرد-افشین خاصه-خان محمد خندان-مسعود درویشی-علی ساوجی-محمد شاه محمدی-علیرضا شریف خطیبی-حامد قاسمیان-درنا کربلایی مهرداد ملوندی-نیلوفر مهدوی-محمد ناری-ایبانه-سرژ یقیازاریان-تبریزی	هندسه ۳ و ریاضیات گسسته	
خسرو ارغوانی-فرد-بابک اسلامی-عبدالرضا امینی-نسب-زهره آقامحمدی-بیبا خورشید-محمدعلی راست پیمان بهنام رستمی-حامد طاهر خانی-سعید طاهری-بروجنی-مسعود قره خانی-مصطفی کیانی-مصطفی واثقی-شادمان ویسی	فیزیک ۳	
سمانه ابراهیم زاده-امیرحسین بختیاری-امیرعلی بیات-علیرضا بیانی-جعفر یازوکی-محمد رضا پورجاوید-کامران جعفری محمد رضا جمشیدی-امیر حاتمیان-حسن رحمتی-کوکنده-علی رضانی-هادی عبادی-محمد عظیمیان-زواره محمد فائز نیا-آرمین لنگری-امیرحسین مسلمی-هادی مهدی زاده	شیمی ۳	

گزینشگران و ویراستاران

نام درس	حسابان ۲	هندسه ۳ و ریاضیات گسسته	فیزیک ۳	شیمی ۳
گزینشگر	سیدسپهر متولیان	محمد خندان	حسام نادری	مجتبی محبوب
گروه ویراستاری	امیرحسین ابومحبوب مهرداد ملوندی	امیرحسین ابومحبوب مهرداد ملوندی	حسین بصیرت کعبور زهره آقامحمدی	احسان پنجه شاهی
ویراستاری رتبه های برتر	آرین غلامی سینا صالحی	آرین غلامی	سینا صالحی	آترین صبا
مسئول درس	سیدسپهر متولیان	محمد خندان	حسام نادری	مجتبی محبوب
مستندسازی	سمیه اسکندری	سجاد سلیمی	محمد رضا مهدوی	علیرضا نجفی
ویراستاران مستندسازی	معصومه صنعت کار-فرشته کمرانی-پارسا باتقوا-مهسا محمدنیا-سجاد سلیمی عرفان ترابی سجاد بهارلویی			

گروه فنی و تولید

مدیر گروه	مهرداد ملوندی
مسئول دفترچه	ترگس غنی زاده
گروه مستندسازی	مدیر گروه: محیا اصغری مسئول دفترچه: سجاد سلیمی
حروفنگار	فرزانه فتح اله زاده
ناظر چاپ	سوران نعیمی

گروه آزمون

بنیاد علمی آموزشی قلمچی (وقف عام)

دفتر مرکزی: خیابان انقلاب بین صبا و فلسطین - پلاک ۹۲۳ - کانون فرهنگی آموزش - تلفن: ۰۲۱-۶۴۶۳



حسابان ۲

گزینه «۳»

(کلام اهلایی)

توجه کنید که در یک همسایگی نقطه $x = \frac{3}{5}$ داریم: $[2x] = 1$. بنابراین

در این همسایگی، ضابطه تابع f برابر است با: $f(x) = mx - 5$

شیب خط $y = mx - 5$ برابر m است، پس $f'(\frac{3}{5})$ برابر m است. لذا

داریم: $m = 3m - 2 \Rightarrow m = 1$

(حسابان ۲- مشتق، صفحه‌های ۷۳ تا ۷۷)

گزینه «۲»

(جوانبش نیکنام)

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x-3}{f(x)-1} = \frac{1}{\lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x)-f(3)}{x-3}} = \frac{1}{f'(3)} = -4 \Rightarrow f'(3) = -\frac{1}{4}$$

یعنی شیب خط d_2 برابر $-\frac{1}{4}$ است. حال چون خط d_1 بر خط d_2 عمود

است، شیب d_1 یا به عبارت دیگر، مشتق تابع f در $x = 1$ برابر ۴ است، یعنی:

$f'(1) = 4$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x^3 - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} \times \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x^2 + x + 1}$$


$= f'(1) \times \frac{1}{3} = \frac{4}{3}$

(حسابان ۲- مشتق، صفحه‌های ۷۳ تا ۸۰)

گزینه «۳»

(سیرسپهر متولیان)

نمودار تابع به صورت شکل زیر است:



همانطور که دیده می‌شود تابع در نقاط به طول فرد گوشه‌ای است. دومین

نقطه گوشه‌ای با طول مثبت $x = 3$ است. پس نقطه مورد نظر $A(3, 1)$

است. شیب نیم مماس راست همان $f'_+(3)$ است.

$f'_+(3) = (1 + \cos(\frac{\pi}{2}x))' \Big|_{x=3} = -\frac{\pi}{2} \sin(\frac{\pi}{2}x) \Big|_{x=3} = \frac{\pi}{2}$

\Rightarrow معادله نیم مماس راست $y - 1 = \frac{\pi}{2}(x - 3)$

عرض از مبدأ $x=0 \rightarrow y = 1 - \frac{3\pi}{2}$

(حسابان ۲- مشتق، صفحه‌های ۸۴ تا ۸۹)

گزینه «۴»

(انجمن فاضله‌شان)

شرط لازم برای مشتق‌پذیری، پیوستگی است؛ بنابراین تابع f باید در $x = 1$ پیوسته باشد.

$$\begin{cases} \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} (ax + b) = a + b \\ f(1) = \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} (x^2 + (2-b)x + 3) = 6 - b \end{cases}$$

پیوستگی $\rightarrow a + b = 6 - b \Rightarrow a + 2b = 6$ (۱)

برای مشتق تابع f نیز داریم: $f'(x) = \begin{cases} a & ; x < 1 \\ 2x + 2 - b & ; x > 1 \end{cases}$

حال باید مشتق چپ و راست تابع در $x = 1$ برابر باشند.

(۲) $\begin{cases} f'_-(1) = a \\ f'_+(1) = 4 - b \end{cases} \xrightarrow{\text{مشتق‌پذیری}} a = 4 - b \Rightarrow a + b = 4$

$\xrightarrow{(1),(2)} a = 2, b = 2 \Rightarrow 2a - b = 2$

(حسابان ۲- مشتق، مشابه تمرین ۶ صفحه ۱۰۰)

گزینه «۴»

(فامر معوی)

تابع f در $x = 2$ پیوسته است (بررسی کنید)، پس نیم مماس چپ و نیم مماس راست دارد. حال در یک همسایگی $x = 2$ می‌توانیم بنویسیم:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x+2}{\sqrt{2x}} & ; 0 \leq x < 2 \\ \frac{2x+2}{\sqrt{2x+1}} & ; 2 \leq x < 4 \end{cases}$$

$$\Rightarrow f'(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{2x} - (x+2) \frac{1}{\sqrt{2x}}}{2x} & ; 0 \leq x < 2 \\ \frac{2(\sqrt{2x+1}) - (2x+2) \frac{1}{\sqrt{2x+1}}}{(\sqrt{2x+1})^2} & ; 2 < x < 4 \end{cases}$$

$\Rightarrow \begin{cases} f'_-(2) = 0 \\ f'_+(2) = \frac{1}{3} \Rightarrow f'_+(2) - f'_-(2) = \frac{1}{3} - 0 = \frac{1}{3} \end{cases}$

(حسابان ۲- مشتق، صفحه‌های ۸۴ تا ۸۷ و ۹۴)



۶- گزینه «۱»

(جوابش نیکنام)

راه حل اول:

$$f(x) = \frac{x^2 - x + 1}{x - 1} = \frac{x^2 - x}{x - 1} + \frac{1}{x - 1} = x + \frac{1}{x - 1}$$

$$\Rightarrow f'(x) = 1 - \frac{1}{(x - 1)^2}$$

$$\Rightarrow g(x) = 2x\left(x + \frac{1}{x - 1}\right) + (x^2 - 1)\left(1 - \frac{1}{(x - 1)^2}\right)$$

$$= 2x^2 + \frac{2x}{x - 1} + x^2 - 1 - \frac{x + 1}{x - 1} = 3x^2 - 1 + \frac{2x - x - 1}{x - 1} = 3x^2$$

$$\Rightarrow g'(x) = 6x \Rightarrow g'(2) = 12$$

راه حل دوم: داریم:

$$g(x) = ((x^2 - 1)f(x))'$$

$$(x^2 - 1)f(x) = (x^2 - 1)\left(\frac{x^2 - x + 1}{x - 1}\right)$$

$$= (x + 1)(x^2 - x + 1) = x^3 + 1$$

$$\Rightarrow g(x) = (x^3 + 1)' = 3x^2 \Rightarrow g'(x) = 6x \Rightarrow g'(2) = 12$$

(مسابان ۲- مشتق: صفحه‌های ۹۳ و ۹۴)

۷- گزینه «۴»

(جوابش نیکنام)

روش اول: ابتدا ضابطه تابع را ساده‌تر می‌کنیم:

$$f(x) = \frac{\lambda x}{\sqrt{4 + 2x} + \sqrt{4 - 2x}} \left(\frac{\sqrt{4 + 2x} - \sqrt{4 - 2x}}{\sqrt{4 + 2x} - \sqrt{4 - 2x}} \right)$$

$$= \frac{\lambda x}{\lambda x} (\sqrt{4 + 2x} - \sqrt{4 - 2x}) = \sqrt{4 + 2x} - \sqrt{4 - 2x}$$

$$\Rightarrow f'(x) = \frac{2}{\sqrt{4 + 2x}} + \frac{2}{\sqrt{4 - 2x}} \Rightarrow f'(0) = \frac{2}{2} + \frac{2}{2} = 2$$

روش دوم: با توجه به مشتق عامل صفرشونده می‌توانیم بنویسیم:

$$f'(0) = \frac{\lambda}{\sqrt{4 + \sqrt{4}}} = 2$$

(مسابان ۲- مشتق: مشابه تمرین ۱۴ صفحه ۱۰۱)

۸- گزینه «۲»

(ناظم ایلالی)

$$f(2x) = g(x^2) \Rightarrow 2f'(2x) = 2xg'(x^2) \Rightarrow f'(2x) = xg'(x^2)$$

$$\Rightarrow 2f''(2x) = g'(x^2) + 2x^2g''(x^2)$$

$$2f''(4) = g'(4) + 8g''(4) \quad \text{بنابراین به ازای } x = 2 \text{ داریم:}$$

از طرف دیگر داریم:

$$\begin{cases} g'(x) = \frac{3x}{x-1} \Rightarrow g'(4) = \frac{12}{3} = 4 \\ g''(x) = \frac{-3}{(x-1)^2} \Rightarrow g''(4) = \frac{-3}{9} = -\frac{1}{3} \end{cases}$$

$$\Rightarrow 2f''(4) = 4 + 8\left(-\frac{1}{3}\right) \Rightarrow f''(4) = \frac{2}{3}$$

(مسابان ۲- مشتق: صفحه‌های ۹۶ و ۹۸)

۹- گزینه «۴»

(ناظم ایلالی)

آهنگ تغییر متوسط تابع f در بازه $[0, a]$ برابر است با:

$$\frac{f(a) - f(0)}{a - 0} = \frac{a^3 - fa - 0}{a} = a^2 - f$$

آهنگ لحظه‌ای تغییر تابع f در $x = \sqrt{a}$ نیز برابر $f'(\sqrt{a})$ است:

$$f'(x) = 3x^2 - f \Rightarrow f'(\sqrt{a}) = 3a - f$$

$$\Rightarrow a^2 - f - (3a - f) = -2 \Rightarrow a^2 - 3a + 2 = 0$$

از معادله بالا دو مقدار ۱ و ۲ برای a به دست می‌آید که مجموع آن‌ها برابر ۳ است.

(مسابان ۲- مشتق: مشابه نهایی ری ۱۴۰۳- صفحه‌های ۱۰۲ تا ۱۰۴)

۱۰- گزینه «۲»

(جوابش نیکنام)

مساحت مستطیل ABOC برابر است با $S(x) = x\sqrt{x}$. پس داریم:

$$[1, 4] \text{ آهنگ متوسط در فاصله } \frac{S(4) - S(1)}{4 - 1} = \frac{8 - 1}{3} = \frac{7}{3}$$

$$S'(x) = \sqrt{x} + x \frac{1}{2\sqrt{x}} = \frac{3}{2}\sqrt{x}$$

$$\frac{S'(x) = \frac{7}{3}}{\frac{3}{2}\sqrt{x}} \rightarrow \frac{7}{2\sqrt{x}} = \frac{7}{3} \Rightarrow x = \frac{196}{81}$$

(مسابان ۲- مشتق: صفحه‌های ۱۰۲ تا ۱۰۶)

هندسه ۳


۱۱- گزینه «۴»

(روح اله حسینی)

$$x^2 + y^2 - 2y = 3 \Rightarrow x^2 + (y-1)^2 = 2^2$$

دایره به مرکز $(0, 1)$ و به شعاع ۲

مطابق شکل $WA' = a = 6$ و اندازه قطر بزرگ $2a = 12$ است. توجه کنید که در هر بیضی، مجموع فواصل هر نقطه روی آن از دو کانون برابر $2a$ است.




(هندسه ۳- آشنایی با مقاطع مخروطی؛ صفحه‌های ۴۷ و ۴۸)

۱۲- گزینه «۳»

(علیرضا شریف‌قطبی)

$$e = \frac{c}{a} \Rightarrow \frac{3}{5} = \frac{c}{a} \Rightarrow \begin{cases} c = 3k \\ a = 5k \end{cases}$$



قطرهای چهارضلعی ABCD برهم عمودند، پس داریم:

$$S_{ABCD} = \frac{1}{2} AC \cdot BD \Rightarrow 160 = \frac{1}{2} (2b)(2a) \Rightarrow ab = 80$$

$$\xrightarrow{a=5k} (\Delta k)b = 80 \Rightarrow b = \frac{16}{k}$$

$$b^2 = a^2 - c^2 \Rightarrow \left(\frac{16}{k}\right)^2 = (\Delta k)^2 - (3k)^2 = (4k)^2$$

$$\xrightarrow{k>0} \frac{16}{k} = 4k \Rightarrow 4k^2 = 16$$

$$\Rightarrow k^2 = 4 \xrightarrow{k>0} k = 2 \Rightarrow c = 3k = 6$$


$$FF' = 2c = 2(6) = 12$$

فاصله کانونی بیضی برابر است با:

(هندسه ۳- آشنایی با مقاطع مخروطی؛ صفحه‌های ۴۷ تا ۵۰)

۱۳- گزینه «۲»

(مهمر قدران)



طبق فرض، طول قطر کوچک بیضی برابر ۴ است، پس: $2b = 4 \Rightarrow b = 2$

چون M نقطه‌ای روی بیضی است، پس $MF + MF' = 2a$ و چون M روی دایره‌ای به قطر FF' قرار دارد، پس MF و MF' برهم عمودند.

$$MF^2 + MF'^2 = FF'^2 = 4c^2$$

بنابراین:

$$(MF + MF')^2 = MF^2 + MF'^2 + 2MF \times MF'$$

حال داریم:

$$\Rightarrow MF \times MF' = \frac{1}{2} \left[\underbrace{(MF + MF')^2}_{4a^2} - \underbrace{(MF^2 + MF'^2)}_{4c^2} \right]$$

$$= 2(a^2 - c^2) = 2b^2 = 2 \times 4 = 8$$

(هندسه ۳- آشنایی با مقاطع مخروطی؛ صفحه‌های ۴۷ تا ۵۰)

۱۴- گزینه «۲»

(مهمر قدران)


$$OF = 12 \Rightarrow c = 12 \Rightarrow 2c = 24$$

راه‌حل اول:

$$OA = OF + FA = 16 \Rightarrow a = 16 \Rightarrow 2a = 32$$

نقطه D بر روی بیضی قرار دارد، پس مجموع فواصل این نقطه از دو کانون بیضی، برابر طول قطر بزرگ بیضی است، یعنی $DF + DF' = 22$ می‌باشد.

در نتیجه داریم:



$$\Delta DFF': FF'^2 = DF'^2 - DF^2 = (DF' + DF)(DF' - DF)$$

$$\Rightarrow 24^2 = 22(DF' - DF) \Rightarrow DF' - DF = 18$$

$$\begin{cases} DF' + DF = 22 \\ DF' - DF = 18 \end{cases} \Rightarrow DF = 7 \Rightarrow y_D = 7$$

راه‌حل دوم: طول وتر کانونی در بیضی برابر است با $\frac{2b^2}{a}$ بنابراین:

$$y_D = \frac{b^2}{a} = \frac{a^2 - c^2}{a} = a - \frac{c^2}{a} = 16 - \frac{144}{16} = 16 - 9 = 7$$

(هندسه ۳- آشنایی با مقاطع مخروطی؛ مشابه کار در کلاس صفحه ۴۸)

۱۵- گزینه «۱»

(سرژ یقین‌آریان تبریزی)

قرینه نقطه F نسبت به خط d را K می‌نامیم.



(امیرمسین ابومصوب)

۱۸- گزینه «۱»

ابتدا معادله سهمی را به حالت متعارف تبدیل می‌کنیم:

$$y^2 - 4y + 2x + 6 = 0 \Rightarrow y^2 - 4y + 4 = -2x - 2$$

$$\Rightarrow (y - 2)^2 = -4 \times \frac{1}{2} (x + 1)$$

سهمی افقی است و دهانه آن رو به چپ باز می‌شود. نقطه رأس $S(-1, 2)$

سهمی و $a = \frac{1}{2}$ فاصله کانونی سهمی است. بنابراین نقطه $F(-1/2, 2)$

کانون این سهمی خواهد بود و هر پرتو نور که از کانون سهمی عبور کند، موازی با محور تقارن سهمی یعنی موازی با محور x ها بازتاب می‌یابد. در نتیجه پرتو تابش با جهت مثبت محور x ها، زاویه 45° یا (-45°) می‌سازد و شیب پرتو تابش برابر تانژانت این دو زاویه یعنی برابر ۱ یا (-۱) خواهد بود. داریم:

$$m = 1 \rightarrow \text{معادله پرتو تابش } y - 2 = 1(x + 1/2) \Rightarrow y = x + 3/2$$

$$m = -1 \rightarrow \text{معادله پرتو تابش } y - 2 = -1(x + 1/2) \Rightarrow y = -x + 3/2$$

(هنر سه ۳- آشنایی با مقاطع مخروطی؛ صفحه ۵۶)

(امیرمسین ابومصوب)

۱۹- گزینه «۲»


هر نقطه روی سهمی، مرکز یک دایره است که از کانون سهمی گذشته و بر خط هادی سهمی مماس است و برعکس، مرکز هر دایره که از کانون سهمی بگذرد و بر خط هادی آن مماس باشد، روی سهمی واقع است.

(هنر سه ۳- آشنایی با مقاطع مخروطی؛ تمرین ۱۱ صفحه ۵۸)

(مهرراز ملونری)

۲۰- گزینه «۲»

طبق تمرین ۱۵ صفحه ۵۹، می‌دانیم خطی که از M و M' می‌گذرد، موازی محور تقارن سهمی یا به عبارت دیگر موازی محور y ها است. کافی است طول نقطه M را محاسبه کنیم.



طول نقاط A و B از برابر قرار دادن معادله سهمی با معادله خط


$$x^2 + 4x = x + 6 \Rightarrow x^2 + 3x - 6 = 0 \text{ داریم. } y = x + 6$$

$$x_A + x_B = \frac{-3}{1} = -3 \Rightarrow x_M = \frac{x_A + x_B}{2} = \frac{-3}{2}$$

$$\Rightarrow \text{معادله خط } MM' : x = \frac{-3}{2}$$

(هنر سه ۳- آشنایی با مقاطع مخروطی؛ تمرین ۱۵ صفحه ۵۹)

با توجه به یادآوری صفحه ۴۹ کتاب درسی، نقطه M ، در بین نقاط روی خط d ، نقطه‌ای است که مجموع فواصل آن از F' و F حداقل است، بنابراین دو زاویه \hat{M}_1 و \hat{M}_2 برابر هستند و نقاط K ، M و F' در یک امتداد قرار دارند. (\hat{M}_1 و \hat{M}_2 متقابل به رأس هستند).



$$MF + MF' = 2a \xrightarrow{MF=MK} MK + MF' = 2a \Rightarrow KF' = 2a$$

بنابراین نقطه K همواره به فاصله ثابت $2a$ از نقطه F' قرار دارد. در نتیجه مکان هندسی قرینه نقطه F نسبت به خط d (همان نقطه K)، دایره‌ای به مرکز F' و شعاع $2a$ است.

(هنر سه ۳- آشنایی با مقاطع مخروطی؛ برگرفته از فعالیت (۴) صفحه ۵۰)

(امیرمسین ابومصوب)

۱۶- گزینه «۳»

$$y^2 - 2my + x = 0 \Rightarrow y^2 - 2my = -x$$

$$\Rightarrow y^2 - 2my + m^2 = -x + m^2 \Rightarrow (y - m)^2 = -(x - m^2)$$

بنابراین سهمی افقی و دهانه آن رو به چپ است و رأس سهمی و $S(m^2, m)$

فاصله کانونی سهمی است. پس کانون سهمی، نقطه $F(m^2 - \frac{1}{4}, m)$

است که روی نیمساز ناحیه‌های اول و سوم قرار دارد، پس:

$$y_F = x_F \Rightarrow m = m^2 - \frac{1}{4} \Rightarrow m^2 - m - \frac{1}{4} = 0$$

$$\Rightarrow \text{مجموع ریشه‌ها} = -\frac{(-1)}{1} = 1$$

(هنر سه ۳- آشنایی با مقاطع مخروطی؛ صفحه‌های ۵۰ تا ۵۵)

(مهرراز ملونری)

۱۷- گزینه «۳»

با توجه به مختصات کانون و خط هادی سهمی، نقطه رأس سهمی $S(-2, 0)$

و $a = 2$ است و دهانه سهمی رو به راست باز می‌شود، بنابراین داریم:

$$\text{معادله سهمی } (y - 0)^2 = 4(2)(x + 2) \Rightarrow y^2 = 8(x + 2)$$

$$\xrightarrow{x=0} y^2 = 16 \Rightarrow y = \pm 4$$

بنابراین اگر نقاط تلاقی سهمی با محور y ها را A و B بنامیم، آنگاه

$A(0, 4)$ و $B(0, -4)$ بوده و در نتیجه فاصله این دو نقطه از یکدیگر (طول

پاره خط AB) برابر است با: $|y_A - y_B| = |4 - (-4)| = 8$

(هنر سه ۳- آشنایی با مقاطع مخروطی؛ مشابه مثال صفحه ۵۴)



ریاضیات گسسته

۲۱- گزینه «۱»

(ممر فندان)

مجموعه $A = \{a, c, g, e\}$ ، مجموعه احاطه گر گراف مذکور نیست، زیرا هیچ یک از رأس‌های مجموعه A قادر به احاطه رأس i نیستند.

(ریاضیات گسسته-گراف و مدل سازی: مشابه کار در کلاس صفحه ۴۶)

۲۲- گزینه «۲»

(مسعود رویش)

اگر عدد احاطه گری گرافی برابر ۱ باشد، آنگاه رأسی در این گراف وجود دارد که با تمامی $p-1$ رأس دیگر گراف مجاور است، بنابراین چنین گرافی حداقل $p-1$ یال دارد، یعنی:

$$q_{\min} = p - 1$$

حداکثر تعداد یال‌های ممکن هم مربوط به گراف کامل K_p است، پس:

$$q_{\max} = \binom{p}{2} = \frac{p(p-1)}{2}$$

در نتیجه:

$$q_{\max} - q_{\min} = \frac{p(p-1)}{2} - (p-1)$$

$$= (p-1) \left(\frac{p}{2} - 1 \right) = \frac{(p-1)(p-2)}{2}$$

(ریاضیات گسسته-گراف و مدل سازی: صفحه‌های ۴۴ و ۴۵)

۲۳- گزینه «۴»

(امیرمسین ابومبوب)

سه رأس a ، e و f از درجه یک هستند و هیچ رأسی در گراف وجود ندارد که با حداقل دو رأس از این سه رأس مجاور باشد، بنابراین عدد احاطه گری این گراف، حداقل برابر ۳ است. در هر یک از مجموعه‌های احاطه گر مینیمم گراف G ، از هر یک از مجموعه‌های $\{a, b\}$ ، $\{c, f\}$ و $\{d, e\}$ ، دقیقاً یک رأس باید وجود داشته باشد، بنابراین تعداد $2 \times 2 \times 2 = 8$ مجموعه‌های گراف G برابر است با:

(ریاضیات گسسته-گراف و مدل سازی: صفحه‌های ۴۴ تا ۴۵)

۲۴- گزینه «۴»

(امیرمسین ابومبوب)

گزینه «۱»: مجموعه $\{3, 6, 10\}$ یک مجموعه احاطه گر مینیمم و در نتیجه

یک مجموعه احاطه گر مینیمال است.

گزینه «۲»: مجموعه $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ یک مجموعه احاطه گر مینیمال است.

گزینه «۳»: مجموعه $\{6, 7, 8, 9, 10\}$ یک مجموعه احاطه گر مینیمال است.

گزینه «۴»: این مجموعه نیز شامل ۷- مجموعه $\{2, 9, 10\}$ است، پس

مینیمال نیست زیرا با حذف رأس ۶، مجموعه باقی‌مانده کماکان احاطه گر است.

(ریاضیات گسسته-گراف و مدل سازی: برگرفته از کار در کلاس صفحه ۵۰)

۲۵- گزینه «۳»

(ممر فندان)

حالت اول: هیچ دو نفری همشهری نباشند.

به $\binom{5}{3} = 10$ طریق سه شهر را انتخاب و از هر کدام به $\binom{4}{1} = 4$ طریق یک

نفر را برمی‌گزینیم، یعنی: $\binom{5}{3} \times \binom{4}{1} = 640$

حالت دوم: به $\binom{5}{1} = 5$ طریق یک شهر را انتخاب و به $\binom{4}{2} = 6$ طریق دو نفر

از بین آنها انتخاب می‌کنیم. سپس از میان ۱۶ نفر دیگر (۴ نفر از هر یک از ۴

شهر باقی‌مانده) یکی را بر می‌گزینیم، یعنی:

$$\binom{5}{1} \binom{4}{2} \binom{16}{1} = 480$$

بنابراین تعداد کل حالت‌ها برابر است با: $640 + 480 = 1120$

(ریاضی ۱- شمارش، بدون شمردن: صفحه‌های ۱۳۳ تا ۱۴۰)



۲۶- گزینه «۳»

(افشین فاضلان)

از بین همه کلمات ۳ حرفی که با حروف a, b و c می توان ساخت، تنها ساختن کلمه bbb امکان پذیر نیست، پس آنها را از تعداد کل کلمات کم می کنیم.

$$۲۶ = ۲۷ - ۱ = ۳^۳ - ۱ = \text{تعداد کلمات مطلوب}$$

(ریاضیات گسسته- ترکیبیات: صفحه های ۵۶ تا ۵۹)

۲۷- گزینه «۳»

(نیلوفر مهدوی)

رقم یکان عدد مورد نظر می تواند ۲ یا ۴ باشد، بنابراین دو حالت برای ساختن چنین عددی وجود دارد:

حالت اول: رقم یکان برابر ۲ باشد که در این صورت تعداد جایگشت های

$$\frac{۷!}{۳!} = ۸۴۰ \quad \text{ارقام دیگر برابر است با:}$$

تکراررقم ۴

حالت دوم: رقم یکان برابر ۴ باشد که در این صورت تعداد جایگشت های

$$\frac{۷!}{۲! \times ۲!} = ۱۲۶۰ \quad \text{ارقام دیگر برابر است با:}$$

تکراررقم ۴ تکراررقم ۲

در نتیجه تعداد کل اعداد هشت رقمی زوج ساخته شده با این ارقام برابر

$$۸۴۰ + ۱۲۶۰ = ۲۱۰۰$$

است با:

(ریاضیات گسسته- ترکیبیات: مشابه مثال صفحه ۵۸)

۲۸- گزینه «۴»

(عباس الهی)

اگر x_A تعداد رأی های فرد A، x_B تعداد رأی های فرد B، x_C تعداد رأی های فرد C و x_D تعداد رأی های فرد D باشد، داریم:

$$x_A + x_B + x_C + x_D = ۹$$

می دانیم $x_A, x_B, x_C, x_D \geq 0$ ، پس تعداد کل حالات برابر است با:

$$\binom{۹+۴-۱}{۴-۱} = \binom{۱۲}{۳} = \frac{۱۲ \times ۱۱ \times ۱۰}{۶} = ۲۲۰$$

(ریاضیات گسسته- ترکیبیات: صفحه های ۵۹ تا ۶۱)

۲۹- گزینه «۲»

(علیرضا شریف نطیعی)

فرض کنیم $y_1 = \sqrt{x_1}$ و معادله را براساس مقادیر طبیعی که x_4 می تواند

بپذیرد، تقسیم بندی می کنیم:

$$x_4 = ۱ \Rightarrow y_1 + x_2 + x_3 = ۱۲$$

$$\Rightarrow \text{تعداد جواب های طبیعی} = \binom{۱۲-۱}{۳-۱} = \binom{۱۱}{۲} = ۵۵$$

$$x_4 = ۲ \Rightarrow y_1 + x_2 + x_3 = ۵$$

$$\Rightarrow \text{تعداد جواب های طبیعی} = \binom{۵-۱}{۳-۱} = \binom{۴}{۲} = ۶$$

بنابراین تعداد جواب های طبیعی معادله برابر است با: $۵۵ + ۶ = ۶۱$

(ریاضیات گسسته- ترکیبیات: صفحه های ۵۹ تا ۶۱)

۳۰- گزینه «۳»

(مهمر شاه مممری)

اگر $x_i = 2k_i + 1$ ($1 \leq i \leq 3$) انتخاب شود، آنگاه داریم:

$$(2k_1 + 1) + (2k_2 + 1) + (2k_3 + 1) = ۱۹$$

$$\Rightarrow 2(k_1 + k_2 + k_3) = ۱۶ \Rightarrow k_1 + k_2 + k_3 = ۸$$

تعداد جواب های صحیح و نامنفی معادله حاصل برابر است با:

$$\binom{۸+۳-۱}{۳-۱} = \binom{۱۰}{۲} = ۴۵$$

(ریاضیات گسسته- ترکیبیات: صفحه های ۵۹ تا ۶۱)



فیزیک ۳

گزینه «۳»

(سعید طاهری پروفی)

چون سیم را از ابزاری می گذرانیم که جرمش تغییر نمی کند، داریم:

$$m_1 = m_2 \Rightarrow V_1 = V_2 \Rightarrow A_1 L_1 = A_2 L_2$$

$$\Rightarrow \frac{A_2}{A_1} = \frac{L_1}{L_2} = \frac{1}{9} \Rightarrow \frac{L_2}{L_1} = 9$$

حال می توان نسبت تندی انتشار موج در سیم جدید به تندی انتشار موج در سیم اول را پیدا کرد:

$$v = \sqrt{\frac{F}{\mu}} = \sqrt{\frac{FL}{m}} \Rightarrow \frac{v_2}{v_1} = \sqrt{\frac{L_2}{L_1}} = 3$$

$$v = \frac{L}{t} \Rightarrow t = \frac{L}{v} \Rightarrow \frac{t_2}{t_1} = \frac{L_2}{L_1} \times \frac{v_1}{v_2} = 9 \times \frac{1}{3} = 3$$

$$\Rightarrow t_2 = 3t_1$$

(فیزیک ۳- نوسان و موج: صفحه های ۷۲ تا ۷۴)

گزینه «۴»

(بابک اسلامی)

طیف امواج الکترومغناطیسی از کمترین بسامد تا بیشترین بسامد (یا از بیشترین طول موج تا کمترین طول موج) به ترتیب عبارتند از امواج رادیویی، میکروموج، فرسرخ، طیف مرئی، فرابنفش، پرتوهای ایکس و پرتوهای گاما. حال به بررسی گزینه ها می پردازیم:

گزینه «۱»: پرتوهای گاما دارای بیشترین بسامد و کمترین طول موج هستند. گزینه «۲»: طول موج پرتوهای فرابنفش از طول موج پرتوهای فرسرخ کمتر است.

گزینه «۳»: تندی حرکت تمام طیف امواج الکترومغناطیسی در خلأ ثابت و برابر با تندی نور در خلأ است.

گزینه «۴»: طیف مرئی بین امواج فرابنفش و فرسرخ قرار دارد، به طوری که بسامد آن کمتر از فرابنفش و بیشتر از فرسرخ و طول موج آن بیشتر از فرابنفش و کمتر از فرسرخ است.

(فیزیک ۳- نوسان و موج: صفحه های ۷۴ تا ۷۶)

(مشابه پرسش ۱۸ آذر فصل صفحه ۸۷)

گزینه «۳»

(زهره آقاممیری)

با توجه به شکل صورت سؤال داریم:

$$A_A = 3A_B, \lambda_A = 2\lambda_B$$

چون دو موج در یک محیط منتشر می شوند، تندی انتشار یکسانی دارند. بنابراین داریم:

$$v = \lambda f \Rightarrow f = \frac{v}{\lambda} \xrightarrow{v_A = v_B} \frac{f_A}{f_B} = \frac{\lambda_B}{\lambda_A} = \frac{1}{2}$$

با توجه به رابطه مقایسه ای شدت صوت می توان نوشت:

$$\frac{I_A}{I_B} = \left(\frac{A_A}{A_B}\right)^2 \times \left(\frac{f_A}{f_B}\right)^2 = 3^2 \times \frac{1}{2^2} = \frac{9}{4} \Rightarrow \frac{I_B}{I_A} = \frac{4}{9}$$

(فیزیک ۳- نوسان و موج: صفحه های ۷۸ تا ۸۰)

(مشابه پرسش ۳۱ آذر فصل صفحه ۸۸)

گزینه «۴»

(زهره آقاممیری)

با توجه به رابطه تراز شدت صوت داریم:

$$\beta = 10 \log \frac{I}{I_0} \Rightarrow \beta_2 - \beta_1 = 10 \log \frac{I_2}{I_1} \quad (1)$$

از طرفی با توجه به ثابت بودن توان دریافتی، چون شدت صوت با مجذور فاصله شونده از منبع صوت رابطه عکس دارد، داریم:

$$\frac{I_2}{I_1} = \left(\frac{r_1}{r_2}\right)^2 \xrightarrow{(1)} \beta_2 - \beta_1 = 10 \log \left(\frac{r_1}{r_2}\right)^2 = 20 \log \left(\frac{r_1}{r_2}\right)$$

$$\frac{\beta_2 = 91 \text{ dB}}{\beta_1 = 83 \text{ dB}} \rightarrow 91 - 83 = 20 \log \frac{r_1}{r_2}$$

$$\Rightarrow 8 / 20 = \log \frac{r_1}{r_2} \quad (2)$$

از طرفی می توان نوشت:

$$8 / 20 = 1 - 0 / 6 = 1 - 2 \times (0 / 3) \xrightarrow{\log 1 = 0} \log 2 = 0 / 3$$

$$8 / 20 = \log 10 - 2 \log 2 = \log 10 - \log 2^2 \Rightarrow 8 / 20 = \log \frac{10}{4}$$

$$\xrightarrow{(2)} \frac{r_1}{r_2} = \frac{10}{4} \Rightarrow r_2 = 0 / 4 r_1$$



پس درصد تغییرات فاصله از چشمه صوت برابر است با:

$$\frac{r_2 - r_1}{r_1} \times 100 = -6\%$$

(فیزیک ۳ - نوسان و موج: صفحه‌های ۸۰ و ۸۱)

۳۵ - گزینه «۴»

(مصطفی واثقی)

$$\begin{cases} I \propto \frac{1}{r^2} \Rightarrow \frac{I_2}{I_1} = \left(\frac{r_1}{r_2}\right)^2 \\ P = I \times A \Rightarrow \frac{P_2}{P_1} = \frac{I_2}{I_1} \times \frac{A_2}{A_1} \Rightarrow 1 = \left(\frac{r_1}{r_2}\right)^2 \times \frac{16S_1}{S_1} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \left(\frac{r_1}{r_2}\right)^2 = \frac{1}{16} \Rightarrow \frac{r_1}{r_2} = \frac{1}{4} \Rightarrow r_2 = 4 \times (10) = 40 \text{ m}$$

(فیزیک ۳ - نوسان و موج: صفحه‌های ۷۸ تا ۸۱)

۳۶ - گزینه «۴»

(بابک اسلامی)

موارد (پ) و (ت) نادرستند.

علت نادرستی موارد:

(پ) بلندی هر تَن با شدت آن متفاوت است. شدت را می‌توان با یک آشکارساز اندازه گرفت. در حالی که بلندی چیزی است که گوش انسان حس می‌کند.

(ت) بیشترین حساسیت گوش انسان به بسامدهایی در گستره ۲۰۰۰ Hz تا ۵۰۰۰ Hz است.

(فیزیک ۳ - نوسان و موج: صفحه ۸۱)

۳۷ - گزینه «۲»

(مسعود قره‌فانی)

به دلیل ثابت بودن چشمه صوت، طول موج ثابت می‌ماند، اما چون دو متحرک A و B به سمت چشمه صوت در حرکت‌اند، در واحد زمان با جبهه‌های صوت بیشتری مواجه شده و بسامد بیشتری دریافت می‌کنند. بنابراین داریم:

$$v_B > v_A \Rightarrow f_B > f_A > f_0$$

(فیزیک ۳ - نوسان و موج: صفحه‌های ۸۱ تا ۸۴)

۳۸ - گزینه «۲»

(عبدالرضا امینی نسب)

هرگاه پرتو شکست به خط عمود نزدیک‌تر شود، ضریب شکست افزایش یافته و تندی کاهش می‌یابد. بنابراین داریم:

$$\left. \begin{matrix} n_2 > n_1 \\ n_2 < n_1 \end{matrix} \right\} \Rightarrow \begin{matrix} n_2 > n_1 > n_3 \\ v_2 < v_1 < v_3 \end{matrix}$$

(فیزیک ۳ - برهم‌کنش‌های موج: صفحه‌های ۹۶ تا ۹۹)

(مکمل پرسش ۳-۴ - صفحه ۹۷ کتاب درسی)

۳۹ - گزینه «۲»

(زهره آقماممیری)

در آزمایش یانگ، پهنای نوارهای تداخلی با طول موج نور تکفام مورد آزمایش رابطه مستقیم و در نتیجه با ضریب شکست رابطه عکس دارد. پس داریم:

($W_{\text{آب}}$ ، پهنای نوارها در آب و $W_{\text{مایع}}$ ، پهنای نوارها در مایع است.)

$$\frac{W_{\text{آب}}}{W_{\text{مایع}}} = \frac{\lambda_{\text{آب}}}{\lambda_{\text{مایع}}} = \frac{n_{\text{مایع}}}{n_{\text{آب}}} \Rightarrow \frac{W_{\text{آب}}}{W_{\text{مایع}}} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2} = \frac{3}{6}$$

(فیزیک ۳ - برهم‌کنش‌های موج: صفحه‌های ۱۰۴ و ۱۰۵)

۴۰ - گزینه «۲»

(بیبا فورشید)

در حالت اول ۳ گره و ۲ شکم روی طناب داریم:

$$f = \frac{nv}{2L} = \frac{2v}{2L} = \frac{v}{L}$$

در حالت دوم ۳ شکم روی طناب داریم:

$$f' = \frac{nv'}{2L} = \frac{3v'}{2L}$$

چون دیپازون تغییر نکرده است، پس در دو حالت بسامد موج ایستاده تشکیل شده روی طناب یکسان است. بنابراین:

$$f = f' \Rightarrow \frac{v}{L} = \frac{3v'}{2L} \Rightarrow \frac{v}{v'} = \frac{3}{2}$$

$$v = \sqrt{\frac{F}{\mu}} \rightarrow \frac{\sqrt{\frac{F}{\mu}}}{\sqrt{\frac{F'}{\mu'}}} = \frac{3}{2} \Rightarrow \sqrt{\frac{F}{F'}} = \frac{3}{2} \Rightarrow \frac{F}{F'} = \frac{9}{4}$$

$$F = 9mg \rightarrow \frac{9mg}{F'} = \frac{9}{4} \Rightarrow F' = 4mg$$

پس تعداد ۵ وزنه باید از کفه کم کنیم.

(فیزیک ۳ - برهم‌کنش‌های موج: صفحه‌های ۱۰۵ تا ۱۰۷)

شیمی ۳

گزینه ۱» ۴۱-

(ممد عظیمیان زواره)

عبارت‌های (آ)، (ب) درست‌اند.

بررسی عبارت‌های نادرست:

(پ) کربن دی‌اکسید ساختاری متفاوت با الماس و سیلیس داشته و جزو جامدهای (مواد) مولکولی محسوب می‌شود.

(ت) به جای واژه مولکول باید از واژه اتم استفاده شود.

(شیمی ۳- پلوه‌ای از هنر، زیبایی و مانگراری، صفحه‌های ۶۹ تا ۷۱)

گزینه ۲» ۴۲-

(ممد رضا یمشیری)

جرم خاک رس اولیه را برابر ۱۰۰g در نظر می‌گیریم و جرم آب خارج شده را x گرم در نظر می‌گیریم؛

$$\text{جرم آب باقی مانده} = \frac{\text{جرم خاک رس نهایی}}{\text{جرم جرمی آب}} \times 100$$

$$10 = \frac{37 - x}{100 - x} \times 100 \Rightarrow x = 30g$$

پس جرم خاک رس نهایی برابر ۷۰g = ۱۰۰ - ۳۰ است.

$$g \text{ Si} = 100g \text{ رس} \times \frac{48g \text{ SiO}_2}{100g \text{ رس}} \times \frac{1 \text{ mol SiO}_2}{60g \text{ SiO}_2}$$

$$\times \frac{1 \text{ mol Si}}{1 \text{ mol SiO}_2} \times \frac{28g \text{ Si}}{1 \text{ mol Si}} = 22 / 4g \text{ Si}$$

$$\text{جرم سیلیسیم} = \frac{\text{جرم جرمی Si در خاک رس نهایی}}{\text{جرم خاک رس نهایی}} \times 100$$

$$= \frac{22 / 4}{70} \times 100 = 32\%$$

(شیمی ۳- شیمی پلوه‌ای از هنر، زیبایی و مانگراری، صفحه ۶۹)

گزینه ۲» ۴۳-

(ممد رضا پوریاوید)

وجود پیوند اشتراکی در ساختار الماس و گرافیت از جمله ویژگی‌های مشترک این دو ماده است. اما گرافیت رسانا بوده و الماس نارسانا است.

الماس جامدی سخت و سه بعدی است، در حالی که گرافیت ماده‌ای دوبعدی و انعطاف‌پذیر است و جگالی این دو ماده نیز متفاوت است.


(شیمی ۳- شیمی، پلوه‌ای از هنر، زیبایی و مانگراری، صفحه‌های ۷۱ تا ۷۳)

(برگرفته از فور را بیازمایید)

گزینه ۴» ۴۴-

(علیرضا بیانی)

ابتدا واکنش مورد نظر را نوشته و موازنه می‌کنیم:



با توجه به این که محلول بنفش رنگ شده است، پس کاتیون V^{2+} ایجاد شده.

روش I)

$$\begin{aligned} \frac{0.2 \text{ mol}}{L} V^{n+} \times 2L \times \frac{(n-2) \text{ mol Zn}}{2 \text{ mol } V^{n+}} \times \frac{65g \text{ Zn}}{1 \text{ mol Zn}} \\ = 26g \text{ Zn} \Rightarrow n = 4 \end{aligned}$$

روش II)

$$\frac{M \times V}{\text{ضریب}} = \frac{\text{جرم}}{\text{ضریب} \times \text{جرم مولی}} \Rightarrow \frac{0.2 \times 2}{2} = \frac{26g}{65(n-2)} \Rightarrow n = 4$$

عدد اکسایش وانادیم در محلول اولیه ۴ بوده و رنگ محلول آبی می‌باشد.

مقدار مول الکترون‌های مبادله شده:

$$26g \text{ Zn} \times \frac{1 \text{ mol Zn}}{65g \text{ Zn}} \times \frac{2 \text{ mole}^-}{1 \text{ mol Zn}} = 0.8 \text{ mole}^-$$

(شیمی ۳- شیمی پلوه‌ای از هنر، زیبایی و مانگراری، صفحه ۸۶)

گزینه ۳» ۴۵-

(امیرسین مسلمی)

در ساختار لوویس H_2S ، H_2O و CH_4 اتم مرکزی دارای بار جزئی منفی است زیرا خصلت نافلزلی آن از اتم‌های کناری بیشتر است و

H_2S ، H_2O و $COCl_2$ برخلاف CO_2 در میدان الکتریکی

جهت‌گیری می‌کنند.

(شیمی ۳- شیمی پلوه‌ای از هنر، زیبایی و مانگراری، صفحه‌های ۷۵ تا ۷۷)



۴۶- گزینه «۲»

(معمردشا پورماویر)

آنتالپی فروپاشی شبکه LiF از NaCl بزرگ تر است ($a > b$) چرا که شعاع یونهای Li^+ و F^- از شعاع یونهای Na^+ و Cl^- کوچک تر است و با توجه به یکسان بودن مقدار بارهای مثبت و منفی یونها، چگالی بار در Li^+ و F^- بزرگ تر بوده و آنتالپی فروپاشی شبکه در ترکیب یونی حاصل از آنها بیشتر است. با توجه به بیشتر بودن شعاع یون Br^- در مقایسه با Cl^- و کمتر بودن چگالی بار آن، آنتالپی فروپاشی شبکه NaCl از NaBr بیشتر خواهد بود ($a > b > c$).

(شیمی ۳- شیمی، پلوه ای از هنر، زیبایی و ماندگاری، صفحه های ۷۹ تا ۸۳)

۴۷- گزینه «۲»

(آرمین لنگری)

جامدهای A, B, C و D به ترتیب جامدات فلزی، یونی، مولکولی و کووالانسی هستند. بررسی گزینه ها:

(۱) در جامدات فلزی، در دریای الکترونی، کاتیون ها بدون آنیون در کنار یکدیگر قرار گرفته اند. (درست)

(۲) برای جامدات یونی می توان از واژه های کاتیون و آنیون استفاده کرد. (نادرست)

(۳) شبکه بلور آرایش سه بعدی و منظم اتم ها، مولکول ها و یونها در حالت جامد است. در گروهی از جامدهای مولکولی، مولکول ها به چینش سه بعدی می رسند و منظم می شوند و واژه شبکه بلور برای آنها درست است. (درست)

(۴) در برخی انواع جامدات کووالانسی مانند گرافیت، هر اتم کربن تنها با ۳ اتم کربن دیگر پیوند کووالانسی دارد. (درست)

(شیمی ۳- شیمی پلوه ای از هنر، زیبایی و ماندگاری؛

صفحه های ۶۹ تا ۷۵، ۸۴ و ۹۰)

۴۸- گزینه «۳»

(معمردشا پورماویر)

طبق مطالب نوشته شده در کتاب درسی فناوری تصفیه آب مانع از گسترش بیماری هایی از جمله وبا در جهان شده است. فناوری تولید پلاستیک، صنعت پوشاک و بسته بندی (غذا، دارو و ...) را دگرگون ساخته است و فناوری تولید بنزین به حمل و نقل سرعت بخشید.

(شیمی ۳- شیمی، راهی به سوی آینده ای روشن تر؛ صفحه ۹۲)

(برگرفته از متن کتاب)

۴۹- گزینه «۲»

(امیرمسین بقیاری)

بررسی همه گزینه ها:

گزینه «۱»: انرژی فعال سازی واکنش (۱) ($388 \text{ kJ} = 569 - 181$) بیش تر از واکنش(۲) ($344 \text{ kJ} = 556 - 900$) است. پس واکنش (۲) سریع تر انجام می شود.گزینه «۲»: $226 / 25 \text{ kJ} = \frac{1 \text{ mol O}_2 \times 181 \text{ kJ}}{32 \text{ g O}_2} \times \frac{40 \text{ g O}_2}{1 \text{ mol O}_2} = 226 \text{ kJ}$ ؟

گزینه «۳»: با توجه به نمودارهای داده شده درست است.

گزینه «۴»: $139 \text{ kJ} = \frac{556 \text{ kJ}}{32 \text{ g O}_2} \times \frac{1 \text{ mol O}_2}{1 \text{ mol O}_2} \times 8 \text{ g O}_2 = 139 \text{ kJ}$ ؟

به ازای مصرف ۸ گرم گاز اکسیژن در واکنش (۲)، انرژی آزاد می شود.

(شیمی ۳- شیمی، راهی به سوی آینده ای روشن تر؛ صفحه های ۹۶ تا ۹۸)

۵۰- گزینه «۳»

(کامران یعفری)

با توجه به منحنی های داده شده سطح انرژی واکنش دهنده ها در هر سه واکنش یکسان است. اما با توجه به متفاوت بودن انرژی فعال سازی واکنش ها سرعت واکنش و پایداری فرآورده های سه واکنش با هم تفاوت دارد.

(شیمی ۳- شیمی راهی به سوی آینده ای روشن؛ صفحه های ۹۶ تا ۹۸)

(برگرفته از نمودار بیازماویر)




حسابان ۲ - پیشروی سریع

۵۱ - گزینه «۲»

(روح اله حسینی)

نمودار تابع را رسم می‌کنیم:



برای اینکه $x = 3$ طول ماکزیمم نسبی و غیرمطلق تابع باشد، لازم است $-7 < k < 2$ باشد؛ پس ۸ عدد صحیح برای k قابل قبول است.


(حسابان ۲ - کاربردهای مشتق؛ صفحه‌های ۱۱۲ تا ۱۱۵)

۵۲ - گزینه «۳»

(سینا فیروزخواه)

نمودار تابع f را رسم می‌کنیم:

$$f(x) = |(x-5)(x+1)|$$



نقطه $A(2, 9)$ ماکزیمم نسبی است و $C(-1, 0)$ نقطه مینیمم نسبی با طول کمتر؛ بنابراین داریم:

$$AC = \sqrt{9^2 + 3^2} = \sqrt{90} = 3\sqrt{10}$$


(حسابان ۲ - کاربردهای مشتق؛ صفحه‌های ۱۱۲ تا ۱۱۶)

۵۳ - گزینه «۲»

(سیرسپهر متولیان)

ابتدا $x - 2\left|\frac{x}{y}\right| - \frac{x}{y} = -2\left(\frac{x}{y} - \left|\frac{x}{y}\right|\right)$ را ساده‌تر می‌کنیم:

حال با توجه به ضابطه تابع درمی‌یابیم که اگر $k \geq 0$ باشد، ماکزیمم نسبی و اگر $k \leq -2$ باشد، مینیمم نسبی خواهیم داشت. پس تنها k قابل قبول -1 می‌باشد.



(حسابان ۲ - کاربردهای مشتق؛ صفحه‌های ۱۱۲ تا ۱۱۶)

۵۴ - گزینه «۱»

(کاظم ایلالی)

دامنه تابع f بازه $D_f = (-1, +\infty)$ است. حال از تابع f مشتق می‌گیریم:

$$f'(x) = \frac{\sqrt{x+1} - \frac{x-2k}{2\sqrt{x+1}}}{x+1} = \frac{2(x+1) - (x-2k)}{2(x+1)\sqrt{x+1}} = \frac{x+2+2k}{2(x+1)\sqrt{x+1}}$$

جواب معادله $f'(x) = 0$ ، به شرط حضور در دامنه، تنها نقطه بحرانی تابع است.

$$f'(x) = 0 \Rightarrow x = -(2k+2)$$

پس برای اینکه f نقطه بحرانی نداشته باشد، لازم است $x = -(2k+2)$

$$2k+2 \geq 1 \Rightarrow k \geq -\frac{1}{2}$$


خارج از دامنه f باشد:

(حسابان ۲ - کاربردهای مشتق؛ صفحه ۱۱۷)

۵۵ - گزینه «۲»

(سعید اکبرزاده)

سهمی f و مستطیل موردنظر را در شکل زیر می‌بینیم:



محیط مستطیل بالا $4x_0 + 2f(x_0)$ است، این محیط باید بیشترین مقدار خودش را داشته باشد.

$$p(x_0) = 4x_0 + 2(4 - x_0^2) = 4x_0 + 8 - 2x_0^2 = 2(-x_0^2 + 2x_0 + 4)$$

بیشترین مقدار عبارت بالا در $x_0 = 1$ رخ می‌دهد، زیرا داریم:

$$p'(x_0) = 2(-2x_0 + 2) \xrightarrow{p'(x_0)=0} x_0 = 1$$

$$f(x_0) = f(1) = 3$$

بنابراین اندازه اضلاع مستطیل برابر ۲ و ۳ خواهد بود که قطر آن برابر

$$\text{است. } \sqrt{2^2 + 3^2} = \sqrt{13}$$

(حسابان ۲ - کاربردهای مشتق؛ صفحه‌های ۱۱۷ تا ۱۱۹)



۵۶- گزینه «۳» (ممر زکنه)

در بازه‌ای که یک تابع اکیداً صعودی باشد، مشتق آن نامنفی است:

$$f'(x) = 4x^3 - 9x^2 + 2x = x(4x-1)(x-2)$$

$$\frac{f'(x) \geq 0}{x \geq 2 \text{ یا } 0 \leq x \leq \frac{1}{4}}$$

تابع f روی بازه‌های به دست آمده و هر زیرمجموعه از آن‌ها اکیداً صعودی است.

(حسابان ۲- کاربردهای مشتق؛ مشابه تمرین ۱۱ صفحه ۱۲۶)

۵۷- گزینه «۱» (موسان کورری)

صورت کسر تابع f ، اطراف $x = 0$ مقداری همواره مثبت می‌باشد.

بنابراین برای تعیین وضعیت منحنی تابع در همسایگی $x = 0$ (مجانِب قائم)،

به صورت زیر عمل می‌کنیم: $g(x) = x^2 - \sin x + \cos 2x - 1$


$$\Rightarrow g'(x) = 2x - \cos x - 2 \sin 2x$$

$$\Rightarrow g'(0) = -1$$

پس می‌توان نتیجه گرفت منحنی تابع f در همسایگی $x = 0$ اکیداً نزولی

است، بنابراین داریم: $g(0^+) < g(0) = 0 < g(0^-)$

$$\Rightarrow \begin{cases} \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \frac{1}{0^-} = -\infty \\ \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \frac{1}{0^+} = +\infty \end{cases}$$



(حسابان ۲- کاربردهای مشتق؛ صفحه‌های ۱۲۰ تا ۱۲۲ و ۱۳۷ تا ۱۴۴)

۵۸- گزینه «۴» (شاهین پروازی)

برای سهولت در مشتق‌گیری، ابتدا ضابطه تابع را به صورت زیر بازنویسی می‌کنیم:

$$f(x) = \sqrt[3]{x+1}(x+1-3) = (x+1)^{\frac{4}{3}} - 3(x+1)^{\frac{1}{3}}$$

$$\Rightarrow f'(x) = \frac{4}{3}(x+1)^{\frac{1}{3}} - (x+1)^{-\frac{2}{3}}$$

$$\Rightarrow f''(x) = \frac{4}{9}(x+1)^{-\frac{2}{3}} + \frac{2}{3}(x+1)^{-\frac{5}{3}}$$

$$= \frac{4}{9}(x+1)^{-\frac{5}{3}} - \frac{2}{3}(x+1)^{-\frac{2}{3}}$$

$$\Rightarrow f''(x) = \frac{4}{9\sqrt[3]{(x+1)^5}}(x + \frac{5}{3})$$

جدول تعیین علامت تابع f'' به صورت زیر است:

x	$-\frac{5}{3}$	-1
f''	$+$	$-$

بنابراین روی بازه $(-1, -5/3)$ تفرع نمودار تابع رو به پایین است.

(حسابان ۲- کاربردهای مشتق؛ مشابه تمرین ۲ صفحه ۱۳۶)

۵۹- گزینه «۳» (عمید علیزاده)

مشتق راست تابع f در $x = 0$ منفی و مشتق چپ آن مثبت است، بنابراین

$x = 0$ یک اکسترمم (ماکزیمم) برای تابع f به حساب می‌آید.

می‌دانیم ریشه‌های مرتبه فرد f' ، اکسترمم‌های نسبی تابع f و اکسترمم‌های

نسبی پیوسته تابع f' ، نقاط عطف تابع f هستند.

لذا طبق نمودار، تابع f دارای ۴ اکسترمم و ۳ عطف است.

(حسابان ۲- کاربردهای مشتق؛ مشابه کار در کلاس صفحه ۱۳۵)

۶۰- گزینه «۳» (علی شعربی)

مجانِب افقی نمودار، خط $y = 0$ است؛ پس حد تابع وقتی $x \rightarrow \pm\infty$ ، برابر

صفر است: $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{ax^2 + bx}{x^2 + 9} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{ax^2}{x^2} = a = 0$

پس تا اینجا ضابطه تابع $f(x) = \frac{bx}{x^2 + 9}$ است. حال با توجه به نمودار،

مشخص است که مقدار ماکزیمم نسبی تابع برابر ۲ است. یعنی مقدار تابع در

ریشه مثبت f' برابر ۲ است: $f'(x) = b \frac{(x^2+9) - x(2x)}{(x^2+9)^2} = b \frac{9-x^2}{(x^2+9)^2}$

$$\frac{f'(x)}{x} \Rightarrow 9 - x^2 = 0 \Rightarrow x = 3$$

$$\frac{f(3)=2}{18} \Rightarrow \frac{3b}{18} = 2 \Rightarrow b = 12$$

(حسابان ۲- کاربردهای مشتق؛ صفحه‌های ۱۳۷ تا ۱۴۴)



هندسه ۳- پیشروی سریع

گزینه ۲» ۶۱-

(سیرمهمرضا حسینی فرد)

اگر $A = (x_1, y_1, z_1)$ باشد، آن گاه تصویر قائم A بر صفحه yz برابر $A_y = (0, y_1, z_1)$ و بر صفحه xz برابر $A_x = (x_1, 0, z_1)$ است. پس داریم:

$$A_1 = (n, -2, -4) = (0, y_1, z_1) \Rightarrow n = 0, y_1 = -2, z_1 = -4$$

$$A_y = (4, m, k) = (x_1, 0, z_1) \Rightarrow x_1 = 4, m = 0, k = z_1$$

در نتیجه مختصات نقطه A به صورت $A = (4, -2, -4)$ است. لذا

$$|OA| = \sqrt{4^2 + (-2)^2 + (-4)^2} = 6$$

(هندسه ۳- بردارها؛ صفحه‌های ۶۳ تا ۶۸)

گزینه ۴» ۶۲-

(ممد ناری ایبانه)

بردارهای $\vec{a} + \vec{b}$ و $\vec{a} - \vec{b}$ ، قطرهای متوازی‌الاضلاع به اضلاع \vec{a} و \vec{b} هستند. متوازی‌الاضلاع که قطرهای آن برهم عمود باشند، یک لوزی است. بنابراین اضلاع مجاور در لوزی یعنی بردارهای \vec{a} و \vec{b} هم‌اندازه‌اند و داریم:

$$|\vec{a}| = |\vec{b}| \Rightarrow \sqrt{9 + m^2 + 36} = (-m + 5)$$

$$\xrightarrow{\text{توان } 2} m^2 + 45 = m^2 - 10m + 25 \Rightarrow m = -2$$

(هندسه ۳- بردارها؛ صفحه‌های ۷۳ تا ۷۶)

(مشابه نهایی فردار ۱۴۰۳)

گزینه ۴» ۶۳-

(علی پسنزیده)

$$\overline{AC} = \overline{BC} - \overline{BA}$$

$$\overline{AC} \cdot \overline{BC} = (\overline{BC} - \overline{BA}) \cdot \overline{BC} = \overline{BC} \cdot \overline{BC} - \overline{BA} \cdot \overline{BC}$$

$$\Rightarrow \overline{AC} \cdot \overline{BC} = |\overline{BC}|^2 - |\overline{BA}| \times |\overline{BC}| \times \cos \hat{B}$$

$$\overline{AC} \cdot \overline{BC} = 8^2 - 5 \times 8 \times \frac{1}{4} = 64 - 20 = 44$$

در نتیجه داریم:

(هندسه ۳- بردارها؛ ۷۷ تا ۷۹)

گزینه ۱» ۶۴-

(ممد قنران)

طول تصویر قائم بردار \vec{a} روی بردار \vec{b} برابر $\frac{|\vec{a} \cdot \vec{b}|}{|\vec{b}|}$ است. بنابراین داریم:

$$\frac{|\vec{a} \cdot \vec{b}|}{|\vec{b}|} = 2 \Rightarrow \frac{|m + (m-1) + 0|}{\sqrt{m^2 + 1}} = 2$$

$$\Rightarrow \frac{|2m-1|}{\sqrt{m^2+1}} = 2 \xrightarrow{\text{توان } 2} 4m^2 - 4m + 1 = 4m^2 + 4$$

$$\Rightarrow -4m = 3 \Rightarrow m = -\frac{3}{4} = -0.75$$

(هندسه ۳- بردارها؛ صفحه‌های ۷۷ تا ۸۰)

(مشابه نهایی فردار ۱۴۰۴)

گزینه ۳» ۶۵-

(امیرحسین ابومویب)

$$|\vec{a} - \vec{b}|^2 + |\vec{b} - \vec{c}|^2 + |\vec{c} - \vec{a}|^2$$

$$= 2(|\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2 + |\vec{c}|^2) - 2(\vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b} \cdot \vec{c} + \vec{a} \cdot \vec{c})$$

$$= 2(|\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2 + |\vec{c}|^2) - |\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}|^2$$

$$\Rightarrow 9 = 2 \times 2 - |\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}|^2 \Rightarrow |\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}| = 0$$

$$\Rightarrow \vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = \vec{0} \Rightarrow \vec{b} + \vec{c} = -\vec{a}$$

$$|\vec{a} + \sqrt{2}\vec{b} + \sqrt{2}\vec{c}| = |\vec{a} + \sqrt{2}(\vec{b} + \vec{c})| = |\vec{a} + \sqrt{2}(-\vec{a})|$$

$$= |-\sqrt{2}\vec{a}| = \sqrt{2}|\vec{a}| = 6$$

(هندسه ۳- بردارها؛ صفحه‌های ۷۷ تا ۷۹)

گزینه ۴» ۶۶-

(مهردار ملونزی)

با توجه به شکل داریم:

$$\vec{a} + (-\vec{b}) + \vec{c} + (-\vec{d}) = \vec{0} \Rightarrow \vec{a} + \vec{c} = \vec{b} + \vec{d}$$

$$\Rightarrow |\vec{a} + \vec{c}|^2 = |\vec{b} + \vec{d}|^2 \Rightarrow |\vec{a}|^2 + |\vec{c}|^2 + 2\vec{a} \cdot \vec{c} = |\vec{b}|^2 + |\vec{d}|^2 + 2\vec{b} \cdot \vec{d}$$



$$\rightarrow |\vec{a} + \vec{b}| \|\vec{a}\| \|\vec{b}\| \sin 135^\circ = \sqrt{10 - 4\sqrt{2}} \times 2\sqrt{2} \times \sqrt{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2} \quad (*)$$

$$= \sqrt{10 - 4\sqrt{2}} = \sqrt{16} \times \sqrt{5 - 2\sqrt{2}} = 4\sqrt{5 - 2\sqrt{2}}$$

(هندسه ۳- بردارها؛ صفحه‌های ۷۷ تا ۸۴)

(ررنا کربلایی)

گزینه «۱» - ۶۹

بردارهای \vec{MN} و \vec{NP} را تشکیل داده و مساحت مثلث MNP را به دست می‌آوریم:

$$\left. \begin{aligned} \vec{MN} &= (3, 3, 3) \\ \vec{NP} &= (3, 5, 3) \end{aligned} \right\} \Rightarrow \vec{MN} \times \vec{NP} = (-6, 0, 6)$$

$$S_{MNP} = \frac{1}{2} |\vec{MN} \times \vec{NP}| = \frac{1}{2} \sqrt{(-6)^2 + 0^2 + 6^2} = 3\sqrt{2}$$

می‌دانیم مساحت مثلثی که از وصل کردن وسط‌های اضلاع یک مثلث پدید

می‌آید، $\frac{1}{4}$ مساحت آن مثلث است، بنابراین داریم:

$$S_{MNP} = \frac{1}{4} S_{ABC} \Rightarrow 3\sqrt{2} = \frac{1}{4} S_{ABC} \Rightarrow S_{ABC} = 12\sqrt{2}$$

(هندسه ۳- بردارها؛ صفحه‌های ۸۱ تا ۸۴)

(فامر قاسمیان)

گزینه «۳» - ۷۰

شرط آن که چهار نقطه A, B, C, D روی یک صفحه باشند آن است که

سه بردار $\vec{AB}, \vec{AC}, \vec{AD}$ هم‌صفحه باشند، به عبارتی

$$\vec{AB} \cdot (\vec{AC} \times \vec{AD}) = 0 \text{ باشد.}$$

$$\vec{AB} \cdot (\vec{AC} \times \vec{AD}) = 0 \Rightarrow (1, 4, -3) \cdot ((-3, 2, 1) \times (2, m+1, 2)) = 0$$

$$\Rightarrow \begin{vmatrix} 1 & 4 & -3 \\ -3 & 2 & 1 \\ 2 & m+1 & 2 \end{vmatrix} = \lambda m + 56 = 0 \Rightarrow m = -7$$

(هندسه ۳- بردارها؛ صفحه‌های ۸۳ و ۸۴)

(مشابه نهایی شهریور ۱۴۰۲)

$$\Rightarrow 2(\vec{a} \cdot \vec{c} - \vec{b} \cdot \vec{d}) = |\vec{b}|^2 + |\vec{d}|^2 - (|\vec{a}|^2 + |\vec{c}|^2)$$

$$\Rightarrow 2(\vec{a} \cdot \vec{c} - \vec{b} \cdot \vec{d}) = 2^2 + 4^2 - (1^2 + 3^2) = 10 \Rightarrow \vec{a} \cdot \vec{c} - \vec{b} \cdot \vec{d} = 5$$

(هندسه ۳- بردارها؛ صفحه‌های ۷۷ تا ۷۹)

(روح اله حسینی)

گزینه «۲» - ۶۷

اگر بردارهای $\vec{a} = (2, 3, -6)$ و $\vec{b} = \left(2x, y, \frac{z}{3}\right)$ را در نظر بگیریم، آنگاه

با استفاده از نامساوی کوشی شوارتز داریم:

$$|\vec{a} \cdot \vec{b}| \leq |\vec{a}| \cdot |\vec{b}|$$

$$|4x + 3y - 2z| \leq \sqrt{4+9+36} \times \sqrt{4x^2 + y^2 + \frac{z^2}{9}}$$

$$\Rightarrow 14 \leq 7 \times \sqrt{4x^2 + y^2 + \frac{z^2}{9}} \Rightarrow 2 \leq \sqrt{4x^2 + y^2 + \frac{z^2}{9}}$$

$$\Rightarrow 4 \leq 4x^2 + y^2 + \frac{z^2}{9} \Rightarrow \min \left(4x^2 + y^2 + \frac{z^2}{9} \right) = 4$$

(هندسه ۳- بردارها؛ صفحه‌های ۷۷ تا ۷۹)

(مهمر فخران)

گزینه «۳» - ۶۸

چون $\vec{a} \times \vec{b}$ بر صفحه شامل \vec{a} و \vec{b} عمود می‌شود، بنابراین $\vec{a} \times \vec{b}$ بر $\vec{a} + \vec{b}$

عمود است و سینوس زاویه بین دو بردار برابر یک است. داریم:

$$|(\vec{a} + \vec{b}) \times (\vec{a} \times \vec{b})| = |\vec{a} + \vec{b}| |\vec{a} \times \vec{b}| \times 1 = |\vec{a} + \vec{b}| \|\vec{a}\| \|\vec{b}\| \sin \theta \quad (*)$$

از طرفی، $|\vec{b}| = \sqrt{2}$ و $|\vec{a}| = 2\sqrt{2}$ ، پس:

$$|\vec{a} + \vec{b}| = \sqrt{|\vec{a} + \vec{b}|^2} = \sqrt{(\vec{a} + \vec{b}) \cdot (\vec{a} + \vec{b})}$$

$$= \sqrt{|\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2 + 2\vec{a} \cdot \vec{b}} = \sqrt{8 + 2 + 2 \times 2\sqrt{2} \times \sqrt{2} \times \cos 135^\circ}$$

$$= \sqrt{10 + 8 \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)} = \sqrt{10 - 4\sqrt{2}}$$

ریاضیات گسسته - پیشروی سریع

۷۱- گزینه «۲»

(افشین فاضلن)

تنها دو مربع لاتین با شرایط داده شده ساخته می‌شود:

۱	۲	۴	۳
۲	۱	۳	۴
۴	۳	۱	۲
۳	۴	۲	۱

۱	۲	۴	۳
۲	۱	۳	۴
۳	۴	۱	۲
۴	۳	۲	۱

(ریاضیات گسسته - ترکیبیات: صفحه‌های ۶۲ تا ۶۴)

۷۲- گزینه «۲»

(مهم قدران)

در هر مربع لاتین از مرتبه ۷، در هر سطر اعداد ۱، ۲، ۳ و ... تا ۷ هر کدام یکبار وجود دارند. بنابراین در ارقام یکان و دهگان اعداد حاصل، ارقام ۱ تا ۷ دقیقاً یکبار دیده می‌شوند و در نتیجه مجموع اعداد دو رقمی حاصل برابر است با:

$$(10+20+30+\dots+70)+(1+2+3+\dots+7)=280+28=308$$

(ریاضیات گسسته - ترکیبیات: صفحه‌های ۶۴ تا ۶۷)

۷۳- گزینه «۴»

(امیرحسین ابومحبوب)

مربع لاتین 3×3 با مربعی که از تعویض دو ستون آن حاصل می‌شود، متعامد خواهد بود. بنابراین ۳ مربع لاتین متعامد با مربع لاتین A و با شرایط گفته شده وجود دارد.

به عنوان مثال داریم:

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{تعویض ستون‌های دوم و سوم}} B = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 2 \\ 2 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

از ترکیب این دو مربع، مربع زیر حاصل می‌شود که در آن هیچ عدد دو رقمی تکراری وجود ندارد، پس A و B متعامد هستند.

۳۳	۱۲	۲۱
۱۱	۲۳	۳۲
۲۲	۳۱	۱۳

(ریاضیات گسسته - ترکیبیات: تمرین ۱۳ صفحه ۷۲)

(امیرحسین ابومحبوب)

۷۴- گزینه «۱»

ابتدا مربع‌های لاتین را تکمیل می‌کنیم:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \\ 4 & 3 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 4 & 3 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 4 & 3 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \\ 4 & 3 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 & 4 \\ 3 & 2 & 4 & 1 \\ 4 & 3 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

مربع‌های لاتین A و C متعامد نیستند چون به عنوان مثال درایه‌های (سطر اول و ستون چهارم) و (سطر سوم و ستون اول) در مربع A هر دو برابر ۴ و در مربع C هر دو برابر ۳ است. مربع‌های لاتین B و C نیز متعامد نیستند چون به عنوان مثال درایه‌های (سطر اول و ستون اول) و (سطر دوم و ستون دوم) در مربع B هر دو برابر ۱ و در مربع C نیز هر دو برابر ۱ است. ولی دو مربع لاتین A و B متعامدند، چون در صورت ترکیب این دو مربع، مربع زیر حاصل می‌شود که در آن هیچ عدد دو رقمی تکراری وجود ندارد.

۱۱	۲۲	۳۳	۴۴
۳۲	۴۱	۱۴	۲۳
۴۳	۳۴	۲۱	۱۲
۲۴	۱۳	۴۲	۳۱


(ریاضیات گسسته - ترکیبیات: مشابه مثال صفحه‌های ۶۵ و ۶۶)



۷۵- گزینه «۲»

(سیرممد رضا حسینی فردر)

فرض کنید کلاس‌های ریاضی، شیمی و فیزیک را به ترتیب با A ، B و C نمایش دهیم. با توجه به نمودار زیر باید از مجموع نواحی مشترک دوجه‌دوی کلاس‌ها، ناحیه مشترک بین سه کلاس را سه بار حذف کنیم؛ لذا تعداد دانش‌آموزانی که دقیقاً در دو کلاس ثبت‌نام کرده‌اند، برابر می‌شود با:



$$n(A \cap B) + n(A \cap C) + n(B \cap C) - 3n(A \cap B \cap C) = 40 + 13 + 17 - 3 \times 5 = 55$$

(ریاضیات گسسته - ترکیبیات: مشابه تمرین ۳ صفحه ۸۳)

۷۶- گزینه «۳»

(علیرضا شریف‌فطیپی)

X و Y را مجموعه جایگشت‌هایی از حروف کلمه NAVID می‌گیریم که در آنها به ترتیب A و N سر جای خود قرار دارند. تعداد جایگشت‌های مطلوب برابر می‌شود با:

$$|\bar{X} \cap \bar{Y}| = |\overline{XUY}| = |S| - |XUY| = |S| - |X| - |Y| + |X \cap Y|$$

$$|\bar{X} \cap \bar{Y}| = 5! - 4! - 4! + 3! = 78$$

(ریاضیات گسسته - ترکیبیات: صفحه‌های ۷۳ تا ۷۷)

۷۷- گزینه «۴»

(امیرحسین ابومصوب)

تعداد توابع پوشا از دامنه ۴ عضوی به برد ۳ عضوی برابر است با:

$$3^4 - 3 \times 2^4 + 3 = 36$$

حال تعداد توابع پوشایی که در آنها $f(1) = 7$ است را می‌یابیم. با توجه به این‌که عضو ۷ در برد وجود دارد، A و B را مجموعه توابعی از $\{2, 3, 4\}$ به $\{5, 6, 7\}$ در نظر می‌گیریم که به ترتیب اعضای ۵ و ۶ در برد آنها وجود ندارند. داریم:

$$|\bar{A} \cap \bar{B}| = |\overline{A \cup B}| = |S| - |A \cup B| = |S| - (|A| + |B| - |A \cap B|)$$

$$= 3^3 - (2^3 + 2^3 - 1) = 27 - 15 = 12$$

در نتیجه طبق اصل متمم، تعداد توابع پوشای مورد نظر برابر می‌شود با:

$$36 - 12 = 24$$

(ریاضیات گسسته - ترکیبیات: صفحه‌های ۷۸ و ۷۹)

۷۸- گزینه «۱»

(ممد قنران)

باید در بدترین حالت ممکن ۲ مهره قرمز و ۳ مهره آبی و ۴ مهره بنفش برداریم. اگر یک مهره دیگر برداریم، یکی از شروط ۳ مهره قرمز یا ۴ مهره آبی یا ۵ مهره بنفش (هم‌رنگ) رخ می‌دهد که در نتیجه با برداشتن حداقل ۱۰ مهره قطعاً یکی از حالات مورد نظر رخ می‌دهد.

(ریاضیات گسسته - ترکیبیات: صفحه‌های ۷۹ تا ۸۴)

۷۹- گزینه «۳»

(علی ساویبی)

تعداد لانه‌ها برابر است با تعداد وسیله‌ها. ضرب در تعداد رنگ‌های مختلف (اصل ضرب). بنابراین تعداد لانه‌ها برابر است با: $12 = 3 \times 4$. اکنون تعداد وسایل نقلیه لازم برای آن که حداقل پنج وسیله هم نوع و هم‌رنگ داشته باشیم برابر می‌شود با:

$$4 \times 12 + 1 = 49$$

در واقع اگر از هر نوع و رنگ چهار تا انتخاب کرده باشیم، کافی است وسیله دیگری انتخاب کنیم تا لاقط پنج وسیله از یک نوع و یک رنگ داشته باشیم.

(ریاضیات گسسته - ترکیبیات: صفحه‌های ۷۹ تا ۸۴)

۸۰- گزینه «۲»

(امیرحسین ابومصوب)

اگر ۳۷ شاخه گل را ۳۷ کیبوتر و ۳ رنگ مختلف را ۳ لانه فرض کنیم، آنگاه چون $37 = 12 \times 3 + 1$ ، پس طبق اصل لانه کیبوتری از یکی از رنگ‌ها حداقل $12 + 1 = 13$ شاخه گل موجود است. حال اگر ۱۳ شاخه گل هم رنگ را ۱۳ کیبوتر فرض کنیم، با توجه به این‌که $13 = 4 \times 3 + 1$ ، آنگاه طبق اصل لانه کیبوتری اگر ۴ گلدان (۴ لانه) موجود باشد، گلدانی وجود خواهد داشت که در آن حداقل $4 = 3 + 1$ شاخه گل هم‌رنگ موجود است.

(ریاضیات گسسته - ترکیبیات: صفحه‌های ۷۹ تا ۸۴)

فیزیک ۳- پیشروی سریع

۸۱- گزینه «۳»

(مسعود قره‌فانی)

ابتدا با توجه به مقادیر داده شده، بیشینه انرژی جنبشی فوتوالکترون‌های

گسیل شده را به دست می‌آوریم:

$$K_{\max} = \frac{hc}{\lambda} - W_0 = \frac{1240}{248} - 4/55 = 0/45eV$$

حال این انرژی را به ژول تبدیل می‌کنیم:

$$K_{\max} = 0/45eV \times \frac{1/6 \times 10^{-19} J}{1eV} = 0/72 \times 10^{-19} J$$

حال برای محاسبه تندی بیشینه داریم:

$$K = \frac{1}{2}mv^2 \Rightarrow v_{\max} = \sqrt{\frac{2K_{\max}}{m}}$$

$$\Rightarrow v_{\max} = \sqrt{\frac{2 \times 0/72 \times 10^{-19}}{9 \times 10^{-31}}} = \sqrt{\frac{2 \times 72 \times 10^{-21}}{9 \times 10^{-31}}}$$

$$\Rightarrow v_{\max} = \sqrt{16 \times 10^{10}} = 4 \times 10^5 \frac{m}{s} = 4 \times 10^2 \frac{km}{s}$$

(فیزیک ۳- آشنایی با فیزیک اتمی؛ صفحه‌های ۱۱۶ تا ۱۲۰)

۸۲- گزینه «۱»

(مصطفی کیانی)

ابتدا تعداد فوتون‌های گسیلی ممکن را با استفاده از رابطه زیر می‌یابیم:

$$N = \frac{n(n-1)}{2} \xrightarrow{n=6} N = \frac{6 \times (6-1)}{2} = 15$$

برای کوتاه‌ترین طول موج فوتون تابشی، باید الکترون از تراز $n = 6$ به تراز

$n' = 1$ برود. دقت کنید، کوتاه‌ترین طول موج فوتون تابشی در حالتی به

وجود می‌آید که اختلاف انرژی دو تراز که الکترون بین آن‌ها جابه‌جا

می‌شود، بیشترین مقدار را داشته باشد.

$$\frac{1}{\lambda} = R \left(\frac{1}{n'^2} - \frac{1}{n^2} \right) \xrightarrow{n=6, n'=1} \frac{1}{\lambda_{\min}} = \frac{1}{100} \times \left(\frac{1}{1} - \frac{1}{36} \right)$$

$$\Rightarrow \frac{1}{\lambda_{\min}} = \frac{1}{100} \times \frac{35}{36} \Rightarrow \lambda_{\min} = \frac{720}{35} nm$$

(فیزیک ۳- آشنایی با فیزیک اتمی؛ صفحه‌های ۱۲۱ تا ۱۲۴)

(زهره آخاممیری)

۸۳- گزینه «۳»

ابتدا مقدار انرژی را که الکترون می‌گیرد، بر حسب الکترون‌ولت محاسبه می‌کنیم:

$$1eV = 1/6 \times 10^{-19} J \Rightarrow E = \frac{2/04 \times 10^{-18}}{1/6 \times 10^{-19}} = 12/75eV$$

این مقدار برابر با اختلاف انرژی دو تراز است، پس داریم:

$$E_n - E_{n'} = 12/75eV$$

$$\frac{E_{n'} = -E_R = -13/6eV}{n'=1 \text{ (حالت پایه)}} \rightarrow E_n = 12/75 - 13/6 = -0/85eV$$

$$E_n = -\frac{13/6}{n^2} \Rightarrow n^2 = \frac{13/6}{0/85} \quad \text{از طرفی داریم:}$$

$$\Rightarrow n^2 = 16 \Rightarrow n = 4$$

تراز $n = 4$ مربوط به سومین حالت برانگیخته است.

از طرفی شعاع مدارهای الکترون از رابطه زیر به دست می‌آید:

$$r_n = a \cdot n^2 \Rightarrow \frac{r_n}{r_{n'}} = \left(\frac{n}{n'} \right)^2 = 16$$

(فیزیک ۳- آشنایی با فیزیک اتمی؛ صفحه‌های ۱۲۶ تا ۱۲۹)

(حامد طاهرقانی)

۸۴- گزینه «۱»

فوتون‌های پرتوهای لیزری علاوه بر اینکه هم‌گام (هم‌فاز) و هم‌بسامدند،

هم‌جهت نیز هستند.

(فیزیک ۳- آشنایی با فیزیک اتمی؛ صفحه‌های ۱۳۲ و ۱۳۳)

(مکمل پرسش ۱۷ اثر فصل صفحه ۱۳۶ کتاب درسی)



۸۵- گزینه «۳»

(بانک اسلامی)

فقط مورد (ت) نادرست است، زیرا از منظر نیروی هسته‌ای، تفاوتی بین پروتون و نوترون وجود ندارد. یعنی نیروی ربایشی هسته‌ای یکسانی بین دو پروتون، دو نوترون و یا یک پروتون و یک نوترون وجود دارد. به همین دلیل به پروتون و نوترون، نوکلئون گفته می‌شود.

(فیزیک ۳- آشنایی با فیزیک هسته‌ای، صفحه ۱۴۰)

۸۶- گزینه «۲»

(معمری راست پیمان)

با توجه به اصل پایستگی انرژی و ماده اینستین، می‌توان نوشت:

$$E = mc^2$$

$$\Rightarrow E = (0.25 \times 10^{-3})(3 \times 10^8)^2 = 2.25 \times 10^{13} \text{ J}$$

$$\frac{1 \text{ kW} \cdot \text{h} = 10^3 \times 3600 \text{ J} = 3.6 \times 10^6 \text{ J}}{2.25 \times 10^{13} \text{ J}} \rightarrow E = \frac{2.25 \times 10^{13}}{3.6 \times 10^6} = 6.25 \times 10^6 \text{ kW} \cdot \text{h}$$

(فیزیک ۳- آشنایی با فیزیک هسته‌ای، صفحه ۱۴۱)

۸۷- گزینه «۳»

(شارمان ویسی)



بنابراین محصول نهایی اکسیژن است. طبق رابطه $A = Z + N$ ، تعداد

$$18 = 8 + N \Rightarrow N = 10$$

نوترون‌های محصول نهایی برابر است با:

(فیزیک ۳- آشنایی با فیزیک هسته‌ای، صفحه‌های ۱۴۲ تا ۱۴۵)

(مشابه پرسش ۶ آفر فصل صفحه ۱۵۵ کتاب درسی)

۸۸- گزینه «۳»

(عبدالرضا امینی نسب)

$$\begin{aligned} \frac{\text{A}}{\text{Z}}\text{Y} &\rightarrow {}_{79}^{196}\text{X} + {}_2^4\alpha + {}_{-1}^0\beta \\ \Rightarrow \begin{cases} \text{A} = 196 + (3 \times 4) + 0 = 208 \\ \text{Z} = 79 + (3 \times 2) - 1 = 84 \end{cases} \\ \text{A} = \text{Z} + \text{N} &\Rightarrow 208 = 84 + \text{N} \Rightarrow \text{N} = 124 \end{aligned}$$

(فیزیک ۳- آشنایی با فیزیک هسته‌ای، صفحه‌های ۱۴۲ تا ۱۴۵)

۸۹- گزینه «۲»

(فسرو ارغوانی فرد)

پس از گذشت ۸۰ سال، $\frac{31}{32}m$ واپاشی می‌شود و $\frac{1}{32}m$ از آن فعال

می‌ماند:

$$m \rightarrow \frac{m}{2} \rightarrow \frac{m}{4} \rightarrow \frac{m}{8} \rightarrow \frac{m}{16} \rightarrow \frac{m}{32}$$

این مدت معادل ۵ نیمه‌عمر است، پس: $5T_{1/2} = 80 \Rightarrow T_{1/2} = 16$ سال

طبق نمودار بالا می‌دانیم پس از گذشت ۳ نیمه‌عمر یعنی ۴۸ سال، $\frac{1}{8}$ جرم فعال اولیه از این عنصر فعال می‌ماند.

(فیزیک ۳- آشنایی با فیزیک هسته‌ای، صفحه‌های ۱۴۶ و ۱۴۷)

۹۰- گزینه «۳»

(بهنام رستمی)

در راکتورهای هسته‌ای، از موادی مانند آب معمولی، آب سنگین و گرافیت به‌عنوان کندساز نوترون‌ها و از موادی مانند کادمیم و بور برای تنظیم آهنگ واکنش شکافت یعنی کنترل تعداد نوترون‌های موجود برای به‌وجود آوردن شکافت، استفاده می‌شود.

(فیزیک ۳- آشنایی با فیزیک هسته‌ای، صفحه‌های ۱۴۸ تا ۱۵۲)

(مشابه پرسش ۱۲ آفر فصل صفحه ۱۵۶)



شیمی ۳ - پیشروی سریع

۹۱- گزینه «۱»

(سمانه ابراهیم زاره)

موارد «آ» و «ب» تعادل را در جهت رفت جابه‌جا می‌کنند.

بررسی موارد:

آ) با افزایش فشار در دمای ثابت، تعادل در جهت تولید تعداد مول‌های گازی کمتر (جهت رفت) جابه‌جا می‌شود.

ب) افزایش غلظت واکنش‌دهنده‌ها تعادل را در جهت مصرف واکنش‌دهنده‌ها یعنی جهت رفت جابه‌جا می‌کند.

پ) در واکنش‌های گرماده، با افزایش دما تعادل در جهت برگشت جابه‌جا می‌شود.

ت) با افزایش حجم (کاهش فشار) در دمای ثابت، تعادل در جهت تولید مول‌های گازی بیشتر (جهت برگشت) جابه‌جا می‌شود.

(شیمی ۳ - شیمی راهی به سوی آینده‌ای روشن‌تر: صفحه‌های ۱۰۴ تا ۱۰۹)

(برگرفته از متن کتاب)

۹۲- گزینه «۱»

(امیر هاتمیان)

ابتدا مول اولیه گاز SO_3 را به دست می‌آوریم.

$$? \text{ mol } SO_3 = 48.0 \text{ g } SO_3 \times \frac{1 \text{ mol } SO_3}{80 \text{ g } SO_3} = 0.6 \text{ mol } SO_3$$



مول اولیه	:	۰	۰	۰
تغییرات مول	:	-۲x	+۲x	+x
مول در تعادل	:	۰.۶-۲x	۲x	x

مجموع مول‌های گازی در حالت تعادل:

$$0.6 - 2x + 2x + x = 0.6 + x = 0.7 \Rightarrow x = 0.1 \text{ mol}$$

$$K = \frac{[SO_2]^2 \times [O_2]}{[SO_3]^2} = \frac{(\frac{0.1}{V})^2 \times (\frac{0.1}{V})}{(\frac{0.6}{V})^2} = \frac{1}{8} = 0.125 \text{ mol.L}^{-1}$$

جرم SO_3 در سامانه تعادلی برابر است با:

$$? \text{ g } SO_3 = 0.1 \text{ mol } SO_3 \times \frac{80 \text{ g } SO_3}{1 \text{ mol } SO_3} = 8 \text{ g } SO_3$$

(شیمی ۳ - شیمی راهی به سوی آینده‌ای روشن‌تر: صفحه‌های ۱۰۳ و ۱۰۴)

۹۳- گزینه «۲»

(هاری عباری)


بررسی گزینه‌ها:

گزینه «۱»: با افزایش فشار (کاهش حجم) واکنش در جهت تولید مول‌های گازی کمتر (واکنش رفت - سمت راست) جابه‌جا می‌شود.

گزینه «۲»: با کاهش دما واکنش در جهت رفت و تولید گرما پیش رفته و شمار مولکول‌های گازی کاهش می‌یابد.

گزینه «۳»: چون واکنش گرماده است پس داریم: $E_a \text{ برگشت} > E_a$

گزینه «۴»: از آنجایی که آنتالپی واکنش منفی است، پس داریم:



برگشت جابه‌جا شده و شمار مول‌های SO_3 کاهش و شمار مول‌های O_2 افزایش

می‌یابد. پس نسبت شمار مول‌های O_2 به شمار مول‌های SO_3 افزایش می‌یابد.

(شیمی ۳ - شیمی راهی به سوی آینده‌ای روشن‌تر: صفحه‌های ۱۰۴ تا ۱۰۹)

۹۴- گزینه «۴»

(هاری مهری زاره)

با توجه به داده‌های سؤال داریم:



مول اولیه	n	۰	۰
تغییر مول	-۲x	+۲x	+x
مول در تعادل	n-۲x	۲x	x

$$nSO_3 = 2x \Rightarrow 2x = 0.6 \Rightarrow x = 0.3$$

$$\Rightarrow K = \frac{[SO_2]^2 [O_2]}{[SO_3]^2} \Rightarrow 75 \times 10^{-3} = \frac{(\frac{0.3}{V})^2 (\frac{0.3}{V})}{(\frac{0.6}{V})^2}$$

$$\Rightarrow \frac{0.3}{V} = 75 \times 10^{-3} \Rightarrow V = 4 \text{ L}$$


$$\Rightarrow n - 2x = 0.6 \Rightarrow n = 2x + 0.6 \xrightarrow{x=0.3}$$

$$\Rightarrow n = 2(0.3) + 0.6 \Rightarrow n = 1.2 \text{ mol}$$

(شیمی ۳ - شیمی راهی به سوی آینده‌ای روشن‌تر: صفحه‌های ۱۰۳ تا ۱۰۵)

۹۵- گزینه «۳»

(علی رضائی)



۱) رخ نمی‌دهد. در واکنش‌های گرماده با افزایش دما واکنش در جهت

برگشت جابه‌جا می‌شود و ثابت تعادل کاهش می‌یابد.



۲) رخ نمی‌دهد. وجود مول‌های گازی بیشتر در سمت واکنش دهنده‌ها باعث می‌شود با انجام واکنش در جهت برگشت فشار سامانه افزایش یابد.

۳) رخ می‌دهد. انجام واکنش در جهت برگشت باعث کاهش تولید فرآورده می‌شود.

۴) رخ نمی‌دهد. با افزایش دما سرعت واکنش رفت و برگشت افزایش می‌یابد.

(شیمی ۳- شیمی، راهی به سوی آینده‌ای روشن‌تر؛ صفحه‌های ۱۰۳ تا ۱۱۰)

۹۶- گزینه «۳» (مهم‌ر خائز نیا)

با توجه به این که واکنش موردنظر گرماده است، با افزایش دما، تعادل در جهت برگشت جابه‌جا می‌شود و در تعادل جدید، مجموع تعداد مول NH_3 و N_2 کاهش می‌یابد. زیرا اگر $2x$ مول از مقدار NH_3 مصرف شود، x مول N_2 تولید می‌شود در نتیجه مجموع مول‌های این دو گاز، x مول کاهش می‌یابد.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: با افزودن مقداری N_2 به ظرف، تعادل در جهت رفت جابه‌جا می‌شود و در تعادل جدید، مجموع تعداد مول NH_3 و H_2 کاهش می‌یابد. زیرا با مصرف $3x$ مول H_2 ، $2x$ مول NH_3 تولید می‌شود و مجموع مول‌های این دو گاز، x مول کاهش می‌یابد.

گزینه «۲»: با افزایش حجم ظرف، غلظت همه گازها در تعادل جدید در مقایسه با تعادل اولیه کمتر می‌شود.

گزینه «۴»: با افزایش فشار (کاهش حجم)، غلظت همه گازها در تعادل جدید در مقایسه با تعادل اولیه بیشتر می‌شود.

(شیمی ۳- شیمی، راهی به سوی آینده‌ای روشن‌تر؛ صفحه‌های ۱۰۴ تا ۱۱۰)

۹۷- گزینه «۴» (امیرعلی بیات)

فرایند هابر فرایندی گرماده است و در شرایط بهینه دما را تا 450°C درجه سلسیوس و فشار را تا 200 اتمسفر افزایش می‌دهند این فرایند در حضور کاتالیزگر آهن انجام می‌شود و با کاهش دما تا حدود منفی 40°C درجه کمتر از نقطه جوش آمونیاک و بیشتر از نقطه جوش هیدروژن و نیتروژن، آمونیاک را به صورت مایع خارج می‌کنند.


(شیمی ۳- شیمی، راهی به سوی آینده‌ای روشن‌تر؛ صفحه‌های ۱۰۳ و ۱۰۹ و ۱۱۰)

(برگرفته از متن کتاب)

۹۸- گزینه «۱»

(جعفر بازوکی)

گزینه «۱»: $+2 = 2(0) + 4(-1) + 2(+3)$ = مجموع عدد اکسایش



گزینه «۲»: افشانه‌های بی‌حس کننده موضعی را از واکنش گاز اتیلن (اتن) با هیدروژن کلرید (HCl) به دست می‌آورند.

گزینه «۳»: پلی‌اتیلن ترفتالات یک پلی‌استر می‌باشد.

گزینه «۴»: از واکنش گاز اتن با محلول آبی و رقیق پتاسیم پرمنگنات، در شرایط مناسب اتیلن گلیکول با فرمول شیمیایی $\text{C}_2\text{H}_6\text{O}_2$ تولید می‌شود.

(شیمی ۳- شیمی، راهی به سوی آینده‌ای روشن‌تر؛ صفحه‌های ۱۱۲ تا ۱۱۶)

۹۹- گزینه «۴» (حسن رحمتی کوکند)

بررسی گزینه‌های نادرست:

گزینه «۱»: پلیمرهای سنتزی مانند PET زیست تخریب ناپذیر هستند.

گزینه «۲»: مونومرهای سازنده PET در نفت خام وجود ندارند و از اتن و پارازایلن برای تهیه آنها استفاده می‌شود.

گزینه «۳»: در تهیه اتیلن گلیکول از اتن از محلول آبی و رقیق پتاسیم پرمنگنات به عنوان اکسنده استفاده می‌شود.

(شیمی ۳- شیمی، راهی به سوی آینده‌ای روشن‌تر؛ صفحه‌های ۱۱۵ تا ۱۱۹)

۱۰۰- گزینه «۴» (امیر حاتمیان)

بررسی همه گزینه‌ها:

۱) واکنش تبدیل گازهای هیدروژن و کربن مونوکسید به متانول در حضور

کاتالیزگر، دمای 350°C و فشار $50-30$ اتمسفر انجام می‌شود.

۲) فشار در نقطه P بین $50-30$ atm متغیر است:

$$50 - 30 = 20 \text{ atm}$$

۳) دمای $350^\circ\text{C} = \theta_1$ و $450^\circ\text{C} = \theta_2$ است. پس داریم:

$$\theta_1 > \theta_2 \text{ : دما}$$



(شیمی ۳- شیمی، راهی به سوی آینده‌ای روشن‌تر؛ صفحه‌های ۱۲۰ و ۱۲۱)

(برگرفته از نمودار کتاب)