



گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی

آزمون ماز | پایه دوازدهم



جامع شبیه ساز کنکور سراسری (۲)
(تعداد سؤالات مطابق کنکور سراسری)



ویژه کنکوری های ۱۴۰۵

دفترچه پاسخ

پنجشنبه ۲۸ خردادماه ۱۴۰۵

- ✓ پاسخنامه سریع؛ برای بررسی فوری بعد از آزمون
- ✓ تحلیل تمام گزینه های هر سؤال؛ برای بررسی سؤالاتی که پاسخ نادرست داده اید
- ✓ نکات و درسنامه های آموزشی؛ برای یادگیری کامل مباحث هر سؤال
- ✓ مشاوره تستی؛ برای یادگیری انواع روش های حل تست
- ✓ استراتژی آزمون؛ برای یادگیری مدیریت زمان و مدیریت جلسه آزمون

دیس	مسئول درس	طراحان	ویراستاران
ریاضیات	مهرداد کیوان حسین شفیع زاده سید جواد نظری	حسین شفیع زاده - مهرداد کیوان علی منصف شکری - رسول حاجی زاده سید جواد نظری	ندا فرهختی - مائده بادن فیروز حمیدرضا ولی پور - مهرداد اسپیدکار یزدان نیک قدم - فواد خیر آبادی علی اسدی
فیزیک	سجاد صادقی زاده سعید احمدی	سعید احمدی - سجاد صادقی زاده - مجید رجبی وندچالی حسین عبدوی نژاد - محمد جواد سورچی - مهدی پارسا زهره آقامحمدی - امیررضا خونی ها - سارا قانع هادی حمزه پور - محمد نظری - مهران تاکلی امیرحسین اکبری	محمد جواد سورچی حنا خلعتبری
شیمی	فرشاد هادیان فرد	فرشاد هادیان فرد - فرهنگ امیری عالیه میرزایی - طاها حق بین - علی ترابی مهسا بایمانی نژاد	طاها حق بین - محمد دارابی جم امیرعلی حسینی فرد محمد مهدی معظمی

تیم اجرایی و تولید آزمون

مجتبی آدمیان

نازنین امیری

مائده بادن فیروز

زهره جعفری

مدیر تولید آزمون: محدثه شیخعلی



یک تیم با بیش از ۵۰۰ نفر در حال کار هستن تا آزمون های ماز با حداکثر کیفیت حاضر بشن و به شما کمک کنن و مسیر موفقیت رو براتون ساده تر کنن. همیشه از نظرات و کامنت های خوبتون انرژی می گیریم. مرسی که همراهمون هستین. راستی! حتماً در نظرسنجی آزمون شرکت کنین و نظرات و پیشنهاداتتون رو برامون بنویسین.

دکتر رسول خنجری

این روزها چطور آروم تر باشم؟

راستش این روزها خیلی از بچه ها به جور نگرانی توی دلشون دارن. یکی به امتحان فکر می کنه، یکی به درس هایی که هنوز کامل نخونده، یکی هم به آزمون هایی که جلوشه. بعضی وقت ها هم آدم دقیق نمی دونه چرا نگران شده؛ فقط حس می کنه ذهنش شلوغه و مدام از به فکر می ره سراغ به فکر دیگه. توی این حالت حتی ممکنه جلوی کتاب بشینی، ولی حواست درست جمع نشه.

توی یکی از آزمون های اخیر، قبل از اعلام کارنامه از دانش آموز های متوسطه دوم پرسیدیم:

«برای افزایش آرامش درونی خودت در این روزها چه کارهایی می کنی؟»

جواب ها به نکته جالب داشت؛ آرامش معمولاً از کارهای ساده و قابل انجام به دست میاد.

در ادامه چند مورد از پرتکرارترین پیشنهاد های دانش آموز های مازی رو می خونی:

۱

از چیزهایی که استرس می ده کمی فاصله بگیر

خیلی از بچه ها گفته بودن سعی می کنن از چیزهایی که استرسشون رو زیاد می کنه فاصله بگیرن. مثلاً مدام دنبال خبر های ناراحت کننده نمی رن یا هر حرف و شایعه ای رو جدی نمی گیرن. بعضی وقت ها آدم هنوز خودش نگران نشده، اما با شنیدن نگرانی های دیگران استرس می گیره. برای همین بهتره حواسمون باشه چه چیزهایی رو وارد ذهنمون می کنیم.

۲

برنامه داشتن، مغز رو آروم تر می کنه

خیلی از دانش آموز ها می گفتن وقتی روی درس و برنامه تمرکز می کنن، آرامش بیشتری دارن. وقتی بدونی امروز دقیقاً چه کاری قراره انجام بدی، ذهنت کمتر درگیر نگرانی می شه. مثلاً مشخص باشه که قراره به بحث رو بخونی، چند تا سؤال حل کنی و بعدش استراحت داشته باشی. همین برنامه ساده باعث می شه احساس کنی اوضاع دست خودته و قدم به قدم جلو می ری.

۳

فقط درس خواندن کافی نیست؛ باید بدنت هم آروم بشه

خیلی ها گفته بودن برای آروم شدن فقط درس خواندن کافی نیست. بدن هم باید از حالت فشار خارج بشه. بعضی ها با موسیقی، بعضی ها با دعا و عبادت، بعضی ها با پیاده روی، ورزش سبک یا چند حرکت کششی آروم می شن. حتی به استراحت کوتاه هم می تونه به مغز کمک کنه با انرژی بیشتری به درس برگرده.

بعضی از دانش آموزها می گفتن وقتی با دوست هاشون حرف می زنن یا با هم درس می خونن، استرسشون کمتر می شه. چون متوجه می شن فقط خودشون نیستن که این روزها نگرانی دارن. حرف زدن با یه آدم مطمئن، مثل دوست، پدر و مادر، معلم یا مشاور، خیلی وقتها باعث می شه نگرانی ها قابل مدیریت تر به نظر برسن.

با خودت خوب حرف بزنی

یه نکته جالب دیگه هم این بود که خیلی ها سعی می کنن با خودشون امیدوارانه تر حرف بزنی. مثلاً به خودشون یادآوری می کنن که دارن تلاش می کنن، یا به موفقیت آینده فکر می کنن. بعضی ها هم با دعا و توکل آروم تر می شن. این جور فکرها کمک می کنه آدم وسط سختی ها امیدش رو از دست نده.

کارهای بزرگ را فرد کن


یکی از کاربردی ترین پیشنهادها این بود که کارهای بزرگ رو به بخش های کوچک تر تقسیم کنیم. مثلاً به جای اینکه بگی «باید کل این درس رو بخونم»، بگو «فعلاً چند صفحه می خونم» یا «چند تا سؤال حل می کنم». وقتی کارها کوچک تر می شن، شروع کردنشون راحت تر می شه و نگرانی هم کمتر می شه. خیلی وقتها فقط کافیه قدم اول رو برداری؛ ادامه مسیر از چیزی که فکر می کنی ساده تره.

خلاصه اینکه...

در نهایت، چیزی که از حرف های این دانش آموزها می شه فهمید اینه که آرامش یه چیز جادویی نیست که یه دفعه از آسمون بیفته. بیشتر وقتها با همین کارهای ساده به دست میاد: کمتر درگیر چیزهای استرس زا شدن، داشتن یه برنامه ساده، کمی استراحت و حرکت، حرف زدن با آدم های مطمئن و قدم به قدم جلو رفتن.

و شاید مهم ترین نکته این باشه که برونیم اگر این روزها گاهی نگران می شیم، کاملاً طبیعیه. خیلی ها همین حس رو دارن. مهم اینه که بلد باشیم کم کم حال ذهنمون رو بهتر کنیم و برونیم با چند قدم ساده می شه دوباره آروم تر شد.

راهنمای پاسخنامه آزمون‌ها



یادتون باشه:

- ✓ هر سؤال یک فرصت یادگیری، نه یک مانع.
- ✓ پاسخنامه فقط جواب نیست؛ یک کارگاه آموزشی کامله.
- ✓ با هر آزمون و مرور این پاسخنامه، یک پله بالاتر می‌رید و یک قدم به رؤیایون نزدیک‌تر می‌شید.
- ✓ موفقیت فقط برای کسانی که با برنامه و انگیزه حرکت می‌کنن. شما همون آدمید.



برای دیدن پاسخنامه ویدئویی آزمون
QRcode بالا را اسکن کنید!
یا بر روی لینک زیر کلیک کنید!

پاسخنامه ویدئویی

ریاضی ۱ + حسابان ۱ + حسابان ۲: کل کتاب
هندسه ۱ + هندسه ۲ + هندسه ۳: کل کتاب
آمار و احتمال: کل کتاب
گسسته: کل کتاب

بودجه‌بندی
این آزمون

حسابان ۲: این مبحث در مجموع ۶ تست از ۴۰ تست کنکور را پوشش داده است.
حسابان ۱: این مبحث در مجموع ۱۰ تست از ۴۰ تست کنکور را پوشش داده است.
ریاضی ۱: این مبحث در مجموع ۴ تست از ۴۰ تست کنکور را پوشش داده است.
هندسه ۳: این مبحث در مجموع ۴ تست از ۴۰ تست کنکور را پوشش داده است.
هندسه ۲: این مبحث در مجموع ۴ تست از ۴۰ تست کنکور را پوشش داده است.
هندسه ۱: این مبحث در مجموع ۴ تست از ۴۰ تست کنکور را پوشش داده است.
گسسته: این مبحث در مجموع ۴ تست از ۴۰ تست کنکور را پوشش داده است.
آمار و احتمال: این مبحث در مجموع ۴ تست از ۴۰ تست کنکور را پوشش داده است.

سهم در
کنکور

۱- a_n جمله عمومی یک دنباله حسابی و $b_n = 2 \times 3^{n-1}$ است. اگر دو جمله ابتدایی دنباله‌ها باهم برابر باشند، مجموع ده جمله ابتدایی دنباله حسابی کدام است؟

۱۶۰ (۴)

۲۰۰ (۳)

۲۴۰ (۲)

۲۲۰ (۱)

(آسان - محاسباتی - سریع) - حسابان ۱ صفحه ۳ - ۱۱۰۱

پاسخ: گزینه ۳

ابتدا جمله اول و دوم دنباله b_n را به دست می‌آوریم:

$$b_n = 2 \times 3^{n-1} \Rightarrow b_1 = 2, b_2 = 6$$

پس جملات ابتدایی دنباله حسابی $a_1 = 2$ و $a_2 = 6$ است. در دنباله حسابی اختلاف هر دو جمله متوالی برابر با قدرنسبت است:

$$d = 6 - 2 = 4$$

پس جمله عمومی آن به صورت $a_n = 4n - 2$ است. بنابراین طبق فرمول مجموع جملات دنباله حسابی داریم:

$$S_n = \frac{n}{2} ((2a_1 + (n-1)d))$$

$$S_{10} = 5(2 \times 2 + 9 \times 4) = 200$$

دنباله حسابی

دنباله حسابی دنباله‌ای است که در آن، هر جمله (به جز جمله اول) از اضافه شدن یک عدد ثابت به نام قدرنسبت (d) به جمله قبل از خود به دست می‌آید. جمله عمومی دنباله به صورت زیر می‌باشد:

$$\begin{array}{ccc} \text{شماره جمله} & & \text{جمله عمومی} \\ \uparrow & & \uparrow \\ a_n & = & a_1 + (n-1)d \\ \downarrow & & \downarrow \\ \text{جمله اول} & & \text{قدرنسبت} \end{array}$$

اگر هر جمله را از جمله قبلی کم کنیم قدرنسبت به دست می‌آید:

$$d = a_{m+1} - a_m$$


 دنباله هندسی

به دنباله‌ای که در آن هر جمله (به جز جمله اول) از ضرب عددی ثابت و غیرصفر در جمله قبلی‌اش به دست می‌آید، **دنباله هندسی** می‌گوییم. به این مقدار ثابت، **قدرنسبت** دنباله می‌گوییم و آن را با r (یا q) نمایش می‌دهیم. **جمله اول دنباله هندسی هیچ‌گاه صفر نیست.**

$$r = \frac{a_2}{a_1} = \frac{a_3}{a_2} = \frac{a_4}{a_3} = \dots$$

جمله عمومی دنباله هندسی به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$a_n = a_1 \times r^{n-1}$$



 مجموع جملات دنباله حسابی

اگر a_1 جمله اول و d قدرنسبت دنباله حسابی باشد، مجموع n جمله اول دنباله برابر است با:

$$S_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n = \frac{n}{2} (2a_1 + (n-1)d) = \frac{n}{2} (a_1 + a_n)$$

 مجموع جملات دنباله هندسی

اگر a_1 جمله اول و $r \neq 1$ قدرنسبت دنباله هندسی باشد، مجموع n جمله اول دنباله برابر است با:

$$S_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n = \frac{a_1(r^n - 1)}{r - 1}$$



۲- اگر $\frac{a}{\sqrt{2}} = \sqrt{3} + \sqrt{5} + \frac{\sqrt{2}}{2}$ باشد مقدار $a - 2$ کدام است؟

$$\frac{2\sqrt{5}}{3} \quad (4)$$

$$\frac{2\sqrt{10}}{5} \quad (3)$$

$$\sqrt{5} \quad (2)$$

$$\frac{\sqrt{5}}{2} \quad (1)$$

(آسان - خطبه‌خط - سریع) - ریاضی ۱ صفحه ۶۲ - ۱۰۰۳

پاسخ: گزینه ۲

ابتدا دو طرف را در $\sqrt{2}$ ضرب می‌کنیم:

$$a = \sqrt{2}(\sqrt{3} + \sqrt{5} + \frac{\sqrt{2}}{2}) = \sqrt{6} + 2\sqrt{5} + 1 = \sqrt{(\sqrt{5} + 1)^2} + 1 = \sqrt{5} + 1 + 1 = \sqrt{5} + 2$$

$$\Rightarrow a - 2 = \sqrt{5}$$

رادیكال مرکب

در مورد رادیكال مرکب دو قانون زیر را بلد باشید:

(۱) رادیكال مرکب به فرم $\sqrt{A \pm 2\sqrt{B}}$

برای ساده کردن عبارت‌های رادیكالی به این فرم باید عبارت زیر رادیكال را به کمک اتحاد مربع دوجمله‌ای به صورت مربع کامل نوشته و آن را از زیر رادیكال خارج کنیم:

$$\sqrt{A \pm 2\sqrt{B}} = |\sqrt{X} \pm \sqrt{Y}| \quad (X + Y = A, XY = B)$$

یه نمونه باحال ببین!

$$\sqrt{7 + 2\sqrt{6}}$$

$$x + y = 7, x \times y = 6 \Rightarrow x = 6, y = 1 \Rightarrow \sqrt{7 + 2\sqrt{6}} = |\sqrt{6} + \sqrt{1}| = \sqrt{6} + 1$$

در واقع زیر رادیكال را به صورت $7 + 2\sqrt{6} = 6 + 2\sqrt{6} + 1 = (\sqrt{6} + 1)^2$ نوشتیم!

$$\sqrt{8 - 2\sqrt{15}} \xrightarrow[\substack{8=5+3 \\ 15=5 \times 3}]{\substack{8=5+3 \\ 15=5 \times 3}} \sqrt{8 - 2\sqrt{15}} = \sqrt{(\sqrt{5})^2 + (\sqrt{3})^2 - 2(\sqrt{5} \times \sqrt{3})} = \sqrt{(\sqrt{5} - \sqrt{3})^2} = |\sqrt{5} - \sqrt{3}| = \sqrt{5} - \sqrt{3}$$

(۲) رادیكال مرکب به فرم $\sqrt{a \pm \sqrt{b}}$

$$\sqrt{a \pm \sqrt{b}} = \sqrt{\frac{a+c}{2}} \pm \sqrt{\frac{a-c}{2}}, \quad c = \sqrt{a^2 - b}$$

ساده کردن فرجه و توان

برای ساده کردن توان و فرجه به شرط آن که n, m و k طبیعی باشند، داریم:

$$\begin{cases} nk\sqrt[n]{a^{mk}} = \sqrt[n]{a^{mk}} & (k \text{ فرد}) \\ nk\sqrt[n]{a^{mk}} = \sqrt[n]{|a|^m} & (k \text{ زوج}) \end{cases}$$



۳- به ازای چند مقدار صحیح k ، نمودار تابع $y = \frac{x+k}{x^2+x+3}$ همواره بین دو خط $y=1$ و $y=-1$ است؟

۲ (۴)

۳ (۳)

۴ (۲)

۵ (۱)

(متوسط - خط به خط - استاندارد ۶) - ریاضی ۱ صفحه ۹۳ - ۱۰۰۴

پاسخ: گزینه ۲

$$-1 < \frac{x+k}{x^2+x+3} < 1$$

برای این که نمودار بین دو خط مذکور باشد، باید نامعادله $-1 < y < 1$ برای هر x برقرار باشد. پس:

$x^2 + x + 3$ همواره مثبت است، پس هر ۳ طرف نامساوی را می‌توان بدون تغییر جهت نامساوی در آن ضرب کرد:

$$\Rightarrow -x^2 - x - 3 < x + k < x^2 + x + 3$$

$$\begin{cases} p \vee (p \wedge q) \equiv p \\ p \wedge (p \vee q) \equiv p \end{cases} \quad \text{قانون جذب}$$

$$\begin{cases} p \vee (q \vee r) \equiv (p \vee q) \vee r \\ p \wedge (q \wedge r) \equiv (p \wedge q) \wedge r \end{cases} \quad \text{شرکت پذیری}$$

$$\begin{cases} \sim (p \vee q) \equiv \sim p \wedge \sim q \\ \sim (p \wedge q) \equiv \sim p \vee \sim q \end{cases} \quad \text{قوانین دمورگان}$$

$$p \Rightarrow q \equiv \sim p \vee q \quad \text{تبدیل ترکیب شرطی به ترکیب فصلی}$$

$$p \Rightarrow q \equiv \sim q \Rightarrow \sim p \quad \text{گزاره شرطی هم‌ارز با عکس و نقیض آن است.}$$

$$\begin{cases} T \vee p \equiv T \\ T \wedge p \equiv p \end{cases}$$

$$\begin{cases} F \vee p \equiv p \\ F \wedge p \equiv F \end{cases}$$

$$\begin{cases} p \Leftrightarrow q \equiv (p \Rightarrow q) \wedge (q \Rightarrow p) \\ p \Leftrightarrow q \equiv \sim p \Leftrightarrow \sim q \\ p \Leftrightarrow q \equiv (p \vee q) \Rightarrow (p \wedge q) \\ \sim (p \Leftrightarrow q) \equiv (\sim p \Leftrightarrow q) \equiv (p \Leftrightarrow \sim q) \end{cases}$$



۵- اگر اختلاف دو ریشه حقیقی و متمایز معادله $ax^2 - 2ax - 5 = 0$ برابر ۳ باشد، مجموع معکوس‌های ریشه‌ها کدام است؟

(۴) $-1/6$

(۳) $-1/2$

(۲) $1/4$

(۱) $1/8$

(آسان - خط‌خط - سریع) - حسابان ۱ صفحه ۸ - ۱۱۰۱

پاسخ: گزینه ۴

می‌دانیم اختلاف ریشه‌های معادله درجه دوم برابر است با:

$$|\alpha - \beta| = \frac{\sqrt{\Delta}}{|a|} = \frac{\sqrt{4a^2 + 20a}}{|a|} = 3 \Rightarrow 4a^2 + 20a = 9a^2 \Rightarrow 5a^2 = 20a \xrightarrow{a \neq 0} a = 4$$

حال برای محاسبه مجموع معکوس ریشه‌ها داریم:

$$\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} = \frac{\alpha + \beta}{\alpha\beta} = \frac{\frac{2a}{-5}}{\frac{-5}{a}} = -\frac{2a}{5} = -\frac{8}{5} = -1/6$$

روابط بین جواب‌های معادله درجه دوم

اگر α و β جواب‌های معادله $ax^2 + bx + c = 0$ باشند ($\Delta > 0$)، آن‌گاه:

$$۱) S = \alpha + \beta = -\frac{b}{a}$$

$$۲) P = \alpha \times \beta = \frac{c}{a}$$

$$۳) |\alpha - \beta| = \frac{\sqrt{\Delta}}{|a|}$$

$$۴) \alpha^2 + \beta^2 = S^2 - 2P$$

$$۵) \alpha^3 + \beta^3 = S^3 - 3PS$$

$$۶) \sqrt{\alpha} \pm \sqrt{\beta} = \sqrt{S \pm 2\sqrt{P}} \quad (\alpha, \beta > 0)$$



راهنمای زرنگ بازی!

سعی نکن روابط بالا رو حفظ کنی! همیشه یادت باشه که با **اتحادها** و یکم **عملیات جبری** می‌تونن هر عبارتی رو که **برحسب ریشه‌ها** دادن، **برحسب S و P** بنویسی. مثلاً:

به کمک اتحاد مربع دو جمله‌ای داریم:

$$\alpha^{\mathfrak{r}} + \beta^{\mathfrak{r}} = (\alpha + \beta)^{\mathfrak{r}} - \mathfrak{r}\alpha\beta = S^{\mathfrak{r}} - \mathfrak{r}P$$

به کمک اتحاد مکعب دوجمله‌ای داریم:

$$\alpha^{\mathfrak{r}} + \beta^{\mathfrak{r}} = (\alpha + \beta)^{\mathfrak{r}} - \mathfrak{r}\alpha\beta(\alpha + \beta) = S^{\mathfrak{r}} - \mathfrak{r}PS$$

۶- هرگاه $x=4$ جواب معادله $\sqrt{x}-\sqrt{x-a}=1$ باشد، جواب معادله $\sqrt{x+3a}-\sqrt{x}=1$ چه عددی است؟

(۱) ۹	(۲) ۲۵	(۳) ۱۶	(۴) ۴
-------	--------	--------	-------

(متوسط - محاسباتی - استاندارد ۵) - حسابان ۱ صفحه ۲۱ - ۱۱۰۱)

پاسخ: گزینه ۳

$x = 4$ جواب معادله است پس در آن صدق می‌کند، به عبارتی:

$$\sqrt{f} - \sqrt{f-a} = 1 \Rightarrow \sqrt{f-a} = 1 \Rightarrow a = 3$$

به این ترتیب:

$$\sqrt{x+9} - \sqrt{x} = 1 \Rightarrow \sqrt{x+9} = 1 + \sqrt{x}$$

طرفین را به توان ۲ می‌رسانیم:

$$x+9 = x+1+2\sqrt{x} \Rightarrow 2\sqrt{x} = 8 \Rightarrow \sqrt{x} = 4 \Rightarrow x = 16$$



حل معادلات رادیکالی (گنگ)

برای حل معادلهٔ رادیکالی، **رادیکال را در یک طرف تساوی** نگه می‌داریم و **بقیه عبارت‌ها را در طرف دیگر** نگه می‌داریم. سپس طرفین تساوی را **به توان ۲** می‌رسانیم.

با حل معادله حاصل در نهایت چک می‌کنیم که **جواب‌ها در معادله اولیه صدق کنند.**

حل معادلات گویا

برای حل معادلات گویا، دو طرف تساوی را در ک.م.م مخرج‌ها یعنی **مخرج مشترک** کسر‌ها ضرب می‌کنیم تا مخرج از بین برود. با حل معادلهٔ حاصل، جواب‌ها را می‌یابیم.

اما توجه کنید که در نهایت جواب‌هایی قابل قبول هستند که **هیچ‌یک از مخرج‌ها را صفر نکنند**.

۷- تابع خطی f محورهای مختصات را در نقاط $A(a, 0)$ و $B(0, -2a)$ قطع کرده است. طول نقطه تلاقی آن با نیمساز ناحیه دوم کدام است؟

$$\frac{a}{r}(\mathfrak{r}) \qquad \frac{\mathfrak{r}a}{r}(\mathfrak{r}) \qquad \frac{a}{r}(\mathfrak{r}) \qquad \frac{\mathfrak{r}a}{r}(\mathfrak{r})$$

(آسان - ترکیبی - سریع ۶) - ریاضی ۱ صفحہ ۱۰۳ و حسابان ۱ صفحہ ۳۱ - ۱۰۰۵ و ۱۱۰۱)

یاسخ: گزینہ ۱ 

شیب خط و عرض از مبدأ آن به صورت زیر به دست می آید:

$$y_B = -2a = \text{عرض از مبدأ و } 2 = \frac{y_A - y_B}{x_A - x_B} = \frac{0 + 2a}{a - 0} = \text{شیب خط}$$

یس ضابطه تابع خطی f به صورت $f(x) = 2x - 2a$ است.

از طرفی قرار است نیمساز ناحیه دوم یعنی $y = -x$ را قطع کند، پس:

$$\begin{cases} f(x) = 2x - 2a \\ y = -x \end{cases} \Rightarrow -x = 2x - 2a \Rightarrow x = \frac{2a}{3}$$

معادله خط

اگر $A(x_1, y_1)$ و $B(x_2, y_2)$ دو نقطه در دستگاه مختصات باشند:

AB شیب پاره‌خط: $m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$

AB معادله پاره‌خط: $y - y_1 = m(x - x_1)$

عرض از مبدأ

در معادله خط $y = ax + b$ ، b عرض از مبدأ و محل تلاقی خط با محور y ها یعنی $(0, b)$ است.



۸- تابع $f(x) = 3 - \sqrt{4 - x}$ را نسبت به مبدأ مختصات بازتاب کرده و سپس a واحد به سمت چپ انتقال می‌دهیم، تابع به دست آمده را g می‌نامیم. هرگاه $\text{gof}(3) = 1$ باشد، مقدار a کدام است؟

۱۰ (۴)

۸ (۳)

۱۲ (۲)

۶ (۱)

(متوسط - محاسباتی - استاندارد) - حسابان ۲ صفحه ۱۲ - ۱۲۰۱

پاسخ: گزینه ۴

وقتی نموداری نسبت به مبدأ مختصات بازتاب می‌شود، همزمان x به $-x$ و y به $-y$ تبدیل می‌گردد. پس:

$$y = -(3 - \sqrt{4 - (-x)}) \Rightarrow y = -3 + \sqrt{4 + x}$$

اما باید نمودار را a واحد به چپ انتقال دهیم، پس:

$$\xrightarrow{x \rightarrow x+a} g(x) = -3 + \sqrt{x+a+4}$$

با توجه به آن که:

$$\text{gof}(3) = 1 \Rightarrow g(f(3)) = 1$$

$$\xrightarrow{f(3)=2} g(2) = 1 \Rightarrow -3 + \sqrt{6+a} = 1$$

$$\Rightarrow \sqrt{6+a} = 4 \Rightarrow 6+a = 16 \Rightarrow a = 10$$

انتقال و قرینه توابع

نمودار جدید ($a > 0$)	توضیحات و نحوه رسم
$f(x+a)$	نمودار تابع f را به اندازه a واحد در راستای محور x ها به سمت چپ منتقل می‌کنیم.
$f(x-a)$	نمودار تابع f را به اندازه a واحد در راستای محور x ها به سمت راست منتقل می‌کنیم.
$f(x)+a$	نمودار تابع f را به اندازه a واحد در راستای محور y ها به سمت بالا منتقل می‌کنیم.
$f(x)-a$	نمودار تابع f را به اندازه a واحد در راستای محور y ها به سمت پایین منتقل می‌کنیم.
$f(-x)$	نمودار تابع f را نسبت به محور y ها قرینه می‌کنیم.
$-f(x)$	نمودار تابع f را نسبت به محور x ها قرینه می‌کنیم.



۹- اگر $f(x) = \frac{a}{x-2}$ و $f(3) = 2f^{-1}(1) - 1$ باشد، مقدار a کدام است؟

- ۱ (۱) ۲ (۲) ۳ (۳) ۴ (۴)

(متوسط - خط به خط - استاندارد) - حسابان ۱ صفحه ۶۱ - ۱۱۰۲

پاسخ: گزینه ۳

ابتدا $f^{-1}(1)$ را به دست می آوریم.

$$1 = \frac{a}{x-2} \Rightarrow x-2 = a \Rightarrow x = 2+a \Rightarrow f^{-1}(1) = 2+a$$

$$f(3) = 2f^{-1}(1) - 1 \Rightarrow \frac{a}{3-2} = 2(2+a) - 1 \Rightarrow a = -3$$

وارون تابع

در تابع یک به یک f ، اگر جای x و y را عوض کنیم وارون تابع f یعنی f^{-1} به دست می آید. نمودار f^{-1} قرینه نمودار f نسبت به خط $y = x$ است.

یه نکته طلایی!

$$\text{اگر } f^{-1}(a) = b \text{ باشد، آن گاه: } f(b) = a$$

•• iro ••

۱۰- اگر $\log_2 a = b$ و $\log_2(a+2) = b+2$ باشد، مقدار 2^{1-b} کدام است؟

- ۱ (۱) ۲ (۲) ۳ (۳) ۴ (۴)

(متوسط - محاسباتی - استاندارد) - حسابان ۱ صفحه ۸۶ - ۱۱۰۳

پاسخ: گزینه ۳

دو رابطه را از هم کم می کنیم:

$$\Rightarrow \log_2(a+2) - \log_2 a = 2$$

$$\Rightarrow \log_2 \frac{a+2}{a} = 2 \Rightarrow \frac{a+2}{a} = 4 \Rightarrow 4a = a+2 \Rightarrow a = \frac{2}{3}$$

حال با داشتن a مقدار 2^{1-b} را می توان ساخت:

$$\log_2 a = b \Rightarrow 2^b = a = \frac{2}{3}$$

$$\xrightarrow{\text{معکوس}} 2^{-b} = \frac{3}{2} \xrightarrow{\times 2} 2 \times 2^{-b} = 3$$



$$\Rightarrow 2^{1-b} = 3$$

تابع لگاریتمی و نمودار آن

با شرط $a > 0$ و $a \neq 1$ ، $y = \log_a x$ تابع لگاریتمی با دامنه $x > 0$ است، به طوری که:

$$\log_a x = b \Leftrightarrow x = a^b$$

نمودار تابع لگاریتمی به یکی از دو حالت زیر است:



ارتباط لگاریتم و نمایی

تابع $y = \log_a x$ وارون تابع نمایی $y = a^x$ است.

خواص لگاریتم

با شرط $a > 0$ و $a \neq 1$ داریم:

- ۱) $\log_a^b = c \Leftrightarrow b = a^c$
- ۲) $\log_a^a = 1, \log_a^1 = 0$
- ۳) $\log_a^{(bc)} = \log_a^b + \log_a^c$
- ۴) $\log_a^{(\frac{b}{c})} = \log_a^b - \log_a^c$
- ۵) $\log_a^{b^n} = n \log_a^b$
- ۶) $\log_{a^n}^b = \frac{1}{n} \log_a^b$
- ۷) $\log_a^b = \frac{1}{\log_b^a} \quad (b \neq 1)$



۱۱- اگر α حاده و $\sin 2\alpha = \cos^2 \alpha - 2$ باشد، مقدار $\tan \alpha$ کدام است؟

(۴) $\frac{1}{3}$

(۳) $\frac{1}{2}$

(۲) ۲

(۱) ۳

متوسط - محاسباتی - استاندارد - حسابان ۱ صفحه ۱۱۲ - ۱۱۰۴

پاسخ: گزینه ۲

$$2 - \cos^2 \alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha$$

$$\Rightarrow \frac{2}{\cos^2 \alpha} - 2 = \frac{2 \sin \alpha \cos \alpha}{\cos^2 \alpha}$$

$$\Rightarrow 2(1 + \tan^2 \alpha) - 2 = 2 \tan \alpha$$

$$\Rightarrow \tan^2 \alpha - \tan \alpha - 2 = 0 \xrightarrow{a+c=b} \begin{cases} \tan \alpha = -1 \\ \tan \alpha = 2 \end{cases}$$

اما از آن جا که α حاده است، تانژانت آن مثبت است.

$$\Rightarrow \tan \alpha = 2$$

$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cdot \cos \alpha$$

$$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha$$

$$\cos 2\alpha = 2 \cos^2 \alpha - 1$$

$$\cos 2\alpha = 1 - 2 \sin^2 \alpha$$

$$\tan 2\alpha = \frac{2 \tan \alpha}{1 - \tan^2 \alpha}$$

$$\sin 2\alpha = \frac{2 \tan \alpha}{1 + \tan^2 \alpha}$$

$$\cos 2\alpha = \frac{1 - \tan^2 \alpha}{1 + \tan^2 \alpha}$$

$$۱) \sin^2 x + \cos^2 x = 1$$

$$۲) \tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$$

$$۳) \cot x = \frac{\cos x}{\sin x}$$

$$۴) \tan x \times \cot x = 1$$

$$۵) 1 + \tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}$$

$$۶) 1 + \cot^2 x = \frac{1}{\sin^2 x}$$

۱۲- اگر انتهای کمان α در ناحیه سوم دایره مثلثاتی باشد، ساده شده عبارت $\sqrt{1 + \tan^2 \alpha} - \sqrt{\frac{1 + \sin \alpha}{1 - \sin \alpha}}$ کدام است؟

(۴) $\tan \alpha$

(۳) $-\tan \alpha$

(۲) $\sin \alpha$

(۱) $-\cos 2\alpha$

(متوسط - محاسباتی - استاندارد) - حسابان ۱ صفحه ۱۱۲ - ۱۱۰۴

پاسخ: گزینه ۴

روش اول

صورت و مخرج را در مزدوج مخرج ضرب کرده و از اتحاد $1 + \tan^2 \alpha = \frac{1}{\cos^2 \alpha}$ استفاده می‌کنیم:

$$\sqrt{1 + \tan^2 \alpha} - \sqrt{\frac{1 + \sin \alpha}{1 - \sin \alpha}} = \sqrt{\frac{1}{\cos^2 \alpha}} - \sqrt{\frac{(1 + \sin \alpha)(1 + \sin \alpha)}{(1 - \sin \alpha)(1 + \sin \alpha)}} = \left| \frac{1}{\cos \alpha} \right| - \sqrt{\frac{(1 + \sin \alpha)^2}{\cos^2 \alpha}} = \left| \frac{1}{\cos \alpha} \right| - \left| \frac{1 + \sin \alpha}{\cos \alpha} \right|$$

برای برداشتن قدرمطلق از آنجا که α در ناحیه سوم مثلثاتی است، داریم:

$$\pi < \alpha < \frac{3\pi}{2} \Rightarrow \begin{cases} -1 < \cos \alpha < 0 \\ -1 < \sin \alpha < 0 \Rightarrow 0 < 1 + \sin \alpha < 1 \end{cases}$$

پس:

$$= -\frac{1}{\cos \alpha} + \frac{1 + \sin \alpha}{\cos \alpha} = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \tan \alpha$$

روش دوم

از اتحادهای $1 \pm \sin \alpha = \left(\sin \frac{\alpha}{2} \pm \cos \frac{\alpha}{2} \right)^2$ و $1 + \tan^2 \alpha = \frac{1}{\cos^2 \alpha}$ استفاده می‌کنیم. پس:

$$\sqrt{1 + \tan^2 \alpha} - \sqrt{\frac{1 + \sin \alpha}{1 - \sin \alpha}} = \left| \frac{1}{\cos \alpha} \right| - \sqrt{\frac{\left(\sin \frac{\alpha}{2} + \cos \frac{\alpha}{2} \right)^2}{\left(\sin \frac{\alpha}{2} - \cos \frac{\alpha}{2} \right)^2}} = -\frac{1}{\cos \alpha} - \left| \frac{\sin \frac{\alpha}{2} + \cos \frac{\alpha}{2}}{\sin \frac{\alpha}{2} - \cos \frac{\alpha}{2}} \right|$$

حال برای برداشتن قدرمطلق عبارت دوم باید مشخص کنیم که علامت صورت و مخرج به ازای $\frac{\alpha}{2}$ چگونه است؟

$$\pi < \alpha < \frac{3\pi}{2} \Rightarrow \frac{\pi}{2} < \frac{\alpha}{2} < \frac{3\pi}{4} \Rightarrow \begin{cases} \sin \frac{\alpha}{2} > 0 \\ \cos \frac{\alpha}{2} < 0 \\ \left| \cos \frac{\alpha}{2} \right| < \left| \sin \frac{\alpha}{2} \right| \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \sin \frac{\alpha}{2} + \cos \frac{\alpha}{2} > 0 \\ \sin \frac{\alpha}{2} - \cos \frac{\alpha}{2} > 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \text{عبارت حاصل} = -\frac{1}{\cos \alpha} - \frac{\left| \frac{\sin \frac{\alpha}{2} + \cos \frac{\alpha}{2}}{\sin \frac{\alpha}{2} - \cos \frac{\alpha}{2}} \right|}{\frac{\cos^2 \frac{\alpha}{2} - \sin^2 \frac{\alpha}{2}}{\sin \frac{\alpha}{2} - \cos \frac{\alpha}{2}}} = -\frac{1}{\cos \alpha} - \frac{\sin \frac{\alpha}{2} + \cos \frac{\alpha}{2}}{\sin \frac{\alpha}{2} - \cos \frac{\alpha}{2}}$$

$$= -\frac{1}{(\cos \frac{\alpha}{2} - \sin \frac{\alpha}{2})(\cos \frac{\alpha}{2} + \sin \frac{\alpha}{2})} - \frac{\sin \frac{\alpha}{2} + \cos \frac{\alpha}{2}}{\sin \frac{\alpha}{2} - \cos \frac{\alpha}{2}} = -\frac{1}{(\sin \frac{\alpha}{2} - \cos \frac{\alpha}{2})(\cos \frac{\alpha}{2} + \sin \frac{\alpha}{2})} - \frac{\sin \frac{\alpha}{2} + \cos \frac{\alpha}{2}}{\sin \frac{\alpha}{2} - \cos \frac{\alpha}{2}}$$

$$= \frac{1 - (\sin \frac{\alpha}{2} + \cos \frac{\alpha}{2})^2}{(\sin \frac{\alpha}{2} - \cos \frac{\alpha}{2})(\cos \frac{\alpha}{2} + \sin \frac{\alpha}{2})} = \frac{1 - 1 - \sin \alpha}{-\cos \alpha} = \tan \alpha$$

به نکته طلایی!

$$1 \pm \sin 2\alpha = (\sin \alpha \pm \cos \alpha)^2$$

۱۳- اگر دوره تناوب تابع $y = 2 - 3 \sin(\frac{\pi}{a}x)$ برابر ۴ باشد، دوره تناوب $y = 3 + 2 \cos(a\pi x)$ چه عددی است؟

$$\frac{a}{4} \quad (۴)$$

$$4a \quad (۳)$$

$$\frac{a}{2} \quad (۲)$$

$$2a \quad (۱)$$

(متوسط - محاسباتی - سریع) - حسابان ۲ صفحه ۲۷ - ۱۲۰۲

پاسخ: گزینه ۲

$$y = 2 - 3 \sin(\frac{\pi}{a}x) \Rightarrow T_1 = \frac{2\pi}{\frac{\pi}{a}} = 2a = 4 \Rightarrow a = 2$$

در ابتدا داریم:

$$y = 3 + 2 \cos(2\pi x) \Rightarrow T_2 = \frac{2\pi}{2\pi} = 1$$

به این ترتیب:

با توجه به مقدار a عدد ۱ برابر با مقدار $\frac{a}{2}$ است.

دوره تناوب

دوره تناوب توابع زیر را به خاطر بسپارید. ($n \in \mathbb{N}$)

$$\begin{cases} y = \sin^{2n-1}(bx) \\ y = \cos^{2n-1}(bx) \end{cases} \Rightarrow T = \frac{2\pi}{|b|}$$

$$\begin{cases} y = \sin^{2n}(bx) \\ y = \cos^{2n}(bx) \end{cases} \Rightarrow T = \frac{\pi}{|b|}$$

$$\begin{cases} y = |\sin(bx)| \\ y = |\cos(bx)| \end{cases} \Rightarrow T = \frac{\pi}{|b|}$$

🎯 **کدام ضریب‌ها روی دوره تناوب تأثیر می‌دارن؟ فقط ضریب x**

اگر T دوره تناوب $f(x)$ باشد، آن‌گاه دوره تناوب $y = kf(x+a) + c$ نیز برابر T است. یعنی مقادیر c ، a و k تأثیری بر دوره تناوب ندارند و تنها **ضریب x** اهمیت دارد. ($k \neq 0$)



۱۴- تعداد جواب‌های $2\cos^2 x + \sin 2x = \sin x + \cos x$ در بازه $(0, 2\pi)$ چه عددی است؟

۶ (۴)

۵ (۳)

۴ (۲)

۲ (۱)

(متوسط - محاسباتی - استاندارد ۵) - حسابان ۲ صفحه ۴۰ - ۱۲۰۲

🔍 پاسخ: گزینه ۲

$$2\cos^2 x + 2\sin x \cos x = \sin x + \cos x$$


ابتدا از $2\cos x$ در سمت چپ تساوی **فاکتور** می‌گیریم:


$$2\cos x(\sin x + \cos x) = \sin x + \cos x \Rightarrow \begin{cases} \sin x + \cos x = 0 \Rightarrow \tan x = -1 \Rightarrow x = \frac{3\pi}{4}, \frac{7\pi}{4} \\ 2\cos x = 1 \Rightarrow \cos x = \frac{1}{2} \Rightarrow x = \frac{\pi}{3}, \frac{5\pi}{3} \end{cases}$$

پس در این بازه ۴ جواب دارد.

🔍 **معادله مثلثاتی**

برای حل معادله‌های مثلثاتی، آن‌ها را به کمک اتحادها و روابط مثلثاتی به یکی از سه شکل زیر تبدیل می‌کنیم:

$$۱) \sin x = \sin a \Rightarrow x = \begin{cases} 2k\pi + a \\ 2k\pi + \pi - a \end{cases}$$


$$۲) \cos x = \cos a \Rightarrow x = \begin{cases} 2k\pi + a \\ 2k\pi - a \end{cases}$$


$$۳) \tan x = \tan a \Rightarrow x = k\pi + a$$


🎯 **چند نکته درباره معادله‌های مثلثاتی**

۱) برای به‌دست آوردن جواب‌های معادله مثلثاتی روی یک بازه باید به جواب‌های بالا **مقدارهای مناسب** ($k \in \mathbb{Z}$) را بدهیم تا جواب‌های متعلق به آن بازه به‌دست آید.

۲) در جریان ساده کردن معادله، اگر به تساوی $AB = A$ رسیدیم و خواستیم A را از طرفین معادله **ساده** کنیم خود $A = 0$ یکی از جواب‌های معادله است.

۳) در جریان ساده کردن معادله، اگر مجبور شدیم طرفین معادله را به توان ۲ برسانیم حتماً جواب‌های معادله را در معادله اصلی **امتحان** می‌کنیم چون توان رساندن ممکن است جواب‌های اضافی ایجاد کند.

۴) حالت‌های خاص برای معادلات مثلثاتی عبارتند از:



۱۵- هرگاه $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x - \sqrt{x} + 5}{2x - \sqrt{ax+b}} = -\frac{6}{5}$ باشد، مقدار ab کدام است؟

۳ (۴)

۴ (۳)

۶ (۲)

۲ (۱)

(متوسط - محاسباتی - استاندارد) - حسابان ۱ صفحه ۱۴۴ - ۱۱۰۵

پاسخ: گزینه ۴

صورت کسر به‌ازای $x=1$ برابر صفر و حد عبارت عددی غیرصفر شده پس مخرج کسر هم به‌ازای $x=1$ برابر صفر خواهد شد. پس:

$$2x - \sqrt{ax+b} = 0 \xrightarrow{x=1} a+b=4 \quad (I)$$

بنابر قاعده هوییتال داریم:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{2 - \frac{7}{2\sqrt{x}}}{2 - \frac{a}{2\sqrt{ax+b}}} = -\frac{6}{5} \xrightarrow{(I)} \frac{2 - \frac{7}{2}}{2 - \frac{a}{4}} = -\frac{6}{5}$$

$$\Rightarrow \frac{-\frac{3}{2}}{\frac{4-a}{4}} = -\frac{6}{5} \Rightarrow \frac{12}{16-2a} = \frac{6}{5} \Rightarrow 96 - 12a = 60 \Rightarrow a = 3 \Rightarrow b = 1$$

در نتیجه:

$$ab = 3$$

روش دوم

در صورت کسر از تجزیه به کمک اتحاد جمله مشترک استفاده می‌کنیم و برای رفع ابهام نیز صورت و مخرج را در مزدوج مخرج ضرب می‌کنیم:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x - 7\sqrt{x} + 5}{2x - \sqrt{ax+b}} = \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{(\sqrt{x}-1)(2\sqrt{x}-5)}{2x - \sqrt{ax+b}} \times \frac{2x + \sqrt{ax+b}}{2x + \sqrt{ax+b}} \right)$$

$$\stackrel{(I)}{=} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(\sqrt{x}-1)(2\sqrt{x}-5)(2x + \sqrt{ax+b})}{4x^2 - (ax + 4 - a)} \stackrel{= \text{مجموع ضرایب مخرج}}{=} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(\sqrt{x}-1)(2\sqrt{x}-5)(2x + \sqrt{ax+b})}{(x-1)(4x+4-a)}$$

با استفاده از تجزیه به کمک اتحاد مزدوج داریم:

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(\cancel{\sqrt{x}-1})(2\sqrt{x}-5)(2x + \sqrt{ax+b})}{(\cancel{\sqrt{x}-1})(\sqrt{x}+1)(4x+4-a)} = \frac{-3(4)}{2(8-a)} = \frac{-12}{16-2a}$$

حال مقدار به دست آمده را برابر مقدار حد داده شده در صورت سؤال قرار می‌دهیم:

$$\frac{-12}{16-2a} = -\frac{6}{5} \Rightarrow 96 - 12a = 60 \Rightarrow a = 3 \Rightarrow b = 1$$

در نتیجه:

$$ab = 3$$

رفع ابهام 

برای رفع ابهام $\frac{0}{0}$ از کسرهای باید عامل صفرکننده را از صورت و مخرج حذف کنیم.

برای این کار استفاده از اتحادها بسیار سودمند است.

رفع ابهام رادیکالی 

اگر کسر شامل عبارات رادیکالی باشد باید به کمک اتحاد مزدوج یا اتحاد چاق و لاغر رادیکال را از بین برد و در نهایت به کمک روابط و اتحادها عامل صفرکننده را در صورت و مخرج ساده کرد.

قضیه هوییتال (HOP)

اگر $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{0}{0}$ و توابع $f(x)$ و $g(x)$ در $x = a$ مشتق پذیر باشند، برای محاسبه این حد مبهم، می توانیم از قضیه هوییتال استفاده کنیم و اگر مجدداً حد مبهم $(\frac{0}{0})$ شود باز هم قضیه هوییتال را تکرار می کنیم.

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} \stackrel{HOP}{=} \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

حالت های خاص جواب معادله درجه دوم

در معادله درجه دوم $ax^2 + bx + c = 0$ ، اگر $a + b + c = 0$ باشد، یکی از جواب ها ۱ و دیگری $\frac{c}{a}$ است.
در معادله درجه دوم $ax^2 + bx + c = 0$ ، اگر $a + c = b$ باشد، یکی از جواب ها (-1) و دیگری $-\frac{c}{a}$ است.



۱۶- به ازای چند مقدار صحیح a ، تساوی $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{ax+6}{ax^2+bx-3a} = -\infty$ برقرار است؟

۷ (۴)

۵ (۳)

۶ (۲)

۴ (۱)

متوسط - مفهومی - استاندارد (۱) - حسابان ۲ صفحه ۵۵ - ۱۲۰۳

پاسخ: گزینه ۳

چون حاصل حد بی نهایت شده، پس $x = 1$ ریشه مخرج است.

$$a + b - 3a = 0 \Rightarrow b = 2a$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{ax+6}{ax^2+2ax-3a} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{ax+6}{a(x^2+2x-3)} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{ax+6}{a(x-1)(x+3)} = \frac{a+6}{4a \times 0^+} = -\infty$$

پس $\frac{a+6}{4a} < 0$ است و در نتیجه با تعیین علامت به دست می آید:


$$-6 < a < 0$$

یعنی a دارای ۵ جواب صحیح است.

حد بی نهایت


در مسائل حد، اگر x به سمت عددی میل کند که در توابع کسری، مخرج کسر صفر شود (صفر حدی) ولی صورت کسر صفر نشود، در این صورت حاصل حد بی نهایت خواهد شد.
به این دسته از مسائل (حد بی نهایت) می گوئیم.

$$\frac{\text{عدد}}{\text{حدی}} = \infty$$




$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = -\infty$$




$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = +\infty$$



$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \text{وجود ندارد}$$



$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \text{وجود ندارد}$$

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = +\infty$$

در مسائل حد بی‌نهایت که جواب حد، عدد مشخصی نمی‌باشد، تابع **حد ندارد**.

 **حالت‌های ممکن حد بی‌نهایت**

$$\frac{\text{عدد مثبت}}{0^+} = +\infty$$

$$\frac{\text{عدد مثبت}}{0^-} = -\infty$$

$$\frac{\text{عدد منفی}}{0^-} = +\infty$$

$$\frac{\text{عدد منفی}}{0^+} = -\infty$$



۱۷- تابع $f(x) = \begin{cases} ax^2 + bx & [-x] = 2 \\ 3a + 2x & [-x] \neq 2 \end{cases}$ روی $\mathbb{R}$ پیوسته است، مقدار $a^2 + b^2$ کدام است؟

۴ (۴)

۹ (۳)

۱۰ (۲)

۵ (۱)

(سخت - محاسباتی - زمان‌بر) - حسابان ۱ صفحه ۱۵۱ - ۱۱۰۵

 پاسخ: گزینه ۴

$$[-x] = 2 \Rightarrow 2 \leq -x < 3 \Rightarrow -3 < x \leq -2$$

ابتدا ضابطه f را به صورت زیر می‌نویسیم. می‌دانیم:

$$f(x) = \begin{cases} ax^2 + bx & -3 < x \leq -2 \\ 3a + 2x & x \leq -3, x > -2 \end{cases}$$

کافی است پیوستگی در دو نقطه $x = -3$ و $x = -2$ را بررسی کنیم.

$$\lim_{x \rightarrow (-2)^-} f(x) = f(-2) = \lim_{x \rightarrow (-2)^+} f(x) \Rightarrow 4a - 2b = 3a - 4 \Rightarrow a - 2b = -4$$

$$\lim_{x \rightarrow (-3)^-} f(x) = f(-3) = \lim_{x \rightarrow (-3)^+} f(x) \Rightarrow 3a - 6 = 9a - 3b \Rightarrow 6a - 3b = -6 \Rightarrow 2a - b = -2$$

از حل دستگاه $\begin{cases} a - 2b = -4 \\ 2a - b = -2 \end{cases}$ به جواب $a = 0$ و $b = 2$ می‌رسیم. پس $a^2 + b^2 = 4$ است.

 **توابع پیوسته**

(۱) توابع چندجمله‌ای روی $\mathbb{R}$ پیوسته‌اند.

(۲) توابع رادیکالی با فرجه زوج در دامنه خود پیوسته‌اند. (داخل رادیکال نامنفی باشد).

توابع رادیکالی با فرجه فرد در $\mathbb{R}$ پیوسته‌اند.

(۳) توابع گویا روی دامنه خود پیوسته‌اند. (دامنه توابع گویا = {ریشه‌های مخرج} - $\mathbb{R}$)

(۴) توابع چندضابطه‌ای در صورتی پیوسته‌اند که هم در نقاط مرزی و هم در هر ضابطه پیوسته باشند.



۱۸- هرگاه $f(x) = \frac{x^2 - 3}{x + 1}$ و $f(x) = xg(x) + 4x - 3$ باشد، مقدار $\lim_{x \rightarrow 0} g(x)$ چه عددی است؟

(۱) ۱ (۲) -۱ (۳) -۲ (۴) ۴

(متوسط - محاسباتی - استاندارد) - حسابان ۲ صفحه ۸۷ - ۱۲۰۴

پاسخ: گزینه ۲

در ابتدا داریم:

$$f(x) = xg(x) + 4x - 3 \Rightarrow \frac{f(x) + 3}{x} = g(x) + 4 \Rightarrow g(x) = \frac{f(x) + 3}{x} - 4$$

روش اول

با توجه به آن که $f(0) = -3$ است، پس:

$$\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} - 4 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} g(x) = f'(0) - 4$$

پس ابتدا باید مشتق تابع f را در نقطه $x = 0$ بیابیم:

$$f'(x) = \frac{2x(x+1) - (x^2 - 3)}{(x+1)^2} \xrightarrow{x=0} f'(0) = 3$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} g(x) = f'(0) - 4 = 3 - 4 = -1$$

روش دوم

$$\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x^2 - 3}{x + 1} + 3}{x} - 4 = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 + 3x}{x(x+1)} - 4 = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x + 3}{x + 1} - 4 = 3 - 4 = -1$$

تعریف مشتق

تعریف: فرض کنید f یک تابع باشد، حد زیر را (در صورت وجود) مشتق تابع f در نقطه a می‌نامیم و با $f'(a)$ نمایش می‌دهیم.

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

همچنین حاصل این حد را شیب خط مماس بر نمودار تابع f در نقطه a (و یا شیب منحنی f در a) می‌نامیم.

تعریف دیگر مشتق: اگر در تعریف مشتق، قرار دهیم $x = a + h$ و $x \rightarrow a$ ، آنگاه تعریف معادل زیر برای مشتق به دست می‌آید:

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

توجه!

چشم‌تان را به تشخیص تعریف حدی مشتق عادت دهید!



۱۹- اگر $x = 3$ طول عطف تابع $f(x) = (x-2)^2(x-\alpha)$ باشد، طول مینیمم نسبی تابع کدام است؟

(۱) -۱ (۲) -۲ (۳) ۶ (۴) ۴

(متوسط - محاسباتی - استاندارد) - حسابان ۲ صفحه ۱۳۳ - ۱۲۰۵

پاسخ: گزینه ۴

چون $x = 3$ طول نقطه عطف تابع چندجمله‌ای $f(x)$ است، پس:

پس ابتدا مشتق دوم تابع را محاسبه می‌کنیم:

$$f'(x) = 2(x-2)(x-\alpha) + (x-2)^2 = (x-2)(3x-2\alpha-2)$$

$$f''(x) = (3x - 2\alpha - 2) + 3x - 6 = 6x - 2\alpha - 2 - 6 = 6x - 2\alpha - 8$$

$$f''(3) = 0 \rightarrow 18 - 2\alpha - 8 = 0 \rightarrow 10 = 2\alpha \rightarrow \alpha = 5$$

حال برای یافتن اکسترمم نسبی تابع مشتق آن را برابر صفر قرار می‌دهیم:

$$f'(x) = 0 \Rightarrow \begin{cases} x = 2 \\ x = \frac{2\alpha + 2}{3} \end{cases} \xrightarrow{\alpha=5} x = 4$$

طول Min نسبی: $x = 4$



زیرا:

x	2	4
y'	+	-
y		

Min

اکسترمم‌های نسبی تابع

تابع f در $x = a$ دارای اکسترمم نسبی است اگر $f'(a) = 0$ یا $f'(a)$ موجود نباشد و به علاوه f' در $x = a$ تغییرعلامت دهد:



قوانین مشتق

$$1) (x^n)' = nx^{n-1} \xrightarrow{\text{نتیجه}} \begin{cases} (\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}} \\ ((u(x))^n)' = nu'(x)(u(x))^{n-1} \end{cases}$$


$$2) (f \pm g)' = f'(x) \pm g'(x)$$

$$3) (f \cdot g)' = f'(x) \times g(x) + f(x) \times g'(x)$$

$$4) \left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'(x) \times g(x) - g'(x) \times f(x)}{g^2(x)}$$

نقاط عطف

$x = a$ را طول نقطه عطف تابع f می‌گویند، اگر f در $x = a$ پیوسته و دارای خط مماس (حتی قائم) باشد و جهت تقعر (گودی / انحنای) منحنی در این نقطه عوض می‌شود.



چگونه نقطه عطف را بیابیم؟

اگر $x = a$ طول نقطه عطف تابع f باشد، مشتق دوم $f''(x)$ یعنی $f''(a)$ برابر صفر یا تعریف نشده است. به عبارتی $f''(a) = 0$ یا $f''(a)$ موجود نیست.

اگر $f''(a) = 0$ و $f''(x)$ در $x = a$ تغییرعلامت دهد یعنی $x = a$ ریشه ساده $f''(x) = 0$ است.

توجه!

توجه داشته باشید که اگر در $x = a$ مشتق دوم f تعریف نشده باشد و مشتق چپ و راست آن هر دو $+\infty$ یا $-\infty$ باشند، حالت مماس قائم اتفاق می‌افتد.



۲۰- اگر خط مماس بر نمودار تابع $f(x) = \frac{4x+b}{\sqrt{x}}$ در $x=1$ ، عرض از مبدأ ۸ داشته باشد، مقدار b کدام است؟

۲ (۴)

۴ (۳)

۵ (۲)

 $\frac{12}{5}$ (۱)

(سخت - محاسباتی - زمان بر) - حسابان ۲ صفحه ۹۴ - ۱۲۰۴

پاسخ: گزینه ۳

قرار است در نقطه‌ای به طول $x=1$ واقع بر نمودار، مماس رسم کنیم و عرض از مبدأ خط مماس برابر ۸ شود، پس:

نقطه تماس $A(1, 4+b)$

$$f'(x) = \frac{4\sqrt{x} - \frac{1}{2\sqrt{x}}(4x+b)}{x} \Rightarrow f'(1) = 4 - \frac{4+b}{2} \Rightarrow f'(1) = 2 - \frac{b}{2}$$

می‌دانیم که شیب خط مماس در یک نقطه برابر است با مشتق تابع در آن نقطه. پس:


$$\text{خط مماس: } y - 4 - b = \left(2 - \frac{b}{2}\right)(x - 1)$$

اگر $x=0$ قرار دهیم، آن‌گاه عرض از مبدأ یافت می‌شود.

$$y = \frac{b}{2} - 2 + b + 4 = \frac{3}{2}b + 2 = 8 \Rightarrow \frac{3}{2}b = 6 \Rightarrow b = 4$$

خط مماس

اگر خط $y = mx + n$ در نقطه به طول a واقع بر منحنی $f(x)$ ، بر آن مماس شود، شیب خط مماس، همان مشتق تابع در نقطه به طول a است.



$$\text{شیب خط} = f'(a) = m$$

$$\text{معادله خط مماس: } y - y_A = m(x - x_A) \Rightarrow y - f(a) = f'(a)(x - a)$$



۲۱- نقطه ماکزیمم مطلق تابع $f(x) = x + \sqrt{8-x^2}$ روی خط $y = 2x + a$ واقع شده است، مقدار a کدام است؟

صفر (۴)

-۲ (۳)

۱ (۲)

-۴ (۱)

(متوسط - محاسباتی - زمان بر) - حسابان ۲ صفحه ۱۱۷ - ۱۲۰۵

پاسخ: گزینه ۴

$$8 - x^2 \geq 0 \Rightarrow x^2 \leq 8 \Rightarrow |x| \leq 2\sqrt{2} \Rightarrow -2\sqrt{2} \leq x \leq 2\sqrt{2}$$

در اولین قدم دامنه تابع را می‌یابیم:

$$f(x) = x + \sqrt{8-x^2} \quad ; \quad D_f = [-2\sqrt{2}, 2\sqrt{2}]$$

$$f'(x) = 1 + \frac{-2x}{2\sqrt{8-x^2}} = 1 + \frac{-x}{\sqrt{8-x^2}} = 0 \Rightarrow \sqrt{8-x^2} = x \quad ; \quad x \geq 0$$

$$\Rightarrow 8 - x^2 = x^2 \Rightarrow x^2 = 4 \Rightarrow \begin{cases} x = 2 \\ x = -2 \end{cases} \quad \text{غ ق ق}$$

حال مقدار تابع را در نقاط بحرانی و ابتدا و انتهای دامنه حساب می‌کنیم:

$$f(2) = 4, f(-2\sqrt{2}) = -2\sqrt{2}, f(2\sqrt{2}) = 2\sqrt{2}$$

پس نقطه $A(2, 4)$ نقطه ماکزیمم مطلق تابع است و داریم:

$$y = 2x + a \xrightarrow{A(2,4)} 4 = 4 + a \Rightarrow a = 0$$

ماکزیمم و مینیمم مطلق تابع

$x = a$ را طول نقطه ماکزیمم مطلق f می‌گویند، اگر به ازای هر x از دامنه f ، $f(x) \leq f(a)$ باشد.

$x = a$ را طول نقطه مینیمم مطلق f می‌گویند، اگر به ازای هر x از دامنه f ، $f(x) \geq f(a)$ باشد.

نکته!

هر تابع پیوسته روی بازه $[a, b]$ مقادیر ماکزیمم و مینیمم مطلق خود را اختیار می‌کند.

چگونه ماکزیمم و مینیمم مطلق توابع را بیابیم؟

کافی است مقدار تابع f را در نقاط بحرانی و دو سر بازه بسته مورد نظر (یا دامنه تابع) محاسبه کنید و با هم مقایسه کنید.



۲۲- فضای نمونه‌ای S با پنج عضو به شکل $S = \{a_1, a_2, a_3, a_4, a_5\}$ چنان است که احتمال‌های وقوع اعضای آن تشکیل دنباله‌ای حسابی با قدرنسبت $\frac{3}{4}$ می‌دهند. در بین این احتمالات، بزرگ‌ترین احتمال چند برابر کوچک‌ترین احتمال است؟

۷ (۴)

۶ (۳)

۵ (۲)

۳ (۱)

(متوسط - محاسباتی - استاندارد) - آمار و احتمال صفحه ۴۷ - ۱۱۰۲

پاسخ: گزینه ۴

با توجه به این که $P(a_1), P(a_2), P(a_3), P(a_4), P(a_5)$ تشکیل دنباله حسابی می‌دهند، داریم:

$$P(a_1) = x, P(a_2) = x + d, P(a_3) = x + 2d, P(a_4) = x + 3d, P(a_5) = x + 4d$$

$$\left. \begin{aligned} \sum_{i=1}^5 P(a_i) = 1 &\Rightarrow 5x + 10d = 1 \\ d = \frac{3}{40} \end{aligned} \right\} \Rightarrow x = \frac{1}{20}$$

بنابراین جواب برابر است با:

$$\frac{P(a_5)}{P(a_1)} = \frac{\frac{1}{20} + \frac{12}{40}}{\frac{1}{20}} = \frac{\frac{40}{40}}{\frac{20}{40}} = 2$$

احتمال غیرهم‌شانس

هرگاه حداقل دو پیشامد ساده از فضای نمونه‌ای $S = \{S_1, S_2, \dots, S_n\}$ احتمال نابرابر داشته باشند، S را فضای نمونه‌ای با احتمال غیرهم‌شانس می‌گوییم.

ویژگی‌های احتمال غیرهم‌شانس

۱) در فضای نمونه‌ای غیرهم‌شانس $S = \{S_1, S_2, \dots, S_n\}$ داریم:

$$P(S) = P(S_1) + P(S_2) + \dots + P(S_n) = 1$$

۲) اگر $A = \{a_1, a_2, \dots, a_k\}$ یک پیشامد k عضوی از فضای نمونه‌ای S باشد:

$$P(A) = P(a_1) + P(a_2) + \dots + P(a_k) \quad \text{ب}$$

$$0 \leq P(A) \leq 1 \quad \text{الف}$$

۲۳- در داده‌های آماری ۵، -۱۲، -۳، ۱، -۱۰، ۳، -۱، ۷، ۰ داده‌های کمتر از چارک اول و بیشتر از چارک سوم را حذف می‌کنیم. اگر به هر کدام از داده‌های باقی‌مانده، ۷ واحد اضافه کنیم، انحراف معیار داده‌های جدید کدام است؟

۱ (۴)

۲ (۳)

۳ (۲)

۴ (۱)

(متوسط - محاسباتی - استاندارد) - آمار و احتمال صفحه ۸۹ - ۱۱۰۳

پاسخ: گزینه ۳

ابتدا داده‌ها را از کوچک به بزرگ مرتب کرده و سپس چارک اول (Q_1) و چارک سوم (Q_3) را پیدا می‌کنیم:

$$\begin{array}{c}
 \uparrow Q_2 \\
 -1, 0, -5, -3, -1, 1, 3, 7, 12 \\
 \downarrow \quad \quad \quad \downarrow \\
 Q_1 = \frac{-5-3}{2} = -4 \quad Q_3 = \frac{3+7}{2} = 5
 \end{array}$$

حال، اگر داده‌های کمتر از چارک اول و بیشتر از چارک سوم را حذف کنیم، داده‌های باقی‌مانده به صورت $\{-3, -1, 0, 1, 3\}$ است. از طرفی می‌دانیم که اگر به تک‌تک این داده‌ها عدد ثابتی را اضافه کنیم، انحراف معیار تغییری نمی‌کند، بنابراین انحراف معیار همین داده‌ها را محاسبه می‌کنیم:

$$\bar{x} = \frac{(-3) + (-1) + 0 + 1 + 3}{5} = 0$$

$$\sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n} \Rightarrow \sigma^2 = \frac{(-3)^2 + (-1)^2 + (0)^2 + (1)^2 + (3)^2}{5} = \frac{20}{5} = 4$$

$$\Rightarrow \sigma = \sqrt{4} = 2$$

معیارهای گرایش به مرکز

اگر $X_1, X_2, X_3, \dots, X_n$ داده‌های آماری باشند، آن‌گاه:


$$\bar{x} = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n}$$

(۱) میانگین:

(۲) میانه و چارک‌ها:

اگر داده‌ها را از کوچک به بزرگ مرتب کنیم در صورتی که تعداد داده‌ها فرد باشد، عدد وسط و اگر تعداد داده‌ها زوج باشد، میانگین دو عدد وسط، همان میانه یا چارک دوم را نشان می‌دهد که برای نمایش آن از Q_2 استفاده می‌کنیم.

نیمی از داده‌ها قبل از میانه و نیم دیگری از داده‌ها بعد از میانه هستند. میانه نیمه اول داده‌ها همان چارک اول (Q_1) و میانه نیمه دوم داده‌ها همان چارک سوم (Q_3) را نشان می‌دهد. با مشخص کردن چارک اول، دوم (میانه) و سوم داده‌ها، تقریباً ۲۵٪ داده‌ها در هر یک از چهار محدوده زیر قرار می‌گیرند.



معیارهای پراکندگی

$$\sigma^2 = \frac{(x_1 - \bar{x})^2 + (x_2 - \bar{x})^2 + \dots + (x_n - \bar{x})^2}{n} \quad \text{یا} \quad \sigma^2 = \frac{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2}{n} - \bar{x}^2$$

(۱) واریانس:

$$\sigma = \sqrt{\text{واریانس}}$$

(۲) انحراف معیار:

$$R = x_{\max} - x_{\min}$$

(۳) دامنه تغییرات:

$$CV = \frac{\sigma}{\bar{x}}$$

(۴) ضریب تغییرات:

 وقتی همه داده‌ها با هم برابرند...

اگر داده‌ها با هم برابر باشند، معیارهای گرایش به مرکز یعنی میانه و میانگین با داده‌ها برابر بوده و معیارهای پراکندگی یعنی واریانس، انحراف معیار، ضریب تغییرات و دامنه تغییرات برابر صفر است.

$$x_1 = x_2 = \dots = x_n \longleftrightarrow \sigma^2 = \sigma = R = CV = 0$$

 اگر داده‌ها در a ضرب و با b جمع شوند...

(۱) میانگین در a ضرب و با b جمع می‌شود.

(۲) واریانس در a^2 ضرب می‌شود.

(۳) انحراف معیار در |a| ضرب می‌شود.

(۵) ضریب تغییرات، بعد از محاسبه تغییر میانگین و انحراف معیار محاسبه شده و تغییر می‌کند.



۲۴- در نمونه‌گیری تصادفی ساده به اندازه ۳، اگر جامعه آماری شامل اعداد طبیعی کوچک‌تر از ۶ باشد، احتمال این‌که میانگین نمونه انتخاب‌شده دقیقاً با میانگین جامعه برابر باشد، کدام است؟

(۴) ۰/۴

(۳) ۰/۳

(۲) ۰/۲

(۱) ۰/۱

(متوسط - محاسباتی - استاندارد) - آمار و احتمال صفحه ۱۱۳ - ۱۱۴

 پاسخ: گزینه ۲

ابتدا میانگین اعداد جامعه را محاسبه می‌کنیم:

$$\bar{x} = \frac{1+2+3+4+5}{5} = \frac{15}{5} = 3$$

بنابراین باید نمونه‌ای را انتخاب کنیم که میانگین آن برابر ۳ باشد و می‌دانیم برای این‌که میانگین یک نمونه ۳ عضوی برابر با ۳ باشد باید مجموع آن ۳ عدد برابر $3 \times 3 = 9$ باشد که برای این کار، باید ترکیب‌هایی ۳ تایی از اعداد $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ را پیدا کنیم که مجموع آن‌ها برابر ۹ شود:

$$n(A) = 2 \text{ : تعداد حالت‌های مطلوب} \Rightarrow \begin{cases} \{1, 3, 5\} \\ \{2, 3, 4\} \end{cases} \text{ : حالت اول} \\ \text{ : حالت دوم}$$

از طرفی تعداد کل حالت‌های انتخاب ۳ عدد از بین ۵ عدد برابر است با:

$$n(S) = \binom{5}{3} = \frac{5 \times 4 \times 3}{3 \times 2 \times 1} = 10$$

در نتیجه احتمال موردنظر برابر است با:

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(S)} = \frac{2}{10} = 0/2$$


 نمونه‌گیری تصادفی ساده

در این روش از الگوی خاصی استفاده نمی‌شود و هر کدام از اعضای جامعه، با احتمال برابر ممکن است در نمونه انتخاب شوند.

 به نمونه باحال ببین!

قرعه‌کشی بین افراد شرکت‌کننده در یک مسابقه





۲۵- در شکل مقابل، اندازه زاویه $\hat{C}$ کدام است؟


- (۱) 90°
- (۲) 120°
- (۳) 135°
- (۴) 150°

پاسخ: گزینه ۳

(متوسط - مفهومی - استاندارد) - هندسه ۱ صفحه ۱۲ - ۱۰۰۱

با توجه به این که BD نیمساز زاویه $\hat{B}$ است و می‌دانیم که هر نقطه روی نیمساز از دو ضلع زاویه به یک فاصله است، بنابراین از D عمودی بر امتداد BC رسم می‌کنیم تا آن را در E قطع کند، در نتیجه:

$$AD = DE = 4$$



همچنین دو مثلث ABD و BDE به حالت وتر و یک ضلع قائمه، همنهشت هستند، پس $BE = 8$ و در نتیجه:

$$CE = BE - BC = 8 - 4 = 4$$

بنابراین مثلث ECD قائم‌الزاویه متساوی‌الساقین است، در نتیجه:

$$\hat{C}_1 = 45^\circ \Rightarrow x = 180^\circ - 45^\circ = 135^\circ$$


نیمساز

مکان هندسی نقاطی از صفحه که از دو ضلع زاویه به یک فاصله باشند، نیمساز زاویه است و برعکس، هر نقطه‌ای که روی نیمساز باشد از دو ضلع زاویه به یک فاصله است.



۲۶- در مثلث ABC شکل مقابل، $AE = AC = 3\sqrt{2}$ ، $EC = 6$ و $DE = \sqrt{2}$ است. اندازه پاره خط BE کدام است؟


- (۱) ۲
- (۲) $2/5$
- (۳) ۳
- (۴) $3/5$



(سخت - مفهومی/ترکیبی - زمان‌بر) - هندسه ۱ صفحه ۳۹ - ۱۰۰۲

پاسخ: گزینه ۳

ارتفاع AM را رسم می‌کنیم، چون مثلث AEC متساوی‌الساقین است، ارتفاع، میانه و نیمساز بر هم منطبق‌اند و طبق فیثاغورس:



$$\triangle AME : AM = \sqrt{(3\sqrt{2})^2 - 3^2} = 3$$

حال ارتفاع مثلث BDE را هم رسم می‌کنیم. با توجه به زوایای مشخص شده در شکل، دو مثلث AEM و DEN به حالت دو زاویه برابر متشابه‌اند، بنابراین:

$$\frac{DE}{AE} = \frac{DN}{EM} \Rightarrow \frac{\sqrt{2}}{3\sqrt{2}} = \frac{DN}{3} \Rightarrow DN = 1$$

حال در مثلث DEN طبق فیثاغورس داریم:

$$NE^2 = DE^2 - DN^2 = (\sqrt{2})^2 - 1^2 = 1 \Rightarrow NE = 1 \Rightarrow BN = x - 1$$


حال در مثلث ABM، چون $DN \parallel AM$ است، طبق **تالس** داریم:

$$\frac{DN}{AM} = \frac{BN}{BM} \Rightarrow \frac{1}{3} = \frac{x-1}{x+3} \Rightarrow x+3 = 3x-3 \Rightarrow x = 3$$



تالس

در مثلث ABC، اگر پاره‌خط $EF \parallel BC$ باشد، روی دو ضلع دیگر پاره‌خط‌های متناسب ایجاد می‌کند.



$$EF \parallel BC \Rightarrow \frac{AE}{EB} = \frac{AF}{FC}$$


تعمیم تالس: این قضیه را به صورت زیر می‌توان تعمیم داد:

$$EF \parallel BC \Rightarrow \frac{AE}{AB} = \frac{AF}{AC} = \frac{EF}{BC}$$



تشابه مثلث‌ها

دو مثلث را متشابه می‌گوییم اگر همهٔ **زوايا، نظیر به نظیر** با هم **برابر** باشند و **اضلاع** متناظر **دو به دو متناسب** باشند.



$$\begin{cases} \hat{A} = \hat{A}' \\ \hat{B} = \hat{B}', \frac{AB}{A'B'} = \frac{AC}{A'C'} = \frac{BC}{B'C'} \\ \hat{C} = \hat{C}' \end{cases}$$

حالت‌های تشابه دو مثلث:

(۱) دو زاویهٔ مساوی:

$$\hat{A} = \hat{A}', \hat{B} = \hat{B}' \Rightarrow \triangle ABC \sim \triangle A'B'C' \xrightarrow{\text{نتیجه}} \hat{C} = \hat{C}', \frac{AB}{A'B'} = \frac{AC}{A'C'} = \frac{BC}{B'C'}$$

(۲) سه ضلع متناسب:


$$\frac{AB}{A'B'} = \frac{AC}{A'C'} = \frac{BC}{B'C'} \Rightarrow \triangle ABC \sim \triangle A'B'C' \xrightarrow{\text{نتیجه}} \hat{A} = \hat{A}', \hat{B} = \hat{B}', \hat{C} = \hat{C}'$$

(۳) دو ضلع متناسب و زاویهٔ بین برابر:

$$\frac{AB}{A'B'} = \frac{AC}{A'C'} = k, \hat{A} = \hat{A}' \Rightarrow \triangle ABC \sim \triangle A'B'C' \xrightarrow{\text{نتیجه}} \frac{BC}{B'C'} = k, \hat{B} = \hat{B}', \hat{C} = \hat{C}'$$



۲۷- در دوزنقه $ABCD$ مطابق شکل قطرهای بر هم عمودند و $AC = 12$ است. اگر مجموع طول دو قاعده ۲۰ باشد، مساحت دوزنقه کدام است؟




- (۱) ۷۲
(۲) ۸۴
(۳) ۹۶
(۴) ۱۰۸

(متوسط - مفهومی - استاندارد) - هندسه ۱ صفحه ۵۷ - ۱۰۰۳

پاسخ: گزینه ۳

از رأس C خطی به موازات قطر BD رسم می‌کنیم تا امتداد قاعده AB را در E قطع کند، در این صورت چهارضلعی $BECD$ متوازی‌الاضلاع بوده و $CE = BD$ و $CE \perp AC$ است، همچنین $BE = DC = a$ بوده و چون $AB + DC = 20$ می‌باشد.

پس:



$$a + b = 20 \Rightarrow AE = 20$$

حال طبق فیثاغورس در مثلث ACE داریم:

$$CE^2 + 12^2 = 20^2 \Rightarrow CE = 16 \Rightarrow BD = 16$$

حال مساحت دوزنقه $ABCD$ با دو قطر عمود بر هم برابر است با:

$$S_{ABCD} = \frac{1}{2} (\text{حاصل ضرب دو قطر}) = \frac{1}{2} \times 12 \times 16 = 96$$

مساحت چهارضلعی با دو قطر عمود برهم


مساحت هر چهارضلعی که قطرهای آن بر هم عمودند، برابر است با نصف حاصل ضرب قطرهای.

۲۸- از دوران مثلث قائم‌الزاویه ABC حول کوچک‌ترین ضلع، یک مخروط با حجم 240π و از دوران آن حول ضلع متوسط یک مخروط با حجم 100π به وجود آمده است. اندازه کوچک‌ترین میانه این مثلث کدام است؟

- (۱) ۵ (۲) ۵/۵ (۳) ۶ (۴) ۵/۶

(آسان - خطبه‌خط - استاندارد) - هندسه ۱ صفحه ۹۶ - ۱۰۰۴

پاسخ: گزینه ۴



$$V_1 = \frac{1}{3} \pi a^2 b = 100\pi \Rightarrow a^2 b = 300$$

$$V_2 = \frac{1}{3} \pi b^2 a = 240\pi \Rightarrow ab^2 = 720$$

با فرض $a < b$ خواهیم داشت:

$$\frac{a}{b} = \frac{300}{720} = \frac{5}{12} \Rightarrow b = \frac{12}{5} a \xrightarrow{a^2 b = 300} a^2 \times \frac{12}{5} a = 300$$


$$\Rightarrow a^3 = 125 \Rightarrow a = 5 \Rightarrow b = \frac{12}{5} \times 5 = 12$$

بنابراین مثلث قائم‌الزاویه به اضلاع ۵، ۱۲، ۱۳ است و کوچک‌ترین میانه همان میانه وارد بر وتر است که نصف وتر است:

$$m = \frac{1}{2} \times 13 = 6.5$$

دوران مثلث قائم الزاویه

از دوران یک مثلث قائم الزاویه به اضلاع قائمه a و b حول ضلع b مخروطی به وجود می‌آید که شعاع قاعده آن a و ارتفاع آن b است. حجم مخروط به شعاع قاعده r و ارتفاع h برابر است با:



$$V = \frac{1}{3} \pi r^2 h$$




۲۹- در نیم‌دایره شکل مقابل، $\hat{A}_1 = \hat{A}_2$ است. زاویه x کدام است؟

(۱) 105°

(۲) 115°

(۳) 125°

(۴) 135°



(متوسط - مفهومی - استاندارد) - هندسه ۲ صفحه ۱۶ - ۱۱۰۱

پاسخ: گزینه ۴

با فرض $\widehat{FC} = \theta$ و $\widehat{DF} = \gamma$ ، $\widehat{GD} = \beta$ ، $\widehat{BG} = \alpha$ داریم:

$$\left\{ \begin{array}{l} \hat{A}_1 = \frac{\gamma - \beta}{2} \\ \hat{A}_2 = \frac{\theta - \alpha}{2} \end{array} \right. \xrightarrow{\hat{A}_1 = \hat{A}_2} \frac{\gamma - \beta}{2} = \frac{\theta - \alpha}{2} \Rightarrow \gamma - \beta = \theta - \alpha \Rightarrow \gamma + \alpha = \theta + \beta$$


از طرف دیگر مجموع کمان‌های هر نیم‌دایره برابر 180° است:

$$\alpha + \beta + \gamma + \theta = 180^\circ \xrightarrow{\gamma + \alpha = \theta + \beta} 2(\alpha + \gamma) = 180^\circ \Rightarrow \alpha + \gamma = 90^\circ$$


حال زاویه x زاویه بین دو وتر است، بنابراین:

$$\hat{x} = \frac{\gamma + \alpha + 180^\circ}{2} = \frac{90^\circ + 180^\circ}{2} = \frac{270^\circ}{2} = 135^\circ$$


زوايا و وترهای دایره



$$\theta = \frac{\widehat{BC} - \widehat{AD}}{2}$$




$$\theta = \frac{\widehat{AC} - \widehat{AB}}{2}$$



$$\theta = \frac{\widehat{AB} + \widehat{CD}}{2}$$



۳۰- مطابق شکل خطوط CB و CA بر دایره مماس هستند و $AD = BC$ ، اگر $AE = ۳$ باشد، اندازه وتر BE کدام است؟



(۱) ۱۲

(۲) ۱۱

(۳) ۱۰

(۴) ۹


(متوسط - مفهومی - استاندارد) - هندسه ۲ صفحه ۱۹ - ۱۱۰۱

پاسخ: گزینه ۱

می‌دانیم طول دو مماس که از نقطه C خارج دایره بر آن رسم می‌شود با هم برابر است، بنابراین:

$$BC = CD$$

از طرفی، $BC = AD$ ، پس $BC = CD = AD$ می‌باشد:



حال از نقطه A یک مماس و یک قاطع بر دایره رسم شده است، بنابراین داریم:

$$AD^2 = AE \cdot AB \Rightarrow y^2 = 3(3 + x) \quad (۱)$$


از طرف دیگر طبق فیثاغورس در مثلث ABC داریم:

$$(2y)^2 + y^2 = (x + 3)^2 \Rightarrow 5y^2 = (x + 3)^2 \quad (۲)$$


با جایگذاری رابطه (۱) در رابطه (۲) داریم:

$$5(3(3 + x)) = (x + 3)^2 \Rightarrow x + 3 = 15 \Rightarrow x = ۱۲$$


روابط طولی در دایره



$$AM \times AN = AB \times AC$$




$$AM^2 = AB \times AC$$



$$AB \times AC = AM \times AN$$

طول مماس بر دایره

طول دو مماس که از نقطه‌ای خارج از دایره بر آن رسم می‌شود با هم برابر است.



$$AB = AC$$



۳۱- نقاط $A(-6, 8)$ و $B(2, 0)$ در طرفین محور عرض‌ها و دو نقطه C و D به فاصله دو واحد از هم روی محور y ها قرار دارند. حداقل طول خط شکسته $ACDB$ کدام است؟

۱۲ (۴)

۱۱ (۳)


۱۰ (۲)

۹ (۱)

(آسان - مفهومی - سریع) - هندسه ۲ صفحه ۵۳ - ۱۱۰۲

پاسخ: گزینه ۴

ابتدا نقطه B را به اندازه طول پاره خط CD و به موازات محور y ها به سمت بالا انتقال می‌دهیم تا به نقطه $B'(2, 2)$ برسیم و سپس فاصله نقطه $A(-6, 8)$ را از نقطه B' به دست می‌آوریم:




$$|AB'| = \sqrt{(-6-2)^2 + (8-2)^2} = \sqrt{64 + 36} = \sqrt{100} = 10$$

در نتیجه حداقل طول خط شکسته $ACDB$ برابر است با:

$$\min(ACDB) = |AB'| + |CD| = 10 + 2 = 12$$

کاربردی از انتقال


اگر نقاط B و C به فاصله a روی خط d باشند، و نقاط A و D در طرفین خط d باشند، کمترین طول خط شکسته $ABCD$ برابر با $AD' + a$ است. به طوری که D' انتقال یافته D به اندازه a واحد در راستای خط d و به سمت نقطه A است. همچنین B محل تلاقی AD' و خط d و C انتقال یافته B روی خط d است:



$$ABCD = AB + \underbrace{BC}_a + \underbrace{CD}_{BD'} = AD' + a$$



۳۲- در شکل زیر $AD \parallel EC$ و AD نیمساز زاویه $\hat{BAC}$ است. اگر مساحت مثلث ACE برابر $9\sqrt{3}$ باشد، اندازه BC کدام است؟




- (۱) ۸
(۲) ۹
(۳) $3\sqrt{7}$
(۴) $3\sqrt{6}$

(متوسط - مفهومی - استاندارد) - هندسه ۲ صفحه ۶۵ و ۶۸ - ۱۱۰۳

پاسخ: گزینه ۳

با توجه به شکل مقابل، داریم:



$$\left. \begin{array}{l} AD \parallel EC \\ \text{مورب } AC \end{array} \right\} \Rightarrow \hat{A}_2 = \hat{C}_1$$

$$\left. \begin{array}{l} AD \parallel EC \\ \text{مورب } BE \end{array} \right\} \Rightarrow \hat{A}_1 = \hat{E}$$

$$\xrightarrow[\hat{A}_1 = \hat{A}_2]{AD \text{ نیمساز}} \hat{C}_1 = \hat{E} = 30^\circ$$

چون $\hat{C}_1 = \hat{E} = 30^\circ$ است، بنابراین مثلث AEC متساوی الساقین بوده $(AE = AC)$ و زاویه $\hat{EAC}$ برابر 120° است. از طرفی می دانیم که مساحت مثلث ACE برابر $9\sqrt{3}$ است، پس:


$$\left\{ \begin{array}{l} S_{\triangle ACE} = 9\sqrt{3} \Rightarrow \frac{1}{2} \times AC \times AE \times \sin 120^\circ = 9\sqrt{3} \Rightarrow \frac{\sqrt{3}}{4} AC^2 = 9\sqrt{3} \Rightarrow AC = 6 \\ \hat{BAC} = 60^\circ \end{array} \right.$$

حال به کمک قضیه کسینوس ها در مثلث ABC داریم:

$$BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2AB \times AC \times \cos(\hat{BAC}) \Rightarrow BC^2 = 81 + 36 - (2 \times 9 \times 6 \times \frac{1}{2})$$

$$\Rightarrow BC^2 = 81 + 36 - 54 = 63 \Rightarrow BC = \sqrt{63} = 3\sqrt{7}$$

قضیه کسینوس ها



$$\begin{aligned} c^2 &= a^2 + b^2 - 2ab \cos \hat{C} \\ b^2 &= a^2 + c^2 - 2ac \cos \hat{B} \\ a^2 &= b^2 + c^2 - 2bc \cos \hat{A} \end{aligned}$$

۳۳- ماتریس $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ مفروض است. مجموع درایه‌های قطر اصلی ماتریس $(A^{20} + I)^{-1}$ کدام است؟

(۱) ۱ (۲) -۱ (۳) $\frac{1}{2}$ (۴) $-\frac{1}{2}$

پاسخ: گزینه ۱

(متوسط - مفهومی/محاسباتی - استاندارد ۵) - هندسه ۳ صفحه ۲۳ - ۱۲۰۱

ابتدا ماتریس A^{20} را تشکیل می‌دهیم:

$$A^2 = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A^4 = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

⋮

$$\Rightarrow A^{20} = \begin{bmatrix} 1 & 20 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$(A^{20} + I) = \begin{bmatrix} 1 & 20 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 20 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

$$(A^{20} + I)^{-1} = \frac{1}{(2 \times 2) - (20 \times 0)} \begin{bmatrix} 2 & -20 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} = \frac{1}{4} \begin{bmatrix} 2 & -20 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & -5 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1 \text{ : مجموع درایه‌های قطر اصلی}$$

ضرب دو ماتریس

۱) ضرب ماتریس سطری در ماتریس ستونی:

$$\begin{bmatrix} a_1 & a_2 & \dots & a_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix} = a_1 b_1 + a_2 b_2 + \dots + a_n b_n$$

۲) ضرب دو ماتریس: ضرب دو ماتریس A و B یعنی $A \times B$ به شرطی قابل انجام است که تعداد ستون A با تعداد سطر B برابر باشد. در این صورت، اگر $A_{m \times n}$ و $B_{n \times p}$ باشد، $C_{m \times p} = A_{m \times n} \times B_{n \times p}$ ماتریسی $m \times p$ است و هر درایه C_{ij} از آن از ضرب سطر i ام A در ستون j ام B به دست می‌آید.

ویژگی‌های ضرب ماتریس‌ها

- ۱) $A \times B \neq B \times A$
- ۲) $A \times I = I \times A = A$
- ۳) $A^T = A \times A$
- ۴) $(kA)^n = k^n \times A^n$; $(k \in \mathbb{R})$

دترمینان و وارون ماتریس 2×2

 اگر $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ یک ماتریس 2×2 باشد، آن گاه:

$$|A| = ad - bc$$

 اگر $|A| \neq 0$ باشد، A وارون پذیر است و داریم:

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$

یک ماتریس معروف

 در ماتریس معروف $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ ، داریم:

$$A^n = \begin{bmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$


 اگر $A = \begin{bmatrix} 1 & x-1 & -1 \\ x+1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ ، $B = \begin{bmatrix} 3 & x \\ 4 & 0 \\ x & -x \end{bmatrix}$ و درایه سطر دوم و ستون اول از ماتریس AB برابر ۷ باشد، حاصل $|BA+I|$ کدام

است؟

-۸ (۴)

۴ (۳)

۸ (۲)

-۴ (۱)

(متوسط - مفهومی/ترکیبی - استاندارد) - هندسه ۳ صفحه ۲۸ - ۱۲۰۱

پاسخ: گزینه ۴

 اگر $C = AB$ باشد، آن گاه:

$$C_{21} = [A \text{ سطر دوم}] \begin{bmatrix} \text{ستون اول} \\ B \end{bmatrix} = [x+1 \quad 0 \quad 1] \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \\ x \end{bmatrix} = 7$$

$$\Rightarrow 3x + 3 + 0 + x = 7 \Rightarrow x = 1$$

 حال ماتریس BA و سپس $BA+I$ را تشکیل می دهیم:

$$BA = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 4 & 0 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 0 & -2 \\ 4 & 0 & -4 \\ -1 & 0 & -2 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow BA+I = \begin{bmatrix} 6 & 0 & -2 \\ 4 & 1 & -4 \\ -1 & 0 & -1 \end{bmatrix} \Rightarrow |BA+I| = 6(-1) - 0 - 2(+1) = -8$$

دترمینان ماتریس 3×3

برای یافتن دترمینان ماتریس 3×3 حول سطر یا ستونی از آن، درایه هر سطر را در $(-1)^{i+j}$ که i شماره سطر و j شماره ستون آن درایه است ضرب می‌کنیم، سپس عدد حاصل را در دترمینان ماتریس 2×2 ای که از حذف سطر i ام و ستون j ام ماتریس به دست آمده است ضرب می‌کنیم. در نهایت سه عدد به دست آمده را با هم جمع می‌کنیم.

یه نمونه باحال ببین!

دترمینان زیر را حول سطر اول می‌یابیم:

$$\begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} = a \times (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} e & f \\ h & i \end{vmatrix} + b(-1)^{1+2} \begin{vmatrix} d & f \\ g & i \end{vmatrix} + c(-1)^{1+3} \begin{vmatrix} d & e \\ g & h \end{vmatrix}$$



۳۵- در یک بیضی پاره‌خط‌هایی که از یک سر قطر کوچک بیضی، به یکی از کانون‌ها و یک سر قطر بزرگ وصل شده‌اند، بر هم عمودند. خروج از مرکز این بیضی کدام است؟

$$\frac{\sqrt{5}}{4} \quad (۴)$$

$$\frac{\sqrt{5}+1}{4} \quad (۳)$$


$$\frac{\sqrt{5}-1}{2} \quad (۲)$$

$$\frac{\sqrt{5}-1}{4} \quad (۱)$$

(متوسط - مفهومی - استاندارد) - هندسه ۳ صفحه ۴۹ - ۱۲۰۲

پاسخ: گزینه ۲

مثلث AFB قائم‌الزاویه است و OB ارتفاع وارد بر وتر است و می‌دانیم ارتفاع وارد بر وتر واسطه هندسی بین دو قطعه ایجاد شده روی وتر است.



$$b^2 = ac \xrightarrow{b^2 = a^2 - c^2} a^2 - c^2 = ac \xrightarrow{\div a^2} 1 - \left(\frac{c}{a}\right)^2 = \left(\frac{c}{a}\right)^2$$

حال چون خروج از مرکز بیضی برابر $e = \frac{c}{a}$ است، داریم:


$$1 - e^2 = e \Rightarrow e^2 + e - 1 = 0 \xrightarrow{\Delta=5} e = \frac{-1 \pm \sqrt{5}}{2}$$

$$e = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$$

چون $e > 0$ است، بنابراین:

بیضی

در هر بیضی، مجموع فواصل هر نقطه روی بیضی از دو نقطه ثابت F و F' (کانون‌های بیضی) برابر با مقدار ثابت $2a$ است.



$$MF + MF' = 2a$$

$$\text{طول قطر بزرگ} = AA' = 2a$$

$$\text{طول قطر کوچک} = BB' = 2b$$

$$\text{فاصله کانونی} = FF' = 2c$$

سه پارامتر مهم بیضی به صورت زیر هستند:

در این صورت:

$$\text{مرکز بیضی} = O = \frac{A + A'}{2} = \frac{B + B'}{2} = \frac{F + F'}{2}$$

$$a^2 = b^2 + c^2 \quad \text{رابطه تلای بیضی}$$

خروج از مرکز بیضی

در هر بیضی با طول قطر بزرگ $2a$ و فاصله کانونی $2c$ ، خروج از مرکز بیضی برابر است با:

$$e = \frac{c}{a}$$

e عددی بین صفر و یک است و هر چه به صفر نزدیکتر باشد بیضی به دایره شبیهتر است، همچنین هر چه به یک نزدیکتر باشد بیضی به پاره‌خط شبیهتر است.



۳۶- در مثلث ABC نقطه $G(0, 1, 1)$ محل هم‌رسمی میانه‌ها و نقاط $M(-1, 0, 1)$ و $N(1, 1, 0)$ به ترتیب وسط اضلاع AC و BC هستند، مساحت مثلث ABC کدام است؟

$$3\sqrt{3} \quad (4)$$

$$6\sqrt{3} \quad (3)$$


$$12\sqrt{3} \quad (2)$$

$$24\sqrt{3} \quad (1)$$

(متوسط - مفهومی - استاندارد) - هندسه ۳ صفحه ۸۱ - ۱۲۰۳

پاسخ: گزینه ۳

می‌دانیم مساحت مثلث MNP ، $\frac{1}{4}$ مساحت مثلث ABC و مساحت مثلث GMN نیز $\frac{1}{3}$ مساحت مثلث MNP است، بنابراین:



$$S_{\triangle GMN} = \frac{1}{3} \times \frac{1}{4} S_{\triangle ABC} = \frac{1}{12} S_{\triangle ABC}$$

پس کافی است مساحت مثلث GMN را پیدا کرده و سپس آن را در ۱۲ ضرب کنیم:

$$\begin{cases} \overrightarrow{GM} = M - G = (-1, 0, 1) - (0, 1, 1) = (-1, -1, 0) \\ \overrightarrow{GN} = N - G = (1, 1, 0) - (0, 1, 1) = (1, 0, -1) \end{cases}$$


$$\overrightarrow{GM} \times \overrightarrow{GN} = (1, -1, 1) \Rightarrow S_{\triangle GMN} = \frac{1}{2} |\overrightarrow{GM} \times \overrightarrow{GN}| = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

بنابراین مساحت مثلث ABC برابر است با:

$$S_{\triangle ABC} = 12 \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \right) = 6\sqrt{3}$$

مساحت مثلث و بردارها!

مساحت هر مثلث مانند ABC برابر است با:



$$S = \frac{1}{2} AB \times AC \times \sin \theta = \frac{1}{2} |\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}|$$


اگر $\vec{a}$ و $\vec{b}$ دو بردار با زاویه بین θ باشند، حاصل ضرب داخلی و خارجی آن‌ها برابر است با:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = (a_1, a_2, a_3) \cdot (b_1, b_2, b_3) = a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3 = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \theta \quad (۱) \text{ حاصل ضرب داخلی:}$$


$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix} \Rightarrow |\vec{a} \times \vec{b}| = |\vec{a}| |\vec{b}| \sin \theta \quad (۲) \text{ حاصل ضرب خارجی:}$$

مساحت مثلث‌های ایجادشده در مثلث با رسم میانه


(۱) هر میانه مثلث، آن را به **دو مثلث هم‌مساحت** تقسیم می‌کند.




(۲) سه میانه مثلث را به **شش مثلث هم‌مساحت** تقسیم می‌کنند.



(۳) اگر G محل تلاقی میانه‌ها باشد، پاره‌خط‌های GA ، GB و GC ، مثلث را به **سه مثلث هم‌مساحت** تقسیم می‌کنند.



(۴) اگر **وسط اضلاع مثلث** را به هم وصل کنیم **چهار مثلث هم‌مساحت** به وجود می‌آید.



توجه!

اگر G محل تلاقی میانه‌های $\triangle ABC$ باشد، محل تلاقی میانه‌های $\triangle MNP$ نیز هست.



۳۷- در یک عمل تقسیم، خارج قسمت برابر با ۷ و باقی مانده برابر با ۱۵ است. اگر مقسوم بر ۵ بخش پذیر باشد، مجموع ارقام کوچک ترین مقدار ممکن برای مقسوم کدام است؟

۱۲ (۴)

۱۱ (۳)

۱۰ (۲)

۹ (۱)

(متوسط - مفهومی - استاندارد) - گسسته صفحه ۲۲ - ۱۲۰۱

پاسخ: گزینه ۳

روش اول

روش مفهومی:

اگر a مقسوم و b مقسوم علیه باشد، ابتدا رابطه تقسیم را تشکیل می دهیم:

$$a = 7b + 15$$

از طرفی باقی مانده باید همواره کوچک تر از مقسوم علیه باشد، پس:

$$b > 15 \Rightarrow b \geq 16$$

می دانیم که مقسوم یعنی a بر ۵ بخش پذیر است و چون عدد ۱۵ خودش بر ۵ بخش پذیر است، پس برای این که کل عبارت $(7b + 15)$ بر

۵ بخش پذیر باشد، عبارت $7b$ هم حتماً باید بر ۵ بخش پذیر باشد به عبارت دیگر $7b \equiv 0 \pmod{5}$ ؛ از طرفی چون ۷ و ۵ نسبت به هم اول هستند، پس نتیجه می گیریم که b باید مضرب ۵ باشد و می دانیم که $b \geq 16$ است. بنابراین کوچک ترین عدد بعد از ۱۶ که مضرب ۵ باشد، عدد

۲۰ است. پس: $b_{\min} = 20$

در نتیجه حداقل مقدار ممکن برای مقسوم برابر است با:

$$a_{\min} = 7(20) + 15 = 155 \xrightarrow{\text{مجموع ارقام}} 1 + 5 + 5 = 11$$

روش دوم

روش محاسباتی:

فرض کنیم $a = 7b + 15$ باشد:

$$5|a \Rightarrow a \equiv 0 \pmod{5} \Rightarrow 7b + 15 \equiv 0 \pmod{5} \Rightarrow 7b \equiv -15 \pmod{5} \Rightarrow 7b \equiv 0 \pmod{5}$$

$$\xrightarrow{(7,5)=1} b \equiv 0 \pmod{5} \Rightarrow b = 5k \xrightarrow{b \geq 16} b_{\min} = 20$$

$$\Rightarrow a_{\min} = 7(20) + 15 = 155 \xrightarrow{\text{مجموع ارقام}} 1 + 5 + 5 = 11$$



۳۸- رقم یکان بزرگ ترین عدد طبیعی دو رقمی a که در معادله هم نهشتی $73a \equiv 11 \pmod{29}$ صدق می کند، کدام است؟

۴ صفر

۷ (۳)

۴ (۲)

۳ (۱)

(متوسط - محاسباتی - استاندارد) - گسسته صفحه ۲۵ - ۱۲۰۱

پاسخ: گزینه ۴

با توجه به خواص همنهشتی داریم:

$$73a \equiv 11 \pmod{29} \xrightarrow{73a = 2 \times 29a + 15a} 15a \equiv 11 \pmod{29} \xrightarrow{-29} 15a \equiv -18 \pmod{29}$$

$$\xrightarrow{\div 3} 5a \equiv -6 \pmod{29} \xrightarrow{-29} 5a \equiv -35 \pmod{29} \xrightarrow{(29,5)=1} a \equiv -7 \pmod{29} \Rightarrow a = 29k - 7$$

$$\xrightarrow{\div 5} a \equiv -7 \pmod{29} \Rightarrow a = 29k - 7$$

به ازای $k = 3$ مقدار a برابر ۸۰ به دست می آید که بزرگ ترین مقدار دو رقمی ممکن برای a است.

$$29k - 7 < 100 \Rightarrow k < \frac{107}{29} \Rightarrow k < 3 / \dots$$

به عبارت دیگر می توان گفت:

$$\Rightarrow k \leq 3 \Rightarrow a = 29(3) - 7 = 80$$

همنهشتی

اگر باقی‌مانده تقسیم a بر m برابر r باشد، آن‌گاه می‌گوییم a و r در پیمانه m همنهشت‌اند و می‌نویسیم:

$$a \equiv r \Leftrightarrow a = mq + r \Leftrightarrow m | a - r$$

نتیجه: اگر باقی‌مانده تقسیم a و b بر m یکسان باشد، می‌گوییم a و b در پیمانه m همنهشت‌اند:

$$a \equiv b \Leftrightarrow m | a - b$$

ویژگی‌های همنهشتی

$$1) a \equiv b \Rightarrow \begin{cases} a + mq \equiv b & (q \in \mathbb{Z}) \\ a \equiv b + mq' & (q' \in \mathbb{Z}) \end{cases}$$

$$2) a \equiv b \Rightarrow \begin{cases} a + c \equiv b + c \\ a - c \equiv b - c \\ ac \equiv bc \end{cases}$$

$$3) \text{ تقسیم } : ac \equiv bc \xrightarrow{(c,m)=d} a \equiv b \quad \frac{m}{d}$$

$$\text{نتیجه} : ac \equiv bc \xrightarrow[\div c]{(c,m)=1} a \equiv b$$

$$4) a \equiv b, b \equiv c \Rightarrow a \equiv c$$

$$5) a \equiv b \Rightarrow a^n \equiv b^n$$

معادله همنهشتی

معادله به شکل $ax \equiv b$ را یک معادله همنهشتی می‌گویند.

شرط لازم و کافی وجود جواب برای چنین معادله‌ای به صورت زیر است:


$$(a, m) | b$$

برای حل معادله باید x ‌هایی را بیابیم که رابطه همنهشتی به‌ازای آن‌ها برقرار باشد. برای این منظور، ابتدا به کمک ویژگی‌های همنهشتی

معادله را به شکل $x \equiv c$ درمی‌آوریم، در نتیجه داریم:

$$x = mq + c \quad (q \in \mathbb{Z})$$

۳۹- در گراف شکل مقابل، احتمال این که یک γ -مجموعه، شامل رأسی با درجه ۱ باشد، چقدر است؟



- (۱) $\frac{1}{4}$
 (۲) $\frac{1}{3}$
 (۳) $\frac{1}{2}$
 (۴) $\frac{2}{3}$

(آسان - مفهومی/ترکیبی - سریع ۵) - گسسته صفحه ۴۷ - ۱۲۰۲)

پاسخ: گزینه ۴

در گراف شکل داده شده، $\gamma(G) = 3$ است و این گراف دارای ۳ مجموعه احاطه‌گر مینیمم است که عبارتند از:

$$\{c, f, g\}, \{e, c, h\}, \{c, f, h\}$$

از طرفی در بین این سه مجموعه، مجموعه‌های $\{c, f, g\}, \{e, c, h\}$ ، هر کدام شامل یک رأس درجه ۱ هستند. بنابراین احتمال موردنظر برابر است با:

$$P = \frac{2}{3}$$

مجموعه احاطه‌گر

اگر زیرمجموعه‌ای از رأس‌های گراف را در نظر بگیریم، به گونه‌ای که هر رأس گراف یا در این مجموعه باشد یا با حداقل یک رأس آن مجاور باشد، این مجموعه مجموعه احاطه‌گر نامیده می‌شود.

مجموعه احاطه‌گر مینیمم

به مجموعه احاطه‌گری که کمترین تعداد رأس‌ها را داشته باشد، مجموعه احاطه‌گر مینیمم یا اصطلاحاً γ -مجموعه گفته می‌شود.

مجموعه احاطه‌گر مینیمال

به مجموعه احاطه‌گری که با حذف هر یک از رأس‌هایش دیگر احاطه‌گر نباشد، مجموعه احاطه‌گر مینیمال گفته می‌شود.

مینیم یا مینیمال، مسئله این است!

دقت کنید که یک مجموعه احاطه‌گر مینیمم همیشه مینیمال است اما یک مجموعه احاطه‌گر مینیمال لزوماً احاطه‌گر مینیمم نیست و کمترین تعداد اعضا را ندارد.

عدد احاطه‌گری

به تعداد رأس‌های مجموعه احاطه‌گر مینیمم گراف G عدد احاطه‌گری گراف می‌گوییم و آن را با $\gamma(G)$ نشان می‌دهیم.



۴۰- در یک اجتماع، ۱۹۱ نفر حضور دارند که در بین آن‌ها ۱۳ جعبه وجود دارد. هر یک از آنان به تصادف سه تا از جعبه‌ها را انتخاب کرده و در درون هر کدام یک مهره می‌اندازد. جعبه‌ای که در بین همه جعبه‌ها بیش‌ترین مهره را داشته باشد، حداقل شامل چند مهره است؟

(۴) ۴۵

(۳) ۴۴

(۲) ۴۸

(۱) ۴۷

(متوسط - محاسباتی - استاندارد ۵) - گسسته صفحه ۸۰ - ۱۲۰۳)

پاسخ: گزینه ۴

روش اول

تعداد کل مهره‌ها $3 \times 191 = 573$ یعنی ۵۷۳ مهره است که اگر آن‌ها را به‌طور مساوی بین ۱۳ جعبه تقسیم کنیم به هر یک از آن‌ها ۴۴ مهره می‌رسد و ۱ مهره اضافه می‌ماند که اگر آن را در یکی از جعبه‌ها قرار دهیم درستی گزاره زیر حاصل می‌شود:
 «در هر شرایطی جعبه‌ای وجود دارد که تعداد مهره‌های درونش ۴۵ یا بیشتر باشد.»

در بدترین شرایط، جعبه‌ها به‌طور مساوی انتخاب می‌شوند، یعنی هر جعبه به تعداد مساوی و بیشترین تعداد دفعه ممکن توسط افراد انتخاب می‌شود. با توجه به این که در کل ۱۳ جعبه داریم، اگر هر جعبه را ۱۴ نفر انتخاب کرده باشند:

$$13 \times 14 = 182$$

یعنی ۱۸۲ نفر جعبه‌هایشان را انتخاب کرده‌اند و تنها $182 - 191 = 9$ نفر باقی‌مانده‌اند که هنوز جعبه انتخاب نکرده‌اند.

با انتخاب این ۹ نفر جعبه‌ای وجود دارد که حداقل ۱۵ نفر آن را انتخاب کرده‌اند، پس در این جعبه حداقل $45 = 3 \times 15$ مهره وجود دارد.

اصل لانه‌کبوتری و بدترین حالت ممکن

نوعی از سؤالات مربوط به اصل لانه‌کبوتری هستند که با در نظر گرفتن بدترین حالت ممکن به جواب می‌رسند. به این صورت که به بدترین شکلی که می‌توانیم کبوترها را در لانه‌ها جای می‌دهیم تا شرط مطلوب برآورده نشود، تا به جایی می‌رسیم که اگر تنها یک کبوتر دیگر را در هر لانه‌ای جای بدهیم شرط مطلوب برآورده می‌شود.






برای دیدن پاسخنامه ویدئویی آزمون
QR Code بالا را اسکن یا روی آن کلیک کنید!

جامع شبیه‌ساز کنکور سراسری

بودجه‌بندی
این آزمون

۴۱- شکل زیر، واپاشی آلفا برای اورانیوم ۲۳۸ را نشان می‌دهد. در شکل زیر به جای «الف» و «ب» به ترتیب از راست به چپ، چه اعدادی باید قرار گیرند؟




- (۱) ۱۴۴، ۲
- (۲) ۱۴۴، ۴
- (۳) ۱۴۲، ۲
- (۴) ۱۴۲، ۴

(آسان - مفهومی - سریع - صفحه ۱۴۳ - ۱۲۰۶)

پاسخ: گزینه ۱

با توجه به معادله واپاشی داده شده، مشخص است که ذره گسیل شده آلفا (${}^4_2\alpha$) است؛ بنابراین ذره گسیل شده شامل ۲ نوترون بوده و عدد مربوط به «الف» برابر ۲ است. حال معادله واپاشی را می‌توان به صورت زیر نوشت:



$${}^{238}_{92}\text{X} \rightarrow {}^A_Z\text{Y} + {}^4_2\alpha: A = 238 - 4 = 234$$

$$N = A - Z = 234 - 90 = 144$$

بنابراین اعداد مربوط به «الف» و «ب» به ترتیب برابر ۲ و ۱۴۴ خواهد بود.



۴۲- اساس کار کدام وسیله، با بقیه متفاوت است؟

- (۱) دمانگار
- (۲) دمپا
- (۳) تف‌سنج
- (۴) پرتوسنج


(آسان - خط‌به‌خط - سریع - صفحه ۱۱۶ - ۱۰۰۴)

پاسخ: گزینه ۲

اساس کار دمانگار، تف‌سنج و پرتوسنج (رادایومتر)، تابش گرمایی است اما دمپا (ترموستات) براساس انبساط گرمایی یک نوار دوفلزه کار می‌کند.



۴۳- در شکل‌های «الف» و «ب»، جهت جریان الکتریکی القا شده در حلقه‌ها به ترتیب کدام است؟



- (۱)
- (۲)
- (۳)
- (۴)


(آسان - مفهومی - سریع - صفحه ۱۱۷ - ۱۱۰۴)

پاسخ: گزینه ۳

جهت جریان القایی در حلقه‌ها را باید به کمک قانون لنز به دست بیاوریم. در شکل «الف»، آهنربا در حال دور شدن است، پس جهت جریان القایی باید در بخش جلویی حلقه رو به پایین باشد و در شکل «ب»، حلقه در حال نزدیک شدن است و شار مغناطیسی در حال افزایش است، پس جهت جریان القایی باید در آن ساعتگرد باشد.



۴۴- نمودار سرعت - زمان متحرکی که بر روی خط راست حرکت می کند، مطابق شکل زیر است. در کدام بازه زمانی متحرک بیشترین تندی متوسط را دارد؟



- (۱) $(0 - t_1)$
- (۲) $(t_1 - t_2)$
- (۳) $(t_2 - t_3)$
- (۴) $(t_1 - t_3)$

(متوسط - محاسباتی - استاندارد) - صفحه ۱۹ - ۱۲۰۱

پاسخ: گزینه ۳

با توجه به این که نمودار سرعت - زمان متحرک بالای محور t است، درمی یابیم متحرک تغییر جهت نداده و همواره در جهت محور x حرکت می کند؛ بنابراین تندی متوسط و اندازه سرعت متوسط متحرک در تمام بازه ها یکسان است. از طرفی می دانیم وقتی نمودار سرعت - زمان در یک بازه زمانی به صورت خطی است، سرعت متوسط در آن بازه برابر است با میانگین سرعت ابتدا و انتهای بازه؛ بنابراین می توانیم بنویسیم:

$$s_{av} = |v_{av}| \xrightarrow{v_{av} > 0} s_{av} = v_{av} = \frac{v_1 + v_2}{2}$$

$$s_{av(0-t_1)} = \frac{v + 1.5v}{2} = 1.25v$$

$$s_{av(t_1-t_2)} = \frac{1.5v + 0.5v}{2} = v$$

$$s_{av(t_2-t_3)} = \frac{0.5v + 2.5v}{2} = 1.5v$$

$$s_{av(t_1-t_2)} < s_{av(t_1-t_3)} < s_{av(t_2-t_3)} \Rightarrow v < s_{av(t_1-t_3)} < 1.5v$$

بنابراین بیشترین تندی متوسط در بازه زمانی t_2 تا t_3 است.



در نمودار سرعت - زمان حرکت بر روی خط راست، وقتی نمودار محور t را قطع نکند و به صورت خطی باشد، تندی متوسط در یک بازه زمانی برابر است با اندازه میانگین سرعت ابتدا و انتهای آن بازه زمانی؛ یعنی:


$$s_{av} = \left| \frac{v_1 + v_2}{2} \right|$$



۴۵- معادله حرکت متحرکی در SI به صورت $x = t^2 - 10t + 16$ است. در ۸ ثانیه اول حرکت، نسبت مدت زمانی که این متحرک کندشونده حرکت کرده است، به مدت زمانی که در خلاف جهت محور x حرکت کرده است، کدام است؟

- (۱) ۱
- (۲) $\frac{3}{5}$
- (۳) $\frac{5}{3}$
- (۴) $\frac{1}{2}$


نمودار مکان - زمان متحرک را رسم می‌کنیم:



با توجه به نمودار مکان - زمان متحرک درمی‌یابیم که در بازه زمانی صفر تا $t = 5s$ حرکت کندشونده بوده و در همین بازه زمانی متحرک در خلاف جهت محور x حرکت کرده است؛ بنابراین نسبت مدت زمانی که حرکت متحرک کندشونده بوده به مدت زمانی که متحرک در خلاف جهت محور x حرکت می‌کند، برابر با یک است.


با توجه به معادله مکان - زمان درجه دو، درمی‌یابیم حرکت با شتاب ثابت است و طبق معادله $x = \frac{1}{2}at^2 + v_0t + x_0$ درمی‌یابیم شتاب متحرک $\frac{m}{s^2}$ و سرعت اولیه متحرک $10 \frac{m}{s}$ است؛ بنابراین متحرک در لحظه $t = \frac{-v_0}{a}$ تغییر جهت می‌دهد و تا قبل از این لحظه با توجه به این که شتاب و سرعت متحرک در خلاف جهت هم هستند، حرکت کندشونده بوده و سرعت منفی است؛ در نتیجه در این حرکت، کندشونده بودن و حرکت در خلاف جهت محور x یک معنی دارند و نسبت آن‌ها یک است.

۴۶- شکل زیر، نمودار سرعت - زمان دو متحرک است که روی محور x از حال سکون به راه می‌افتند و متحرک B در مبدأ زمان $63m$ جلوتر از متحرک A است. در لحظه‌ای که دو متحرک به هم می‌رسند، اختلاف تندی آن‌ها چند متر بر ثانیه است؟



- (۱) ۴
(۲) ۵
(۳) ۶
(۴) ۸

چون متحرک B در شروع حرکت به اندازه $63m$ جلوتر از متحرک A است، دو متحرک در لحظه‌ای به هم می‌رسند که متحرک A مسافتی به اندازه $63m$ بیش‌تر از متحرک B پیماید؛ به عبارت دیگر باید لحظه‌ای را بیابیم که مساحت بین دو نمودار A و B برابر $63m$ شود.



$$\begin{aligned}
 S_1 &= \frac{6 \times (24 - 12)}{2} = 36 \\
 S_1 + S_2 &= 63 \xrightarrow{S_1=36} S_2 = 27 \\
 S_2 &= 27 \Rightarrow \frac{12 + (24 - 2t')}{2} \times (t' - 6) = 27 \\
 &\Rightarrow (-t' + 18)(t' - 6) = 27 \Rightarrow -t'^2 + 24t' - 108 - 27 = 0 \Rightarrow t'^2 - 24t' + 135 = 0 \\
 &\Rightarrow (t' - 9)(t' - 15) = 0 \Rightarrow \begin{cases} t' = 9s (\checkmark) \\ t' = 15s (*) \end{cases}
 \end{aligned}$$

بنابراین دو متحرک در لحظه $t' = 9s$ به هم می‌رسند. اختلاف سرعت دو متحرک در این لحظه برابر $\frac{m}{s} = 6 = 24 - 2 \times 9 = 24 - 2t'$ است.



در نمودار سرعت - زمان برای دو متحرک، تغییرات فاصله بین دو متحرک در یک بازه زمانی برابر است با مساحت محصور بین دو نمودار در آن بازه زمانی.



۴۷- در شرایط خلأ، دو گلوله را به فاصله زمانی $0.5s$ از یک نقطه از ارتفاع زیاد رها می‌کنیم. بعد از رها شدن گلوله دوم تا رسیدن گلوله

اول به زمین، به ترتیب از راست به چپ، فاصله دو گلوله و اختلاف سرعت دو گلوله چگونه تغییر می‌کند؟ ($g = 10 \frac{N}{kg}$)

- (۱) ثابت، کاهش (۲) افزایش، افزایش (۳) کاهش، ثابت (۴) افزایش، ثابت

(آسان - مفهومی - سریع) (صفحه ۲۴ - ۱۲۰۱)

پاسخ: گزینه ۴

دو گلوله با اختلاف زمانی $0.5s$ رها شده‌اند؛ بنابراین اختلاف سرعت آن‌ها ثابت و برابر $\frac{m}{s} = 5 = 10 \times 0.5$ است ($\Delta v = g\Delta t$).

از طرفی چون همواره سرعت متحرک اول بیش‌تر است؛ بنابراین فاصله دو متحرک همواره در حال افزایش است.



وقتی دو متحرک در حال سقوط آزاد هستند، سرعت نسبی آن‌ها ثابت است.



۴۸- اتومبیلی به جرم 2 تن در یک مسیر دایره‌ای شکل، بر روی یک سطح افقی به شعاع $40m$ با تندی ثابت دور می‌زند. اگر نیرویی که

از طرف سطح زمین بر اتومبیل وارد می‌شود برابر $10^4 \times 2\sqrt{2} N$ باشد، تندی حرکت اتومبیل چند متر بر ثانیه است؟ ($g = 10 \frac{N}{kg}$)

- (۱) 10 (۲) 20 (۳) $20\sqrt{2}$ (۴) 40

(متوسط - محاسباتی - استاندارد) (صفحه ۵۲ - ۱۲۰۲)

پاسخ: گزینه ۲

نیرویی که از طرف سطح زمین به اتومبیل وارد می‌شود (R)، برآیند نیروهای عمودی سطح و اصطکاک است؛ بنابراین می‌توان نوشت:

$$F_N = mg = 2 \times 10^3 \times 10 = 2 \times 10^4 N$$

$$R = \sqrt{F_N^2 + f_s^2} \Rightarrow 2\sqrt{2} \times 10^4 = \sqrt{(2 \times 10^4)^2 + f_s^2} \Rightarrow f_s = 2 \times 10^4 N$$

در این سؤال، نیروی اصطکاک نقش نیروی مرکزگرا را دارد؛ بنابراین می‌توان نوشت:


$$F_C = \frac{mv^2}{r} \quad F_C = f_s = 2 \times 10^4 N \rightarrow 2 \times 10^4 = \frac{2 \times 10^3 v^2}{40} \Rightarrow v^2 = 400 \Rightarrow v = 20 \frac{m}{s}$$



۴۹- شکل زیر، شخصی را نشان می‌دهد که در حال کشیدن یک جعبه 75 کیلوگرمی با نیروی $400N$ روی سطح افقی است. نیرویی

که شخص به جعبه وارد می‌کند افقی و جعبه در حال حرکت است. اگر ضریب اصطکاک جنبشی بین سطح و جعبه 0.4 باشد،

شتاب جعبه چند متر بر مربع ثانیه است؟ ($g = 10 \frac{N}{kg}$)



- (۲) $\frac{3}{4}$ (۴) $\frac{3}{2}$

- (۱) $\frac{4}{3}$ (۳) $\frac{2}{3}$


کام اول

نیروی اصطکاک جنبشی برابر است با:

$$f_k = \mu_k F_N = \mu_k mg = 0.4 \times 75 \times 10 = 300 \text{ N}$$

کام آخر

شتاب حرکت جعبه برابر است با:



$$F_{\text{net}} = ma \Rightarrow 400 - 300 = 75a$$

$$\Rightarrow a = \frac{4}{3} \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$



۵۰- نمودار تغییرات تندی بر حسب زمان سقوط یک چتر باز در هوا به صورت شکل زیر است. در لحظه $t=0$ چتر باز به بیرون می‌پرد و

در لحظه t_1 چتر خود را باز می‌کند. چه تعداد از گزاره‌های زیر در مورد حرکت این چتر باز صحیح است؟

- الف - در بازه زمانی صفر تا t_1 ، بزرگی نیروی خالص وارد بر چتر باز در حال کاهش است.
- ب - در بازه زمانی t_1 تا t_3 ، جهت نیروی خالص وارد بر چتر باز به طرف پایین است.
- ج - در بازه زمانی t_1 تا t_3 ، نیروی خالص وارد بر چتر باز در حال کاهش است.
- د - نیروی مقاومت هوا در لحظه t_2 بیش‌تر از لحظه t_3 است.
- ۱ (۴) ۲ (۳) ۳ (۲) ۴ (۱)

بررسی موارد:



در بازه زمانی صفر تا t_1 ، تندی در حال افزایش است؛ بنابراین نیروی مقاومت هوا در خلاف جهت حرکت در حال افزایش است؛ بنابراین نیروی خالص وارد بر چتر باز در حال کاهش است. در واقع می‌توان گفت که در این بازه زمانی، اندازه شیب خط مماس بر نمودار (بزرگی شتاب) در حال کاهش است؛ بنابراین بزرگی نیروی خالص نیز در حال کاهش است. (✓)



پس از باز شدن چتر در لحظه t_1 ، نیروی مقاومت هوا ناگهان افزایش می‌یابد و حرکت چتر باز تا رسیدن به تندی حدی، کندشونده است؛ بنابراین جهت شتاب و نیروی خالص خلاف جهت حرکت و به سمت بالا است. (✗)



در بازه زمانی t_1 تا t_3 ، نیروی خالص وارد بر چتر باز کاهش می‌یابد تا در نهایت به صفر برسد و چتر باز به تندی حدی برسد. توجه کنید که در این بازه زمانی نیز اندازه شیب خط مماس بر نمودار یعنی بزرگی شتاب در حال کاهش است. (✓)



در بازه t_1 تا t_3 که لحظه t_2 در آن قرار دارد، حرکت کندشونده است و نیروی مقاومت هوا بیش‌تر از وزن است. از لحظه t_3 به بعد، نیروی مقاومت هوا با وزن برابر است. (✓)



در حرکت سقوط چتر باز در هیچ بازه زمانی مشخصی اندازه نیروی خالص و شتاب حرکت در حال افزایش نیست. (یا کاهش می‌یابد یا ثابت است) و جهت حرکت چتر باز را همیشه رو به پایین در نظر بگیرید.



۵۱- وزنه‌ای به جرم 4 kg را به انتهای فنری به طول عادی 12 cm که ثابت آن $20 \frac{\text{N}}{\text{cm}}$ است، می‌بندیم و فنر را از سقف یک آسانسور آویزان می‌کنیم. اگر آسانسور با شتاب ثابت $2/5 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$ از حال سکون رو به بالا شروع به حرکت کند، طول فنر به چند سانتی‌متر می‌رسد؟ ($g = 10 \frac{\text{N}}{\text{kg}}$)

۱۴ (۴)

۱۰ (۳)

۱۴/۵ (۲)

۹/۵ (۱)


(آسان - محاسباتی - استاندارد) (صفحه ۴۳ - ۱۲۰۲)

پاسخ: گزینه ۲

با توجه به آن که جهت شتاب آسانسور رو به بالاست، نیروی فنر برابر $F_e = m(g + a)$ است؛ بنابراین:
 $F_e = m(g + a) \Rightarrow kx = m(g + a)$
 $\Rightarrow 20 \cdot x = 4(10 + 2/5) \Rightarrow x = 2/5 \text{ cm}$
 بنابراین فنر $2/5 \text{ cm}$ کش می‌آید و طول آن از 12 cm به $14/5 \text{ cm}$ می‌رسد.



۵۲- نمودار مکان - زمان یک نوسانگر هماهنگ ساده به شکل زیر است. در یک بازه زمانی دلخواه $0/3$ ثانیه‌ای، حداکثر تندی متوسط نوسانگر چند سانتی‌متر بر ثانیه است؟




$\frac{40}{3}$ (۲)
 $\frac{40\sqrt{2}}{3}$ (۴)

$\frac{80}{3}$ (۱)
 $\frac{80\sqrt{2}}{3}$ (۳)

(متوسط - محاسباتی - استاندارد) (صفحه ۶۳ - ۱۲۰۳)

پاسخ: گزینه ۳

با استفاده از نمودار داده‌شده باید دوره تناوب نوسانگر را به دست بیاوریم:



$$T - \frac{T}{6} = 1 \Rightarrow \frac{5T}{6} = 1 \Rightarrow T = 1/2 \text{ s}$$

برای محاسبه بیش‌ترین تندی متوسط باید بیش‌ترین مسافت طی‌شده در بازه زمانی دلخواه $0/3$ ثانیه‌ای را به دست بیاوریم. حداکثر مسافت نوسانگر در حوالی مبدأ نمودار است. $0/3$ ثانیه برابر $\frac{T}{4}$ است؛ پس باید بازه زمانی $\frac{T}{8}$ قبل از $x=0$ تا $\frac{T}{8}$ بعد از $x=0$ باشد؛ در نتیجه بیش‌ترین مسافت هنگامی است که نوسانگر از نقطه $x = -\frac{\sqrt{2}}{2} A$ به نقطه $x = \frac{\sqrt{2}}{2} A$ حرکت کند.

$$\ell_{\max} = \frac{\sqrt{2}}{2} A + \frac{\sqrt{2}}{2} A = \sqrt{2} A = \sqrt{2} \times 8 = 8\sqrt{2} \text{ cm}$$

در نتیجه حداکثر تندی متوسط برابر است با:

$$S_{\text{av max}} = \frac{\ell_{\max}}{\Delta t} = \frac{8\sqrt{2}}{0/3} = \frac{80\sqrt{2}}{3} \frac{\text{cm}}{\text{s}}$$



حداکثر تندی متوسط نوسانگر هماهنگ ساده در یک بازه زمانی کمتر از $\frac{T}{4}$ به گونه‌ای است که نوسانگر در ابتدا و انتهای آن مسیر، فاصله یکسانی از وسط پاره‌خط نوسان داشته باشد و وسط پاره‌خط نوسان، دقیقاً وسط مسیر باشد.



۵۳- در یک سامانه جرم - فنر افقی بدون اصطکاک، در لحظه‌ای که بزرگی سرعت نوسانگر $\frac{1}{3}$ بزرگی سرعت آن در مرکز نوسان است، انرژی پتانسیل نوسانگر $\frac{1}{6}J$ می‌باشد. اگر ثابت فنر $360 \frac{N}{m}$ و طول عادی فنر $50cm$ باشد، حداکثر طول فنر در حین نوسان چند سانتی‌متر است؟

۷۰ (۴)

۶۰ (۳)

۵۵ (۲)

۴۰ (۱)

(متوسط - محاسباتی - استاندارد) - صفحه ۶۶ - ۱۲۰۳

پاسخ: گزینه ۳

بزرگی سرعت در مرکز نوسان بیشینه است؛ پس:

$$v = \frac{1}{3} v_m$$

$$\frac{U}{E} = 1 - \left(\frac{v}{v_m}\right)^2 \Rightarrow \frac{1/6}{E} = 1 - \left(\frac{1}{3}\right)^2 \Rightarrow \frac{1/6}{E} = \frac{8}{9}$$

$$\Rightarrow E = 1/8 J$$

حالا طبق رابطه انرژی مکانیکی نوسانگر جرم - فنر، دامنه نوسان را به دست می‌آوریم:

$$E = \frac{1}{2} k A^2 \Rightarrow 1/8 = \frac{1}{2} \times 360 \times A^2$$

$$\Rightarrow A^2 = 0.01 \Rightarrow A = 0.1 m = 10 cm$$

در نهایت حداکثر طول فنر برابر است با:

$$L_{max} = L_0 + A = 50 + 10 = 60 cm$$



حداکثر طول فنر در حرکت نوسان هماهنگ ساده برابر است با طول تعادلی فنر به علاوه دامنه نوسان:

$$L_{max} = L_0 + A$$



۵۴- یک دستگاه صوتی، صدایی با تراز شدت $\beta_1 = 75 dB$ و دستگاه صوتی دیگر، صدایی با تراز شدت $\beta_2 = 95 dB$ ایجاد می‌کند. شدت صوت بلندتر، چند برابر شدت صوت دیگر است؟ ($\log 2 = 0.3$)

۲۰۰ (۴)

۱۰۰ (۳)

۲۰ (۲)

۱۰ (۱)

(آسان - محاسباتی - سریع) - صفحه ۸۰ - ۱۲۰۳

پاسخ: گزینه ۳

با توجه به رابطه $\beta_2 - \beta_1 = 10 \log \frac{I_2}{I_1}$ می‌توان نوشت:

$$\beta_2 - \beta_1 = 10 \log \frac{I_2}{I_1} \Rightarrow 95 - 75 = 10 \log \frac{I_2}{I_1}$$

$$\Rightarrow \log \frac{I_2}{I_1} = 2 \Rightarrow \frac{I_2}{I_1} = 10^2 = 100$$



۵۵- تندی انتشار موج عرضی در یک تار، $30 \frac{m}{s}$ است. اگر نیروی کشش تار را ۴۴ درصد افزایش دهیم، مسافتی که این موج در مدت

دو ثانیه طی می‌کند، چند متر می‌شود؟

۶۰ (۴)

۱۴۴ (۳)

۷۲ (۲)

۳۶ (۱)

(آسان - محاسباتی - استاندارد) - صفحه ۷۳ - ۱۲۰۳

پاسخ: گزینه ۲

ابتدا باید تندی انتشار موج را در حالت جدید به دست بیاوریم. طبق رابطه $v = \sqrt{\frac{F}{\mu}}$ داریم:

$$F_2 = F_1 + \frac{44}{100} F_1 \Rightarrow F_2 = \frac{144}{100} F_1$$

$$\frac{v_2}{v_1} = \sqrt{\frac{F_2}{F_1}} \Rightarrow \frac{v_2}{30} = \sqrt{\frac{144}{100}} \Rightarrow v_2 = 36 \frac{m}{s}$$


سپس مسافت طی شده در ۲s را به دست می‌آوریم:

$$\ell = v \cdot \Delta t \xrightarrow{v=36 \frac{m}{s}} \xrightarrow{\Delta t=2s} \ell = 36 \times 2 = 72m$$



۵۶- مطابق شکل زیر، پرتوی نوری از آب وارد هوا می‌شود. اگر در ورود به محیط (۲)، 15° از راستای اولیه منحرف شود و در این محیط،

$2\mu m$ به طول موج اولیه‌اش اضافه شود، بسامد نور چند هرتز است؟ ($3 \times 10^8 \frac{m}{s}$ = تندی نور در هوا و $\sqrt{2} = 1/4$)



$$\frac{2}{7} \times 10^{14} \quad (2)$$

$$\frac{3}{4} \times 10^{14} \quad (1)$$

$$\frac{7}{4} \times 10^{14} \quad (4)$$

$$\frac{3}{7} \times 10^{14} \quad (3)$$

(متوسط - محاسباتی - استاندارد) - صفحه ۹۶ - ۱۲۰۴

پاسخ: گزینه ۳

گام اول

چون نور از محیط غلیظ به رقیق وارد شده، از خط عمود دورتر می‌شود:

$$\theta_2 = 30^\circ + 15^\circ = 45^\circ$$

گام دوم

طول موج را در هر دو محیط محاسبه می‌کنیم:

$$\frac{\sin \theta_2}{\sin \theta_1} = \frac{v_2}{v_1} = \frac{\lambda_2}{\lambda_1} \Rightarrow \frac{\sin 45^\circ}{\sin 30^\circ} = \frac{\lambda + 2}{\lambda} \Rightarrow \frac{1/2}{1/4} = \frac{\lambda + 2}{\lambda}$$

$$\Rightarrow \lambda_1 = 5\mu m = 5 \times 10^{-6} m, \quad \lambda_2 = 7\mu m = 7 \times 10^{-6} m$$


گام آخر

بسامد نور را از $f = \frac{v}{\lambda}$ محاسبه می‌کنیم:

$$f = \frac{v_2}{\lambda_2} = \frac{3 \times 10^8}{7 \times 10^{-6}} = \frac{3}{7} \times 10^{14} \text{ Hz}$$




۵۷- در شکل زیر، پرتوی SI موازی با سطح آینه M_3 به آینه M_1 می‌تابد و مسیری که در شکل مشخص است را طی می‌کند. α چند درجه است؟



- (۱) 100°
(۲) 110°
(۳) 120°
(۴) 130°

(متوسط - محاسباتی - استاندارد) (صفحه ۹۱ - ۱۲۰۴)

پاسخ: گزینه ۳



مسیر پرتوی نور مطابق شکل است. در مثلث $\triangle IEF$ می‌توان نوشت:

$$\theta + 80^\circ + 60^\circ = 180^\circ \Rightarrow \theta = 40^\circ$$


به همین صورت در مثلث $\triangle IEG$ نیز می‌توان نوشت:

$$\theta + 120^\circ + \gamma = 180^\circ \xrightarrow{\theta = 40^\circ} \gamma = 20^\circ$$

در مثلث $\triangle GHJ$ می‌توان نوشت:

$$\gamma + 100^\circ + \beta = 180^\circ \xrightarrow{\gamma = 20^\circ} \beta = 60^\circ$$

در چهارضلعی $IGJK$ باید جمع زوایا 360° شود. به این ترتیب می‌توان نوشت:



$$100^\circ + 140^\circ + 60^\circ + (180^\circ - \alpha) = 360^\circ$$

$$\alpha = 120^\circ$$



۵۸- طول یک تار برابر 40 cm و جرم آن برابر 20 g است. نیروی کشش این تار چند نیوتون باشد تا اختلاف بسامد هماهنگ‌های اول و چهارم این تار برابر 375 Hz باشد؟

- (۱) ۲۰۰ (۲) ۲۵۰ (۳) ۴۰۰ (۴) ۵۰۰

(متوسط - محاسباتی - استاندارد) (صفحه ۱۰۷ - ۱۲۰۴)

پاسخ: گزینه ۴

با توجه به اختلاف بسامدهای اول و چهارم تار، بسامد هماهنگ اصلی را به دست می‌آوریم:

$$f_4 - f_1 = 375 \xrightarrow{f_4 = 4f_1} 4f_1 - f_1 = 375 \Rightarrow f_1 = 125\text{ Hz}$$

$$f_n = \frac{nv}{2L} \Rightarrow 125 = \frac{1 \times v}{2 \times 0.4} \Rightarrow v = 100 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

حال برای محاسبه نیروی کشش تار می‌توان نوشت:

$$v = \sqrt{\frac{F}{\mu}} = \sqrt{\frac{F.L}{m}} \Rightarrow 100 = \sqrt{\frac{F \times 0.4}{20 \times 10^{-3}}} \Rightarrow F = 500 \text{ N}$$



بسامد هماهنگ n ام تار برابر است با n برابر بسامد هماهنگ اول یعنی $f_n = n f_1$.



۵۹- یک لامپ 100 W فوتون‌هایی با طول موج 600 nm گسیل می‌کند. اگر بازده لامپ 20% درصد باشد، در هر دقیقه چند فوتون از

این لامپ گسیل می‌شود؟ ($h = 6.6 \times 10^{-34} \text{ J.s}$, $c = 3 \times 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}}$)

- (۱) 4×10^{21} (۲) 4×10^{19} (۳) $1/6 \times 10^{22}$ (۴) $1/6 \times 10^{19}$

(متوسط - محاسباتی - استاندارد) - صفحه ۱۱۷ - ۱۲۰۵

پاسخ: گزینه ۱

ابتدا توان مفید این لامپ را به دست می‌آوریم و سپس تعداد فوتون‌های گسیلی از این لامپ در هر دقیقه را محاسبه می‌کنیم:

$$R_a = \frac{P_r}{P_1} \times 100 \Rightarrow 20 = \frac{P_r}{100} \times 100 \Rightarrow P_r = 20 \text{ W}$$

$$P = \frac{E}{t} = \frac{nhf}{t} \Rightarrow P = \frac{nhc}{t\lambda}$$

$$n = \frac{Pt\lambda}{hc} = \frac{20 \times 60 \times 600 \times 10^{-9}}{6.6 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8} = 4 \times 10^{21}$$



۶۰- کدام یک از گزینه‌های زیر در مورد مدل اتمی بور نادرست است؟

- (۱) در اتم هیدروژن و در دمای اتاق، الکترون اغلب در تراز $n = \infty$ قرار دارد.
- (۲) وقتی الکترون در یک مدار مانای مشخص قرار دارد، هیچ نوع تابش الکترومغناطیسی گسیل نمی‌شود.
- (۳) هنگام گذار الکترون از یک حالت مانا با انرژی بیشتر به یک حالت مانا با انرژی کمتر، یک فوتون تابش می‌شود.
- (۴) این مدل، طیف گسیلی و جذبی گاز هیدروژن اتمی را با موفقیت توجیه کرد.

(آسان - خطبه‌خط - سریع) - صفحه ۱۳۱ - ۱۲۰۵

پاسخ: گزینه ۱

در دمای اتاق، الکترون اغلب در حالت پایه، یعنی $n = 1$ قرار دارد. سایر عبارات با توجه به متن کتاب درسی صحیح هستند.



۶۱- دو ذره باردار، مطابق شکل زیر در فاصله معینی از هم ثابت شده و نیروی الکتریکی به بزرگی F به یکدیگر وارد می‌کنند. اگر به

تعداد $1/25 \times 10^{13}$ الکترون از ذره (۲) به ذره (۱) منتقل کنیم تا اندازه بار الکتریکی دو ذره یکسان شود، آن‌گاه فاصله بین دو ذره

را چند درصد و چگونه تغییر دهیم تا بزرگی نیروی الکتریکی بین دو ذره، برابر با $\frac{16}{3} F$ شود؟ ($e = 1/6 \times 10^{-19} \text{ C}$)

- (۱) ۲۵، افزایش (۲) ۲۵، کاهش (۳) ۵۰، کاهش (۴) ۵۰، افزایش

(سخت - محاسباتی - استاندارد) - صفحه ۶ - ۱۱۰۱

پاسخ: گزینه ۳

کام اول

ابتدا اندازه بار منتقل شده (q') را به دست می‌آوریم:

$$q' = -ne = -1/25 \times 10^{13} \times 1/6 \times 10^{-19} = -\frac{5}{4} \times \frac{1}{5} \times 10^{-6} = -2 \times 10^{-6} \text{ C} \Rightarrow q' = -2 \mu\text{C}$$

با انتقال بار q' بین دو ذره، اندازه بار دو ذره یکسان می‌شود؛ بنابراین داریم:

$$|q_1| = |q_2| \Rightarrow |q - 2| = |3q + 2| \Rightarrow \begin{cases} q - 2 = 3q + 2 \Rightarrow 2q = -4 \Rightarrow q = -2\mu C \\ q - 2 = -3q - 2 \Rightarrow 4q = 0 \Rightarrow q = 0 \text{ (غق ق)} \end{cases}$$

$$\xrightarrow{q = -2\mu C} \begin{cases} q_1' = q - 2 = -4\mu C \\ q_2' = 3q + 2 = -4\mu C \end{cases}$$

با تغییر یافتن بار ذرات، می‌خواهیم فاصله بین دو ذره را طوری تغییر دهیم تا بزرگی نیروی الکتریکی بین دو ذره، $\frac{16}{3}$ برابر شود:

$$\frac{F'}{F} = \frac{|q_1'|}{|q_1|} \times \frac{|q_2'|}{|q_2|} \times \left(\frac{r}{r'}\right)^2 \Rightarrow \frac{16}{3} = \frac{4}{2} \times \frac{4}{6} \times \left(\frac{r}{r'}\right)^2 \Rightarrow 4 = \left(\frac{r}{r'}\right)^2 \Rightarrow 2 = \frac{r}{r'} \Rightarrow \frac{r'}{r} = \frac{1}{2}$$

پس فاصله دو ذره را باید ۵۰ درصد کاهش دهیم.

راهنمای زنگ‌بازی

بچه‌ها تعداد الکترون‌ها و مقدار بار اولیه در این سؤال اهمیتی ندارد. درواقع می‌خواهیم نیروی بین بارها را در دو حالت زیر مقایسه کنیم:

	$F = k \frac{q \times 3q}{r^2}$
	$F' = k \frac{2q \times 2q}{r'^2}$

$$\frac{F'}{F} = \frac{\frac{4kq^2}{r'^2}}{\frac{3kq^2}{r^2}} = \frac{4}{3} \times \left(\frac{r}{r'}\right)^2 \xrightarrow{\frac{F'}{F} = \frac{16}{3}} \frac{16}{3} = \frac{4}{3} \times \left(\frac{r}{r'}\right)^2$$

$$\Rightarrow r' = \frac{1}{2}r \Rightarrow \text{فاصله ۵۰ درصد کاهش می‌یابد.}$$



۶۲- روی سطح بادکنکی به جرم $10g$ بار الکتریکی $20nC$ ایجاد می‌کنیم و آن را در یک میدان الکتریکی قرار می‌دهیم. بزرگی و جهت این میدان الکتریکی در صورتی که بادکنک معلق بماند، در SI کدام است؟ ($g = 10 \frac{m}{s^2}$) و اندازه نیروی شناوری وارد بر بادکنک را $0.5N$ فرض کنید.)

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| (۱) $10^{-5} / 5$ ، به سمت پایین | (۲) 5×10^{-5} ، به سمت بالا |
| (۳) $10^{-5} / 5$ ، به سمت بالا | (۴) 5×10^{-5} ، به سمت پایین |


(متوسط - محاسباتی - استاندارد) - صفحه ۱۹ - ۱۱۰۱

پاسخ: گزینه ۱

ابتدا نیروهای وارد بر بادکنک را به دست می‌آوریم:

(به سمت پایین) $mg = 10 \times 10^{-3} \times 10 = 0.1N$ نیروی وزن

(به سمت بالا) $F_b = 0.5N$ نیروی شناوری



بنابراین برای این که بادکنک معلق بماند، باید نیروی الکتریکی وارد بر بادکنک به سمت بالا باشد.

$$F_{\text{برایند}} = 0 \Rightarrow F_{\text{الکتریکی}} + F_b = mg \Rightarrow F_{\text{الکتریکی}} + 0.05 = 0.1$$

$$\Rightarrow F_{\text{الکتریکی}} = 0.05 \text{ N}$$

$$F_{\text{الکتریکی}} = E|q| \Rightarrow 0.05 = E \times 200 \times 10^{-9} \Rightarrow E = 2.5 \times 10^5 \frac{\text{N}}{\text{C}}$$

با توجه به این که بار بادکنک منفی بوده و نیروی الکتریکی به سمت بالا بر آن وارد می‌شود؛ بنابراین جهت میدان الکتریکی باید به سمت پایین باشد.




جهت نیروی الکتریکی وارد بر بار منفی در خلاف جهت خطوط میدان است.



۶۳- بار الکتریکی q ، مطابق شکل زیر، از نقطه A تا نقطه B سپس تا نقطه C در میدان الکتریکی یکنواخت به بزرگی $4 \times 10^4 \frac{\text{N}}{\text{C}}$

جابه‌جا می‌شود و کار نیروی الکتریکی در این جابه‌جایی برابر 4 mJ است. بار q چند نانوکولن است؟



$$240\sqrt{10} \quad (2)$$

$$800 \quad (4)$$

$$-240\sqrt{10} \quad (1)$$

$$-800 \quad (3)$$

($AB = 5 \text{ cm}$, $BC = 15 \text{ cm}$)

(آسان - محاسباتی - استاندارد) - صفحه ۲۲ - ۱۱۰۱

پاسخ: گزینه ۳

می‌دانیم که بر ذره باردار، نیروی الکتریکی در راستای میدان الکتریکی وارد می‌شود. چون در جابه‌جایی AB ، جابه‌جایی بر راستای نیرو عمود است؛ بنابراین کار میدان الکتریکی در این جابه‌جایی برابر صفر است. از طرفی کار نیروی الکتریکی مثبت است، پس نیرو و جابه‌جایی در مسیر BC هم‌جهت‌اند و بنابراین بار ذره، منفی است:

$$W_E = W_{BC} = E|q|d \cos \theta$$

$$\frac{W_E = 4 \times 10^{-3} \text{ J}, \cos \theta = 1}{E = 4 \times 10^4 \frac{\text{N}}{\text{C}}, d = 15 \times 10^{-2} \text{ m}} \rightarrow 4 \times 10^{-3} = 4 \times 10^4 \times |q| \times 15 \times 10^{-2} \Rightarrow |q| = 8 \times 10^{-7} \text{ C} = 800 \text{ nC}$$


$$\Rightarrow q = -800 \text{ nC}$$



هرگاه ذره‌ای عمود بر خطوط میدان الکتریکی جابه‌جا شود، کاری روی آن انجام نمی‌شود.



۶۴- در مدار زیر، عقربه پتانسیومتر دقیقاً در وسط قرار دارد و توان خروجی مولد بیشینه است. اگر عقربه پتانسیومتر را کاملاً در جهت ساعتگرد بچرخانیم تا کل مقاومت پتانسیومتر در مدار قرار بگیرد، اعداد نشان داده شده توسط آمپرسنج ایده آل و ولتسنج ایده آل، به ترتیب از راست به چپ، چند برابر می شود؟



- (۱) $\frac{4}{3}, \frac{2}{3}$
 (۲) $\frac{2}{3}, \frac{4}{3}$
 (۳) $\frac{2}{3}, \frac{2}{3}$
 (۴) $\frac{4}{3}, \frac{4}{3}$

(متوسط - محاسباتی - استاندارد) - صفحه ۶۴ - ۱۱۰۲

پاسخ: گزینه ۱

گام اول

فرض کنید مقاومت کل پتانسیومتر برابر با R باشد؛ بنابراین در حالت اول که عقربه پتانسیومتر دقیقاً در وسط قرار دارد، فقط نصف مقاومت پتانسیومتر در مدار قرار می گیرد و داریم:

$$R_{eq1} = \frac{R}{2} \xrightarrow{\text{توان خروجی مولد بیشینه است.}} r = R_{eq1} \Rightarrow r = \frac{R}{2}$$

$$\Rightarrow I_1 = \frac{\varepsilon}{R_{eq1} + r} = \frac{\varepsilon}{\frac{R}{2} + \frac{R}{2}} = \frac{\varepsilon}{R}$$

$$V_1 = R_{eq1} \cdot I_1 = \frac{R}{2} \times \frac{\varepsilon}{R} = \frac{\varepsilon}{2}$$

گام آخر

وقتی عقربه پتانسیومتر کاملاً در جهت ساعتگرد می چرخد، کل مقاومت پتانسیومتر در مدار قرار می گیرد و داریم:

$$R_{eq2} = R \Rightarrow I_2 = \frac{\varepsilon}{R_{eq2} + r} = \frac{\varepsilon}{R + \frac{R}{2}} = \frac{2}{3} \frac{\varepsilon}{R} = \frac{2}{3} I_1 \Rightarrow \frac{I_2}{I_1} = \frac{2}{3}$$


$$V_2 = R_{eq2} \cdot I_2 = R \times \frac{2\varepsilon}{3R} = \frac{2}{3} \varepsilon \Rightarrow \frac{V_2}{V_1} = \frac{\frac{2}{3} \varepsilon}{\frac{\varepsilon}{2}} = \frac{4}{3}$$

نکته

وقتی مقاومت خارجی مدار با مقاومت درونی باتری برابر باشد ($R_{eq} = r$) توان خروجی مولد بیشینه است.



۶۵- در مدار نشان داده شده، مقاومت آمپرسنج و ولتسنج به ترتیب، 6Ω و 63Ω است. اگر آمپرسنج $0.36A$ و ولتسنج $25/2V$ را نشان دهد، نسبت $\frac{R}{r}$ کدام است؟



- (۱) ۱۶
(۲) ۳۲
(۳) $\frac{64}{3}$
(۴) $\frac{128}{3}$

پاسخ: گزینه ۲

(سخت - محاسباتی - استاندارد ۲ - صفحه ۷۱ - ۱۱۰۲)

گام اول

ولتسنج به شاخه مقاومت و آمپرسنج به صورت موازی متصل شده است؛ بنابراین:

$$V_{\text{ولتسنج}} = (R + R_{\text{آمپرسنج}}) \cdot I_{\text{آمپرسنج}} \Rightarrow 25/2 = (R + 6) \times 0.36 \Rightarrow R = 64\Omega$$

گام دوم

جریان گذرنده از ولتسنج برابر است با:

$$V_{\text{ولتسنج}} = R_{\text{ولتسنج}} \cdot I_{\text{ولتسنج}} \Rightarrow 25/2 = 63 \times I_{\text{ولتسنج}} \Rightarrow I_{\text{ولتسنج}} = 0.04A$$

بنابراین جریان کل مدار برابر است با:

$$I = I_{\text{ولتسنج}} + I_{\text{آمپرسنج}} = 0.04 + 0.36 = 0.4A$$

گام آخر

ولتسنج به مولد نیز به طور موازی وصل است؛ بنابراین:

$$V_{\text{ولتسنج}} = \varepsilon - rI \Rightarrow 25/2 = 26 - 0.4r \Rightarrow r = 2\Omega$$

$$\Rightarrow \frac{R}{r} = \frac{64}{2} = 32$$



۶۶- دو مقاومت موازی ۶ اهمی و ۱۲ اهمی به طور متوالی به یک مقاومت ۸ اهمی وصل شده است. اکنون، مجموعه مقاومت‌ها را به دو سر یک باتری آرمانی ۳۶ ولتی می‌بندیم. توان مصرفی در مقاومت ۶ اهمی چند وات است؟


- (۱) ۶ (۲) ۱۲ (۳) ۲۴ (۴) ۴۸

پاسخ: گزینه ۳

(متوسط - محاسباتی - استاندارد ۳ - صفحه ۷۳ - ۱۱۰۲)

گام اول

شکل مدار را رسم می‌کنیم و مقاومت معادل و جریان را به دست می‌آوریم:



$$R_{eq} = \frac{6 \times 12}{6 + 12} + 8 = 4 + 8 = 12\Omega$$

$$I = \frac{\varepsilon}{r + R_{eq}} = \frac{36}{0 + 12} = 3A$$

$$x + 2x = I \Rightarrow 3x = 3A \Rightarrow x = 1A$$

گام آخر

بنابراین جریان عبوری از مقاومت 6Ω برابر $I_{6\Omega} = 2x = 2A$ است و توان مصرفی آن برابر است با:

$$P_{6\Omega} = RI_{6\Omega}^2 = 6 \times 2^2 = 24W$$



- ۶۷- سیمی به طول ۲m عمود بر یک میدان مغناطیسی یکنواخت به بزرگی ۵mT قرار دارد و از آن جریان ۴A عبور می‌کند. اگر بزرگی نیرویی که بر این سیم وارد می‌شود، ۳۰mN باشد، چند درصد طول این سیم در میدان قرار گرفته است؟
- (۱) ۲۵ (۲) ۴۰ (۳) ۶۰ (۴) ۷۵

پاسخ: گزینه ۴

(متوسط - محاسباتی - استاندارد) - صفحه ۹۳ - ۱۱۰۳

طبق رابطه نیروی مغناطیسی وارد بر سیم حامل جریان داریم:

$$F = BIl \sin \theta \quad \frac{F = 30 \text{ mN} = 3 \times 10^{-2} \text{ N}}{B = 5 \text{ mT} = 5 \times 10^{-3} \text{ T}, I = 4 \text{ A}, \theta = 90^\circ} \rightarrow 3 \times 10^{-2} = 5 \times 10^{-3} \times 4 \times l \times 1$$

$$\Rightarrow l = 1/5 \text{ m}$$

بنابراین ۱/۵m از سیم در داخل میدان مغناطیسی قرار دارد؛ در نتیجه داریم:

$$\frac{l}{L} \times 100 = \frac{1/5}{2} \times 100 = 75\%$$

پس ۷۵ درصد سیم داخل میدان مغناطیسی قرار دارد.



نیروی مغناطیسی همیشه بر تمام طول سیم وارد نمی‌شود، بلکه بر بخشی از سیم وارد می‌شود که در داخل میدان مغناطیسی قرار گرفته است.

- ۶۸- از پیچه مسطحی به شعاع ۱۲/۵۶cm که از ۲۰۰۰ دور سیم نازک ساخته شده، جریان الکتریکی ۱mA عبور می‌کند. اندازه میدان مغناطیسی در مرکز پیچه چند گاوس است؟ ($\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \frac{\text{T.m}}{\text{A}}$, $\pi \approx 3/14$)
- (۱) ۰/۱ (۲) ۱ (۳) ۱۰ (۴) ۱۰۰


پاسخ: گزینه ۱

(آسان - محاسباتی - استاندارد) - صفحه ۹۸ - ۱۱۰۳

میدان مغناطیسی در مرکز پیچه به صورت زیر قابل محاسبه است:


$$B = \mu_0 \frac{NI}{2r} = 4 \times 3/14 \times 10^{-7} \times \frac{2000 \times 10^{-3}}{2 \times 12/56 \times 10^{-2}} = 10^{-5} \text{ T} = 0/1 \text{ G}$$

- ۶۹- مطابق شکل، سه سیم راست موازی و بسیار بلند، در سه رأس یک مربع قرار دارند و حامل جریان الکتریکی هستند. اگر میدان مغناطیسی خالص در رأس چهارم (نقطه O) صفر باشد، کدام گزینه در مورد اندازه و جهت جریان I' درست است؟



- (۱) $I' > I$ و درون سو
(۲) $I' < I$ و برون سو
(۳) $I' < I$ و درون سو
(۴) $I' > I$ و برون سو

طبق قاعده دست راست، جهت میدان مغناطیسی در یک نقطه از اطراف سیم حامل جریان بدین صورت است که انگشت شست در جهت جریان قرار می‌گیرد و جهت چرخش چهار انگشت، جهت میدان را نشان می‌دهد؛ بنابراین مطابق شکل زیر، جهت میدان‌های مغناطیسی در نقطه O به صورت زیر است:



با توجه به جریان‌های یکسان سیم‌های (۱) و (۲) و نیز فاصله یکسان با نقطه O، اندازه میدان‌های $\vec{B}_1$ و $\vec{B}_2$ با هم برابر است و برآیند آن‌ها عمود بر قطر مربع (خط چین) است؛ بنابراین میدان $\vec{B}_3$ باید در خلاف جهت آن باشد تا میدان خالص در نقطه O صفر شود. در نتیجه، طبق قاعده دست راست، جریان در سیم (۳)، برون‌سو است. از طرفی، میدان مغناطیسی در فاصله‌های دورتر، ضعیف‌تر است؛ بنابراین جریان I' باید از I بیش‌تر باشد تا بتواند اثر فاصله را خنثی نماید.



۷۰- آهنگ تغییر سرعت متحرکی $\frac{25920 \text{ km}}{\text{h}^2}$ است. شتاب این متحرک چند واحد SI است؟

- (۱) ۱/۵ (۲) ۲ (۳) ۳ (۴) ۴

با استفاده از تبدیل یکا به روش زنجیره‌ای می‌توانیم بنویسیم:

$$a = 25920 \cdot \frac{\text{km}}{\text{h}^2} \times \frac{10^3 \text{ m}}{1 \text{ km}} \times \left(\frac{1 \text{ h}}{3600 \text{ s}}\right)^2 = \frac{25920 \times 10^3}{3600^2} \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

$$\Rightarrow a = 2 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$



۷۱- چگالی آب یک دریاچه $1025 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$ است. اگر از عمق ۱۵ متری این دریاچه به عمق ۲۵ متری برویم، فشار ۴۰ درصد افزایش می‌یابد. فشار در عمق ۱۰ متری این دریاچه چند پاسکال است؟ ($g = 9.8 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$)

- (۱) ۲۰۰۴۵۰ (۲) ۲۰۰۹۰۰ (۳) ۲۰۲۵۰۰ (۴) ۲۰۵۰۰



عمق‌های ۱۵ متری و ۲۵ متری را به ترتیب با اندیس‌های ۱ و ۲ نشان می‌دهیم؛ بنابراین داریم:

$$P_2 = 1/4 P_1 \Rightarrow P_0 + \rho g h_2 = 1/4 (P_0 + \rho g h_1) \Rightarrow 0/4 P_0 = \rho g (h_2 - 1/4 h_1)$$

$$\Rightarrow 0/4 P_0 = 1025 \times 9.8 \times (25 - 1/4 \times 15) = 1025 \times 9.8 \times 4$$

$$\Rightarrow P_0 = \frac{1025 \times 9.8 \times 4}{0/4} = 1025 \times 98 \text{ Pa}$$



فشار در عمق ۱۰ متری برابر است با:

$$P = P_0 + \rho g h = 1025 \times 98 + 1025 \times 9.8 \times 10 = 200900 \text{ Pa}$$



۷۲- مطابق شکل زیر، لوله U شکلی را در نظر بگیرید که محتوی حجم مساوی از آب و مایعی با چگالی ρ_1 است. اگر فشار پیمانه‌ای


هوای درون ریه شخص برابر 1 kPa باشد، چگالی ρ_1 چند گرم بر لیتر است؟ ($g = 10 \frac{\text{N}}{\text{kg}}$, $\rho_{\text{آب}} = 1000 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$)

(۱) ۸۷۵

(۲) ۰/۸۷۵

(۳) ۱۱۲۵

(۴) ۱/۱۲۵



(متوسط - محاسباتی - استاندارد) (صفحه ۳۸ - ۱۰۰۲)

پاسخ: گزینه ۱

مجموع فشار ریه شخص و مایع ρ_1 برابر مجموع فشار آب و هوای محیط است؛ بنابراین:

$$P_{\text{ریه}} + P_{\text{مایع}} = P_{\text{آب}} + P_0$$

$$\Rightarrow P_{\text{ریه}} - P_0 = \rho_{\text{آب}} gh_{\text{آب}} - \rho_{\text{مایع}} gh_{\text{مایع}} \Rightarrow 1000 = 1000 \times 10 \times 0/8 - \rho_1 \times 10 \times 0/8$$

$$\Rightarrow 1000 = 8000 - 8\rho_1 \Rightarrow \rho_1 = 875 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} = 875 \frac{\text{g}}{\text{L}}$$

تذکره!

دقت کنید یکاهای $\frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$ و $\frac{\text{g}}{\text{L}}$ معادل هستند.



۷۳- مطابق شکل زیر، توپی از سطح زمین با تندی $40 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ به طرف صخره‌ای پرتاب می‌شود و با تندی $30 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ به بالای صخره برخورد می‌کند.

اگر همان توپ با تندی $30 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ به طرف صخره پرتاب شود، با چه تندی بر حسب متر بر ثانیه به بالای صخره برخورد می‌کند؟


(فرض کنید مقاومت هوا ناچیز است و فاصله توپ تا صخره برای رسیدن آن به بالای صخره کافی است.)

(۱) $10\sqrt{2}$

(۲) ۲۰

(۳) $15\sqrt{2}$

(۴) ۲۲/۵



(متوسط - محاسباتی - استاندارد) (صفحه ۶۹ - ۱۰۰۳)

پاسخ: گزینه ۱

مقاومت هوا ناچیز است؛ بنابراین انرژی مکانیکی توپ در هر دو حالت، پایسته است. سطح زمین را به عنوان مبدأ پتانسیل گرانشی در نظر می‌گیریم. داریم:

$$E_2 = E_1 \Rightarrow U_2 + K_2 = U_1 + K_1 \Rightarrow mgh + \frac{1}{2}mv_2^2 = \frac{1}{2}mv_1^2$$

$$\xrightarrow{\times 2} v_1^2 - v_2^2 = 2gh \Rightarrow \begin{cases} \text{حالت اول: } 40^2 - 30^2 = 2gh \\ \text{حالت دوم: } 30^2 - v_2^2 = 2gh \end{cases}$$

$$\Rightarrow 40^2 - 30^2 = 30^2 - v_2^2 \Rightarrow v_2^2 = 200 \Rightarrow v_2 = 10\sqrt{2} \frac{m}{s}$$








وقتی فقط نیروی وزن بر روی جسمی کار انجام می‌دهد، در اثر تغییر ارتفاع h داریم:

$$v_{\text{بالا}}^2 - v_{\text{پایین}}^2 = 2gh$$



۷۴- درون یک کتری برقی با ظرفیت گرمایی ناچیز، مقداری آب با دمای 40°C می‌ریزیم و کتری را روشن می‌کنیم. نمودار دمای آب بر حسب زمان مطابق شکل زیر است. اگر در همان کتری، همان مقدار آب ولی با دمای 20°C بریزیم، نمودار دمای آب بر حسب زمان مطابق با کدام گزینه است؟ (در هر دو حالت، لحظه روشن شدن کتری را $t=0$ در نظر بگیرید.)



(متوسط - استدلالی - استاندارد) (صفحه ۱۰۸ - ۱۰۴)

پاسخ: گزینه ۱

کلام اول

زمان لازم برای رسیدن آب به نقطه جوش را محاسبه می‌کنیم. در فرایند تغییر دمای آب داریم:

$$Q = mc\Delta\theta = P \cdot \Delta t \Rightarrow \begin{cases} \text{حالت اول: } mc(100 - 40) = P \times 120 & \text{(I)} \\ \text{حالت دوم: } mc(100 - 20) = P \times \Delta t & \text{(II)} \end{cases}$$

از تقسیم رابطه (I) بر (II) داریم:

$$\frac{100 - 40}{100 - 20} = \frac{120}{\Delta t} \Rightarrow \Delta t = 160s$$

کلام آخر

زمان لازم برای تبخیر آب را به دست می‌آوریم. گرمای لازم برای تبخیر آب از رابطه $Q = mL_v$ به دست می‌آید. با توجه به این که جرم آب و گرمای نهان تبخیر آب در هر دو حالت یکسان است؛ بنابراین مقدار گرمای لازم و در نتیجه، زمان لازم برای تبخیر آب در هر دو حالت، یکسان و برابر 300 ثانیه است؛ بنابراین آب در لحظه $t = 160s$ به جوش می‌آید و در لحظه $t = 460s$ به طور کامل بخار می‌شود و گزینه (۱) درست است.



برای یک گرمکن با توان ثابت، گرمای منتقل شده با زمان انتقال گرما متناسب است.



۷۵- به یک قطعه آلومینیمی در فشار متعارف جو (۱۰۰ kPa)، ۸۱۰ kJ گرما می دهیم. کار انجام شده توسط قطعه آلومینیمی چند ژول است؟ (چگالی، ضریب انبساط طولی و گرمای ویژه آلومینیم را به ترتیب، $\frac{2}{7} \frac{g}{cm^3}$ ، $\frac{1}{23 \times 10^{-6}} \frac{1}{^\circ C}$ و $900 \frac{J}{kg \cdot ^\circ C}$ در نظر بگیرید.)

(۱) ۲/۳ (۲) ۲۳۰۰ (۳) -۲۳۰۰ (۴) -۲/۳

(متوسط - محاسباتی - استاندارد) - صفحه ۱۳۳ - ۱۰۰۵

پاسخ: گزینه ۱

گام اول

تغییر دمای قطعه آلومینیمی برابر است با:

$$Q = mc\Delta\theta \Rightarrow \Delta\theta = \frac{Q}{mc} \quad (I)$$

گام دوم

تغییر حجم قطعه آلومینیمی برابر است با:

$$\Delta V = V_1(\alpha \Delta\theta) \xrightarrow{(I)} \Delta V = V_1 \times \alpha \times \frac{Q}{mc}$$

$$\xrightarrow{m=\rho V_1} \Delta V = \cancel{V_1} \times \alpha \times \frac{Q}{\rho \cancel{V_1} \times c} \Rightarrow \Delta V = \frac{\alpha Q}{\rho c} \quad (II)$$

گام آخر

قطعه آلومینیمی را به عنوان یک دستگاه ترمودینامیکی در نظر می گیریم. از آنجا که فرایند در فشار ثابت P انجام می شود، کار محیط بر روی دستگاه برابر است با:

$$W = -P \cdot \Delta V \xrightarrow{(II)} W = -P \times \frac{\alpha Q}{\rho c}$$

$$\Rightarrow W = \frac{-100 \times 10^3 \times \cancel{1} \times 23 \times 10^{-6} \times 810 \times \cancel{1}}{2700 \times 900} = -2/3 J$$

بنابراین کار دستگاه (قطعه آلومینیمی) بر روی محیط (W') برابر است با:

$$W' = -W = +2/3 J$$



کاری که سامانه بر روی محیط انجام می دهد قرینه کاری است که محیط روی سامانه انجام می دهد:

$$W' = -W$$

سوتی های پرتکرار

حواست باشه، کاری که قطعه آلومینیم روی محیط انجام می ده رو خواسته. اگر کار محیط روی سامانه رو در نظر بگیریم، توی دام گزینه (۴) می افتی!





برای دیدن پاسخنامه ویدئویی آزمون
QRcode بالا را اسکن کنید
یا بر روی لینک زیر کلیک کنید
پاسخنامه ویدئویی آزمون

جامع شبیه ساز کنکور سراسری

بودجه بندی
این آزمون

مباحث این آزمون در مجموع ۳۰ تست کنکور را پوشش داده است.

سهم در
کنکور

۷۶- در آرایش الکترونی کاتیون پایدار حاصل از عناصر موجود در کدام گزینه، تعداد الکترون موجود در زیرلایه‌ها با $l = 0$ در یک عنصر با تعداد الکترون‌ها در زیرلایه با $l = 2$ در عنصر دیگر می‌تواند برابر باشد؟

(۱) منیزیم و وانادیم (۲) سدیم و روی (۳) پتاسیم و آهن (۴) کلسیم و مس

(متوسط - مفهومی - استاندارد) - صفحه ۳۹ - ۱۰۰۱

پاسخ: گزینه ۳

برای نشان دادن موقعیت یک زیرلایه از اعداد کوانتومی اصلی (n) و فرعی (l) استفاده می‌کنیم. برای مثال نخستین زیرلایه‌ای که الکترون وارد آن می‌شود، $1s$ با عدد کوانتومی اصلی ۱ و عدد کوانتومی فرعی صفر است. توجه داریم که زیرلایه‌های d با عدد کوانتومی فرعی ۲، از عنصر اسکاندیم با عدد اتمی ۲۱ شروع به پر شدن می‌کنند؛ بنابراین در عناصر منیزیم، سدیم، پتاسیم و کلسیم، الکترونی در این زیرلایه‌ها حضور ندارد. آرایش الکترونی کاتیون حاصل از فلزهای مطرح شده در سؤال به صورت زیر است:



همان‌طور که مشخص است، شمار الکترون‌های موجود در زیرلایه‌هایی با $l = 0$ در آرایش الکترونی یون پتاسیم همانند شمار الکترون‌ها در زیرلایه $3d$ یون آهن (II) برابر ۶ است.



پرشدن زیرلایه‌ها تنها به عدد کوانتومی اصلی وابسته نیست؛ بلکه از یک قاعده کلی به نام **قاعده آفبا** پیروی می‌کند. قاعده آفبا ترتیب پرشدن زیرلایه‌ها را در اتم‌های گوناگون نشان می‌دهد. مطابق این قاعده، هنگام افزودن الکترون به زیرلایه‌ها، نخست زیرلایه‌های نزدیک‌تر به هسته پر می‌شوند که دارای انرژی **کمتر** هستند و سپس زیرلایه‌های **بالا تر** پر خواهند شد. براساس قاعده آفبا، هر چه انرژی یک زیرلایه کمتر باشد، آن زیرلایه زودتر از الکترون پر می‌شود. هر چه یک زیرلایه $n + l$ پایین‌تری داشته باشد، انرژی آن زیرلایه نیز **کمتر** است. برای مثال زیرلایه $4s$ زودتر از زیرلایه $3d$ شروع به گرفتن الکترون می‌کند. هنگامی که مقدار $n + l$ برای دو زیرلایه برابر باشد، زیرلایه با عدد کوانتومی اصلی **کوچک‌تر**، انرژی **کمتری** داشته و **زودتر** از الکترون پر می‌شود. برای مثال، زیرلایه $3p$ نسبت به زیرلایه $4s$ زودتر الکترون می‌گیرد.



۷۷- کدام یک از گزینه‌های زیر **نادرست** است؟

- (۱) الکترون‌های اشتراکی موجود در ساختار مولکول‌ها، در فضایی بین هسته دو اتم قرار می‌گیرند.
- (۲) آرایش الکترونی هر عنصر موجود در جدول دوره‌ای، موقعیت مکانی آن عنصر را تعیین می‌کند.
- (۳) اتم‌های نافلزی با مبادله الکترون و رسیدن به آرایش گاز نجیب، در ساختار مولکول‌ها شرکت می‌کنند.
- (۴) در دوره سوم، برخلاف دوره چهارم، تمام عناصر با لایه ظرفیت هشت‌تایی، میل به انجام واکنش شیمیایی ندارند.

یکی از راه‌های رسیدن به آرایش الکترونی گازهای نجیب برای عناصر نافلزی، به اشتراک گذاشتن الکترون‌ها و حضور در ساختار مولکول است. توجه داریم که اتم‌های نافلزی برای شرکت در ساختار مولکول، برخی یا همه الکترون‌های ظرفیتی خود را به اشتراک می‌گذارند. در این فرایند، نمی‌توان از اصطلاح (مبادله الکترون) استفاده کرد.

بررسی سایر گزینه‌ها:

۱) نافلزها با به اشتراک گذاشتن برخی یا همه الکترون‌های ظرفیتی خود به آرایش گاز نجیب هم‌دوره خود می‌رسند. توجه داریم که این الکترون‌ها در فضایی بین هسته دو اتم قرار می‌گیرند. البته الکترون‌های اشتراکی بیشتر زمان خود را نزدیک‌تر به هسته عنصری که خاصیت نافلزی بیشتری دارد، سپری می‌کنند. برای مثال در ساختار مولکول کربن‌دی‌اکسید، الکترون‌های اشتراکی به هسته اتم‌های اکسیژن نزدیک‌تر هستند.

۲) رفتار و ویژگی‌های هر اتم را می‌توان از روی آرایش الکترونی آن توضیح داد؛ بنابراین یافتن آرایش درست الکترون‌ها در هر اتم، از اهمیت بسیاری برخوردار است. مطابق مدل کوانتومی، برای به‌دست آوردن آرایش الکترونی اتم‌ها باید الکترون‌های اتم هر عنصر در زیرلایه‌ها با نظم و ترتیب معینی توزیع شود. از آرایش الکترونی یک عنصر می‌توان برای تعیین موقعیت آن عنصر نیز استفاده کرد. برای مثال، همه عناصری که ۱۰ الکترون ظرفیتی دارند، مشابه نیکل بوده و در گروه شماره ۱۰ جدول تناوبی قرار می‌گیرند.

۴) در دوره سوم، آرایش الکترونی گاز نجیب آرگون هشت‌تایی است. در دوره چهارم نیز، در لایه ظرفیت عناصر آهن و کریپتون، تعداد ۸ الکترون حضور دارند. کریپتون نیز همانند آرگون از گازهای نجیب بوده و تمایلی به شرکت در واکنش‌های شیمیایی ندارد. از طرفی فلز آهن در واکنش‌های بسیاری از جمله خوردگی شرکت می‌کند.

الکترون‌های ظرفیتی

الکترون‌های ظرفیتی، الکترون‌هایی هستند که در سطحی‌ترین قسمت یک اتم قرار داشته و در واکنش‌های شیمیایی شرکت می‌کنند. این الکترون‌ها، در تعیین خواص شیمیایی یک عنصر نقش داشته و موجب تشکیل پیوندهای کووالانسی یا ایجاد یون تک‌اتمی می‌شوند. با توجه به اینکه یک عنصر در کدام دسته قرار می‌گیرد، می‌توان الکترون‌های ظرفیتی آن را پیدا کرد. در این رابطه داریم:

- در عناصر دسته s، الکترون‌های ظرفیتی معادل با الکترون‌های آخرین زیرلایه ns است.
- در عناصر دسته p، الکترون‌های ظرفیتی معادل با الکترون‌های آخرین زیرلایه‌های ns و np است.
- در عناصر دسته d، الکترون‌های ظرفیتی معادل با الکترون‌های آخرین زیرلایه‌های ns و (n-1)d است.




۷۸- کدام موارد از عبارتهای زیر درست است؟


- الف - در بین امواج مرئی، انرژی پرتو زرد بیشتر از انرژی پرتو سبز رنگ است.
- ب - چشم انسان، به یقین نمی‌تواند پرتویی که طول موج آن از پرتو بنفش رنگ بزرگ‌تر باشد را ببیند.
- ج - با توجه به نور نشر شده، دمای شعله سوختن کامل و ناقص متان می‌تواند به ترتیب برابر 2550°C و 2000°C باشد.
- د - بین امواج الکترومغناطیسی، فاصله یک قله تا قله بعدی، در امواج رادیویی بیشتر از پرتوهای فروسرخ است.
- ۱) «الف» و «ب» ۲) «الف» و «ج» ۳) «ب» و «د» ۴) «ج» و «د»

عبارتهای (ج) و (د) درست هستند.

الف) نور خورشید، اگرچه سفید به نظر می‌رسد اما با عبور از قطره‌های آب موجود در هوا که پس از بارش هنوز در هوا پراکنده است، تجزیه می‌شود و گستره‌ای پیوسته از رنگ‌ها را ایجاد می‌کند. این گستره رنگی، شامل بی‌نهایت طول موج از رنگ‌های گوناگون است. مقایسه سطح انرژی پرتوهای مرئی موجود در نور خورشید به صورت زیر است:




مقایسه طول موج پرتوهای مرئی موجود در نور خورشید به صورت زیر است:



ب) چشم انسان می‌تواند پرتوهای مرئی که شامل رنگ‌های قرمز تا بنفش می‌شود را ببیند. در بین پرتوهای مرئی، پرتو بنفش بیشترین انرژی و کوتاه‌ترین طول موج را دارد؛ بنابراین می‌توان گفت ممکن است چشم انسان بتواند پرتویی با طول موج بلندتر از پرتو بنفش را نیز ببیند.

ج) نور نشر شده در واکنش سوختن ناقص و کامل سوختن‌های فسیلی از جمله متان، به ترتیب به رنگ‌های زرد و آبی است. همان‌طور که می‌دانیم، انرژی پرتو آبی رنگ بیشتر از انرژی پرتو زرد رنگ است؛ بنابراین می‌توان گفت سوختن کامل متان در مقایسه با سوختن ناقص آن، انرژی بیشتری آزاد کرده و دمای شعله آن نیز بالاتر است.

د) یکی از ویژگی‌های امواج الکترومغناطیسی، طول موج است. طول موج به صورت فاصله دو قله یا دو دره متوالی تعریف می‌شود. با افزایش طول موج یک پرتو، انرژی حمل‌شده توسط آن پرتو کاهش پیدا می‌کند. همان‌طور که می‌دانیم، امواج رادیویی در مقایسه با امواج فروسرخ، انرژی کمتر و طول موج بلندتری دارند. مقایسه انرژی و طول موج امواج مختلف به صورت زیر است:



نور و امواج الکترومغناطیس

نور یکی از بنیادی‌ترین اجزای موجود در جهان هستی است که با کمک آن می‌توان به یافته‌های جدید دست پیدا کرد. نور خورشید اگرچه سفید به نظر می‌رسد، اما با عبور دادن آن از منشور یا قطره آب، گستره‌ای پیوسته از رنگ‌ها ایجاد می‌شود که شامل بی‌نهایت طول موج از رنگ‌های گوناگون است. چشم ما تنها می‌تواند گستره محدودی از نور را ببیند. به این گستره که رنگ‌های قرمز تا بنفش را شامل می‌شود، **گستره مرئی** می‌گویند. نور خورشید شامل گستره بسیار بزرگ‌تری از این پرتوهاست که با خود انرژی حمل می‌کنند. به این پرتوها، پرتوهای **الکترومغناطیسی** می‌گویند. پرتوهای الکترومغناطیسی دارای طول موج مشخص هستند که آن را با λ نشان داده و هر چه این طول موج کوتاه‌تر باشد، انرژی حمل‌شده توسط آن‌ها بیشتر خواهد بود.



۷۹- عنصر فرضی A دارای دو ایزوتوپ است. اگر تفاوت عدد جرمی این دو ایزوتوپ برابر با ۲ واحد بوده و درصد فراوانی ایزوتوپ سنگین تر، ۴۰٪ بیشتر از درصد فراوانی ایزوتوپ سبک تر باشد، تفاوت جرم اتمی میانگین این عنصر با جرم اتمی ایزوتوپ فراوان تر برابر چند amu است؟

(۴) ۱/۲

(۳) ۰/۸

(۲) ۱/۴

(۱) ۰/۶

پاسخ: گزینه ۱

(آسان - محاسباتی - سریع ۵ - صفحه ۱۵ - ۱۰۰۱)

به اتم‌هایی که در هسته خود تعداد پروتون برابر و شمار نوترون متفاوتی دارند، ایزوتوپ یا هم‌مکان گفته می‌شود. برای محاسبه جرم اتمی میانگین از فرمول زیر استفاده می‌کنیم:

$$\dots + (\text{جرم اتمی ایزوتوپ دوم} \times \text{درصد فراوانی ایزوتوپ دوم}) + (\text{جرم اتمی ایزوتوپ اول} \times \text{درصد فراوانی ایزوتوپ اول}) = \text{جرم اتمی میانگین}$$

برای به دست آوردن جرم اتمی میانگین، ابتدا باید درصد جرمی ایزوتوپ‌ها را محاسبه کنیم. توجه داریم که مجموع فراوانی ایزوتوپ‌های یک عنصر برابر ۱۰۰ است. طبق فرض سؤال نیز درصد فراوانی ایزوتوپ سنگین تر، ۴۰٪ بیشتر از درصد فراوانی ایزوتوپ سبک تر است. حال اگر درصد فراوانی ایزوتوپ سبک تر (^xA) و ایزوتوپ سنگین تر (^{x+2}A) را به ترتیب برابر a و b فرض کنیم، داریم:

$$\begin{cases} a + b = 100 \\ b - a = 40 \end{cases} \Rightarrow a = 30, b = 70$$

در مرحله بعد، جرم اتمی میانگین این عنصر را محاسبه می‌کنیم:

$$\overline{M} = \frac{(30 \times x) + (70 \times (x + 2))}{100} = x + 1/4$$

با توجه به محاسبات انجام شده، جرم اتمی ایزوتوپ فراوان تر و جرم اتمی میانگین این عنصر به ترتیب برابر با $x + 2$ و $x + 1/4$ است. بنابراین تفاوت مقدار خواسته شده برابر $6/10 amu$ خواهد بود.

ایزوتوپ‌ها

اتم‌های یک عنصر که عدد اتمی برابر و شمار نوترون‌های متفاوتی دارند را **ایزوتوپ** می‌گویند. در ایزوتوپ‌ها، عدد اتمی که نشان‌دهنده نوع عنصر است، یکسان بوده ولی عدد جرمی تفاوت دارد. چون خواص شیمیایی به عدد اتمی وابسته است، ایزوتوپ‌های یک عنصر در خواص شیمیایی یکسان هستند ولی در خواص فیزیکی که به جرم وابسته هستند، تفاوت دارند. مثلاً ایزوتوپ‌ها چگالی متفاوتی دارند. به ایزوتوپ‌های ناپایدار و پرتوزا، **رادیوایزوتوپ** می‌گویند. هسته این ایزوتوپ‌ها ناپایدار بوده و با گذشت زمان متلاشی می‌شود. طی این فرایند، ذره‌های پرنرژی همراه با مقدار زیادی انرژی تولید می‌شود. در این میان، اغلب هسته‌هایی که نسبت شمار نوترون‌ها به پروتون‌های آن‌ها برابر یا بیشتر از ۱/۵ باشد، **پرتوزا** هستند. از مفهوم نیم‌عمر برای مقایسه پایداری و پرتوزایی ایزوتوپ‌ها استفاده می‌شود. نیم‌عمر، مدت زمانی است که طول می‌کشد تا نصف یک ماده پرتوزا متلاشی شود. هرچه نیم‌عمر یک ماده **کوتاه‌تر** باشد، **پایداری** آن ماده **کم‌تر** و **پرتوزایی** آن **بیشتر** است.



۸۰- کدام یک از عبارتهای زیر درست است؟

الف - درصد جرمی هلیوم در یک نمونه هواکره، بیشتر از درصد جرمی آن در هوای مایع است.

ب - گازی که در هواکره بیشترین درصد حجمی را دارد، راحت‌تر از گاز آرگون مایع می‌شود.

ج - ناخالصی اندک موجود در گاز آرگون تهیه شده در پتروشیمی شیراز، با اغلب فلزها واکنش می‌دهد.

د - از گازی که حدود ۲۰ درصد حجم هواکره را تشکیل می‌دهد، به عنوان محیط بی اثر در جوشکاری استفاده می‌شود.

(۴) «ب» و «د»

(۳) «الف» و «د»

(۲) «ب» و «ج»

(۱) «الف» و «ج»

پاسخ: گزینه ۱

(متوسط - خط به خط و مفهومی - سریع ۵ - صفحه ۵۵ - ۱۰۰۲)

عبارتهای (الف) و (ج) درست هستند.

هلیم نخستین گاز نجیب موجود در جدول تناوبی بوده و درصد حجمی آن در هواکره حدوداً ۰/۰۰۰۵ درصد است. از طرفی نقطه جوش این گاز نجیب برابر -269°C است. همان‌طور که می‌دانیم، برای تهیه هوای مایع، دما را تا -200°C کاهش می‌دهند. نقطه جوش گاز هلیم کمتر از -200°C بوده و بنابراین در این دما، هلیم به حالت گاز باقی مانده و وارد مخلوط هوای مایع نمی‌شود. در نتیجه درصد جرمی آن در هوای مایع برابر صفر است. جدول زیر ویژگی‌های هلیم را جمع‌بندی می‌کند:



نیتروژن بیشترین درصد حجمی را در بین گازهای هواکره دارد. نقطه جوش این گاز پایین‌تر از آرگون بوده و بنابراین نسبت به آن سخت‌تر مایع می‌شود. جدول زیر نقطه جوش برخی از گازهای موجود در هواکره را نمایش می‌دهد:

گاز	نقطه جوش ($^{\circ}\text{C}$)
نیتروژن	-۱۹۶
اکسیژن	-۱۸۳
آرگون	-۱۸۶
هلیم	-۲۶۹

به‌دلیل نزدیک بودن نقطه جوش گازهای اکسیژن و آرگون، تهیه این گازها به‌صورت خالص دشوار است؛ بنابراین می‌توان گفت ناخالصی موجود در آرگون تهیه شده در پتروشیمی، گاز اکسیژن است. همان‌طور که می‌دانیم، گاز اکسیژن از جمله نافلزهای واکنش‌پذیر جدول تناوبی بوده و با اغلب فلزها واکنش می‌دهد.

گاز اکسیژن حدود ۲۰ درصد حجمی هواکره را شامل می‌شود. این گاز از جمله گازهای واکنش‌پذیر بوده و برخلاف گازهای نجیبی مانند هلیم و آرگون، نمی‌توان از آن به‌عنوان محیط بی‌اثر در جوشکاری استفاده کرد.

تقطیر جزء به جزء هوای مایع

هوا منبعی غنی از گازهای نیتروژن، اکسیژن و آرگون است که هرکدام کاربرد زیادی در صنعت دارند. این گازها را از تقطیر جزء به جزء هوای مایع به‌دست می‌آورند. این فرایند طبق مراحل زیر انجام می‌شود:

- نخست هوا از صافی‌هایی عبور داده می‌شود تا گرد و غبار آن گرفته شود. طی این فرایند، یک نمونه از هوای پاک به‌دست می‌آید.
 - با استفاده از تغییر فشار، دمای هوا را پیوسته کاهش می‌دهند. در این مرحله، رطوبت هوا در دمای $^{\circ}\text{C}$ به‌صورت یخ جدا شده و در دمای -78°C کربن دی‌اکسید به‌صورت یخ خشک جدا می‌شود.
 - با کاهش بیشتر دما تا -200°C ، در دمای -183°C ، گاز اکسیژن و در دمای -186°C ، گاز آرگون و در دمای -196°C نیز گاز نیتروژن به‌صورت مایع در می‌آید و در نهایت هوای مایع که شامل نیتروژن، اکسیژن و آرگون مایع است، پدید می‌آید.
 - در مرحله آخر، هوای مایع را از ستون تقطیر عبور می‌دهند و دما افزایش می‌یابد. ترتیب جدا شدن گازها در ستون تقطیر به نقطه جوش آن‌ها بستگی دارد. هر چه دمای جوش یک گاز پایین‌تر باشد، زودتر تبخیر شده و جدا می‌شود. با توجه به نقطه جوش این گازها، نخست نیتروژن، سپس آرگون و در نهایت اکسیژن از ستون تقطیر خارج خواهد شد.
- توجه داریم که در فرایند تقطیر جزء به جزء هوای مایع، تهیه گاز اکسیژن با خلوص ۱۰۰ درصد دشوار است؛ زیرا نقطه جوش دو گاز اکسیژن و آرگون به یکدیگر نزدیک است و هنگام خارج شدن گاز اکسیژن از ستون تقطیر، مقداری گاز آرگون نیز جدا می‌شود. این در حالی است که گاز آرگون با خلوص بسیار زیاد در پتروشیمی شیراز تولید می‌شود.

۸۱- کدام یک از عبارتهای زیر درست است؟

- ۱) گاز اوزون در مقایسه با گاز اکسیژن نقطه جوش بالاتری داشته و آسان تر مایع می‌شود.
- ۲) اکسید ناپایدارتر عنصر کربن، در مقایسه با هوا چگالی بالاتری داشته و به راحتی در آن پخش می‌شود.
- ۳) آلوتروپ سبک‌تر عنصر اکسیژن، واکنش‌پذیری بالایی داشته و از آن برای گندزدایی میوه‌ها استفاده می‌شود.
- ۴) کربن مونوکسید ناپایدار بوده و رنگ زرد حاصل از سوختن ناقص سوخت‌های فسیلی، به دلیل وجود این گاز است.

پاسخ: گزینه ۱

(آسان - خط به خط و مفهومی - سریع ۵ - صفحه ۷۴ - ۱۰۰۲)

گاز اوزون و گاز اکسیژن، از جمله آلوتروپ‌های اکسیژن محسوب می‌شوند. اوزون در مقایسه با گاز اکسیژن جرم مولی بالاتری داشته و یک نمونه از آن برخلاف گاز اکسیژن قطبی است. بر این اساس، نقطه جوش اوزون بالاتر از گاز اکسیژن است. با افزایش نقطه جوش مواد گازی، میعان آن‌ها راحت‌تر انجام می‌شود.

جدول زیر مقایسه ویژگی‌های این دو آلوتروپ اکسیژن را نمایش می‌دهد:

فرمول شیمیایی	ساختار لوویس	جرم مولی	نقطه جوش	رنگ در حالت گازی	رنگ در حالت مایع	مدل فضاپرکن
O_2	$\text{:}\ddot{O}=\ddot{O}\text{:}$	۳۲	-۱۸۳	بی‌رنگ	آبی روشن	
O_3	$\text{:}\ddot{O}=\ddot{O}-\ddot{O}\text{:}$	۴۸	-۱۱۲	آبی روشن	آبی تیره	

بررسی سایر گزینه‌ها:

۲) اکسید ناپایدارتر کربن معادل با گاز کربن مونوکسید است. گاز کربن مونوکسید، از مولکول‌های دواتمی ساخته شده و در مقایسه با هوا، چگالی پایین‌تری دارد و به راحتی در آن پخش می‌شود.

۳) اوزون آلوتروپ سنگین‌تر اکسیژن است. از اوزون به‌خاطر واکنش‌پذیری بالای آن، برای گندزدایی میوه‌ها و سبزیجات استفاده می‌شود. این گاز، می‌تواند باکتری‌ها را از بین ببرد.

۴) گاز کربن مونوکسید گازی بی‌بو، بی‌رنگ و بسیار سمی است، بنابراین رنگ زرد شعله نمی‌تواند به دلیل وجود این گاز در میان فراورده‌های سوختن باشد. ساختار لوویس این مولکول به‌صورت زیر است:



کربن مونوکسید

اگر در هنگام سوختن سوخت‌های فسیلی، مقدار اکسیژن کم باشد، گاز کربن مونوکسید به همراه دیگر فراورده‌ها تولید می‌شود. به این حالت از سوختن، سوختن ناقص می‌گویند. گاز کربن مونوکسید گازی بی‌بو، بی‌رنگ و بسیار سمی است. چگالی این گاز کمتر از هوا است و در نتیجه به راحتی می‌تواند به بالای اتاق صعود کند. قابلیت انتشار این گاز در محیط نیز بالا است و به سرعت در همه فضای اتاق پخش می‌شود. همچنین میل ترکیبی آن با هموگلوبین خون بسیار بالا و بیش از ۲۰۰ برابر اکسیژن است. مولکول‌های کربن مونوکسید پس از اتصال به هموگلوبین، از رسیدن اکسیژن به بافت‌های بدن جلوگیری می‌کنند. این ویژگی باعث گازگرفتگی شده و سیستم عصبی فرد را فلج می‌کند و باعث مرگ می‌شود. رنگ زرد شعله‌ها، نشان‌دهنده سوختن ناقص سوخت و تولید کربن مونوکسید است.



۸۲- مقدار ۶۰۰ میلی لیتر محلول ۰/۵ مولار سدیم هیدروکسید را با ۳ لیتر محلول ۲ مولار آن مخلوط می کنیم. در ۲ لیتر از محلول حاصل، چند گرم یون سدیم حضور دارد؟ ($Na = 23, O = 16, H = 1 : g.mol^{-1}$)

(۱) ۱۶۱ (۲) ۸۰/۵ (۳) ۹۱ (۴) ۴۵/۵

(آسان - محاسباتی - سریع) - صفحه ۱۰۰ - ۱۰۰۳

پاسخ: گزینه ۲

برای حل سؤال ابتدا مول سدیم هیدروکسید حل شده در هر یک از محلول های اولیه را محاسبه می کنیم:

$$\text{مول} = \frac{\text{غلظت} \times \text{حجم}}{\text{حجم}} \Rightarrow \text{مول} = \frac{0.5 \times 3}{3} = 0.5 \text{ mol}$$

$$\text{مول} = \frac{\text{غلظت} \times \text{حجم}}{\text{حجم}} \Rightarrow \text{مول} = \frac{2 \times 3}{3} = 6 \text{ mol}$$

در مرحله بعد، غلظت محلول حاصل از مخلوط شدن دو محلول اولیه را به دست می آوریم:

$$\text{غلظت} = \frac{\text{مول } NaOH}{\text{حجم}} = \frac{6 + 0.5}{3 + 3} = 1.125 \text{ mol.L}^{-1}$$

سپس مول سدیم هیدروکسید حل شده در ۲ لیتر از این محلول را محاسبه می کنیم:

$$\text{مول} = \text{غلظت} \times \text{حجم} = 1.125 \times 2 = 2.25 \text{ mol}$$

هر واحد از سدیم هیدروکسید با فرمول شیمیایی $NaOH$ ، در ساختار خود یک یون سدیم دارد؛ بنابراین ۳/۵ مول از آن، ۳/۵ مول یون سدیم در ساختار خود دارد. در پایان جرم یون سدیم موجود در این محلول را به دست می آوریم:

$$\text{جرم} = \frac{\text{جرم مولی}}{\text{جرم مولی}} \Rightarrow \text{جرم} = \text{مول} \times \text{جرم مولی} = 2.25 \times 23 = 51.75 \text{ g}$$

غلظت مولار

تجربه نشان می دهد که اندازه گیری حجم یک مایع به ویژه در آزمایشگاه آسان تر از جرم آن است. از سوی دیگر شیمی دان ها مقدار ماده را برحسب مول بیان می کنند. بر این اساس، به نظر می رسد که بیان غلظتی از محلول پرکاربردتر خواهد بود که با مول های ماده حل شونده و حجم محلول ارتباط داشته باشد. چنین غلظتی را غلظت مولی (مولار) می نامند. غلظت مولی (M) یک محلول، با استفاده از رابطه زیر محاسبه می شود:

$$\text{غلظت مولی} = \frac{\text{مول حل شونده}}{\text{لیتر محلول}}$$

برای محاسبه مقدار حل شونده موجود در یک محلول، می توان از کسر تبدیل زیر استفاده کرد:

$$\text{مول حل شونده} \xrightarrow{\times M} \text{حجم محلول} \xleftarrow{\div M}$$

نوعی دیگری از غلظت وجود دارد که گرم حل شونده در هر لیتر از محلول را نشان می دهد. داریم:

$$\text{غلظت گرم بر لیتر} = \frac{\text{جرم حل شونده}}{\text{لیتر محلول}}$$

۸۳- کدام یک از عبارات های زیر درست است؟


- (۱) فراوان ترین یون موجود در دریاها، با یون نقره واکنش داده و رسوب سفیدرنگ تولید می کند.
- (۲) آب های زیرزمینی و آب موجود در دریاچه ها، در مجموع بیشتر از ۱ درصد آب کره را شامل می شوند.
- (۳) فراوان ترین یون چنداتی می موجود در آب دریاها در واکنش با یون سدیم، ترکیب NaX را تشکیل می دهد.
- (۴) کاتیون موجود در نمک خوراکی، برخلاف آنیون آن، از یون های مشترک موجود در آب دریا و آب آشامیدنی است.

فراوان ترین یون موجود در دریا، یون کلرید است. از واکنش یون کلرید و یون نقره، رسوب سفیدرنگ نقره کلرید تشکیل می شود؛ بنابراین می توان گفت از یون کلرید می توان برای شناسایی یون نقره موجود در محلول ها استفاده کرد. معادله واکنش انجام شده به صورت زیر است:

$$Ag^+(aq) + Cl^-(aq) \rightarrow AgCl(s)$$

بررسی سایر گزینه ها:

۲) اجزای تشکیل دهنده آب کره به صورت زیر است:



همان طور که مشخص است، کوه های یخ و آب موجود در اقیانوس ها مجموعاً ۹۹/۳۵ درصد آب کره را تشکیل می دهند؛ بنابراین سایر قسمت های آب کره از جمله آب های موجود در دریاچه ها و آب های زیرزمینی کمتر از ۱ درصد آب کره را تشکیل می دهند.


۳) فراوان ترین یون چند اتمی موجود در آب دریا، یون سولفات با فرمول شیمیایی SO_4^{2-} است. از ترکیب این یون و یون سدیم، ترکیب یونی سدیم سولفات با فرمول شیمیایی Na_2SO_4 حاصل می شود.

۴) ترکیب یونی تشکیل دهنده نمک خوراکی، سدیم کلرید است. کاتیون و آنیون این ترکیب یونی به ترتیب یون های سدیم و کلرید هستند. توجه داریم که هر دو یون موجود در سدیم کلرید، در آب آشامیدنی و آب دریاها حضور دارند.

یون های موجود در آب دریا


آب اقیانوس ها و دریاها مخلوطی همگن است که اغلب مزه های شور دارد، زیرا مقدار قابل توجهی از نمک های گوناگون در آن حل شده است. برآوردها نشان می دهند که $10^6 \times 5$ تن نمک در آب اقیانوس ها و دریاها وجود دارد. در رابطه با یون های موجود در آب دریا داریم:

- کاتیون عنصرهای گروه اول و دوم جدول دوره های در آب دریا وجود دارند.
- در آب دریا، یون های تک اتمی و چند اتمی متنوعی پیدا می شود.
- مقدار یون کلرید از بقیه آنیون های موجود در آب دریا بیشتر است. در این رابطه داریم:



مقدار آنیون ها:

- مقدار یون سدیم از بقیه کاتیون های موجود در آب دریا بیشتر است. در این رابطه داریم:



مقدار کاتیون ها:

۸۴ - ۶۴۰ گرم محلول سیر شده نمک A در دمای $40^\circ C$ در اختیار داریم. اگر با نصف کردن دما و عبور مخلوط حاصل از صافی، $40^\circ C$ گرم رسوب بر روی صافی باقی بماند، انحلال پذیری نمک A در دمای $60^\circ C$ برابر با چند گرم در $100^\circ C$ گرم آب است؟ (انحلال پذیری نمک بر حسب دما، خطی بوده و درصد جرمی محلول سیر شده در دمای $40^\circ C$ برابر ۳۷/۵٪ است.)

۴۰ (۴)

۷۰ (۳)

۶۵ (۲)

۴۵ (۱)

انحلال پذیری یک نمک، معادل حداکثر جرمی از آن است که می تواند بدون تشکیل رسوب در ۱۰۰ گرم آب حل شود. برای تبدیل انحلال پذیری یک نمک (S) و درصد جرمی محلول سیر شده آن (W/W)، از رابطه زیر استفاده می کنیم:

$$\text{درصد جرمی محلول سیر شده} = \frac{S}{S + 100} \times 100$$

در قدم اول، انحلال پذیری نمک مورد نظر را در دمای 40°C محاسبه می کنیم:

$$37/5 = \frac{S}{S + 100} \times 100 \Rightarrow S = 60$$

با توجه به محاسبات انجام شده، انحلال پذیری این نمک در دمای 40°C برابر ۶۰ گرم در ۱۰۰ گرم آب است؛ بنابراین می توان گفت در ۱۶۰ گرم از محلول سیر شده، ۶۰ گرم نمک و ۱۰۰ گرم آب حضور دارد. در نتیجه ۶۴۰ گرم از محلول اولیه حاوی ۲۴۰ گرم نمک و ۴۰۰ گرم آب بوده است. برای محاسبه جرم نمک حل شده در محلول اولیه، می توانیم از درصد جرمی نیز استفاده کنیم:

$$240 \text{ g} = \text{جرم نمک} \Rightarrow 240 = \frac{\text{جرم نمک}}{640} \times 100 \Rightarrow 37/5 = \frac{\text{جرم نمک}}{640} \times 100 \Rightarrow \text{درصد جرمی} = \frac{\text{جرم نمک}}{\text{جرم محلول}}$$

پس از کاهش دما، ۴۰ گرم از نمک رسوب پیدا کرده و در محلول پایانی ۲۰۰ گرم نمک و ۴۰۰ گرم آب حضور دارد. حال انحلال پذیری نمک در این دما (20°C) را محاسبه می کنیم:

$$\text{انحلال پذیری} = \frac{\text{جرم نمک حل شده}}{\text{جرم حلال (آب)}} \times 100 = \frac{200}{400} \times 100 = 50 \text{ g}/100 \text{ g H}_2\text{O}$$

معادله انحلال پذیری نمک هایی که تغییرات انحلال پذیری آن ها بر حسب دما خطی است، به صورت $S = a\theta + b$ نمایش داده می شود. حال با جایگذاری مقادیر به دست آمده، معادله انحلال پذیری این نمک را مشخص می کنیم:

$$S = a\theta + b \Rightarrow \begin{cases} 40^{\circ}\text{C} : 40a + b = 60 \\ 20^{\circ}\text{C} : 20a + b = 50 \end{cases} \Rightarrow a = 0/5, b = 40$$

در این حالت، معادله انحلال پذیری به صورت $S = 0/5\theta + 40$ به دست می آید. در پایان با جایگذاری در معادله به دست آمده، انحلال پذیری نمک در دمای 60°C را به دست می آوریم:

$$S = 0/5\theta + 40 = 70 \text{ g}/100 \text{ g H}_2\text{O}$$

انواع محلول ها

محلول ها بر اساس مقدار حل شونده موجود در آن ها، در سه دسته قرار می گیرند:

- (۱) **محلول سیر شده:** در این حالت، بیشترین میزان حل شونده ای که در حلال حل می شود، در محلول وجود دارد و مقدار حل شونده برابر مقدار انحلال پذیری آن ماده است. در این حالت مقدار حل شونده دقیقاً بر روی نمودار انحلال پذیری - دما قرار دارد.
- (۲) **محلول سیر نشده:** در این حالت، مقدار حل شونده موجود در محلول از مقدار انحلال پذیری کمتر بوده و این محلول همچنان می تواند مقدار بیشتری حل شونده را در خود حل نماید. این محلول در نمودار انحلال پذیری - دما، زیر خط نمودار قرار می گیرد.
- (۳) **محلول فراسیر شده:** در این حالت مقدار حل شونده موجود در محلول، از مقدار انحلال پذیری بیشتر بوده و در این حالت محلول ناپایدار است و با کوچک ترین تنش مانند ضربه، مقدار اضافی حل شونده خود را رسوب می دهد و به محلول سیر شده تبدیل می شود. محلول در این حالت، بالای خط مربوط به نمودار انحلال پذیری - دما قرار می گیرد.




۸۵- اگر تفاوت عدد اتمی عناصر A و B از دوره سوم برابر ۳ بوده و بین این دو عنصر، یک عنصر فلزی و یک عنصر شبه فلزی حضور داشته باشد، کدام یک از عبارت های زیر درست است؟ (عدد اتمی عنصر B بزرگ تر از عدد اتمی عنصر A است.)

- (۱) بیشترین تفاوت شعاع دو عنصر متوالی در این دوره، بین A و عنصر پس از آن است.
- (۲) عنصر B در بین نافلزهای دوره سوم، بیشترین شعاع اتمی و کمترین واکنش پذیری را دارد.
- (۳) فرمول شیمیایی ترکیب حاصل از یون پایدار عنصر A و یون سیلیکات به صورت A_2SiO_4 است.
- (۴) یکی از عناصر قرار گرفته بین A و B ، می تواند در واکنش های شیمیایی الکترون گرفته یا به اشتراک بگذارد.

برای حل این سؤال، ابتدا باید عناصر A و B را پیدا کنیم. تنها عنصر شبه فلزی دوره سوم جدول تناوبی، سیلیسیم است. از طرفی طبق گفته سؤال، یک عنصر شبه فلزی و یک عنصر فلزی بین عناصر A و B قرار گرفته‌اند. عنصر قبل از سیلیسیم، آلومینیم بوده که نوعی فلز است. از طرفی عنصر بعد از سیلیسیم، فسفر بوده که نوعی نافلز است. تا به اینجا کار متوجه شدیم که عناصر آلومینیم و سیلیسیم بین دو عنصر A و B قرار گرفته‌اند. از طرفی طبق صورت سؤال، عدد اتمی B از A بزرگ‌تر است؛ بنابراین می‌توان گفت عنصر A معادل با عنصر قبل از آلومینیم، یعنی منیزیم بوده و عنصر B نیز معادل عنصر بعد از سیلیسیم یعنی فسفر است. منیزیم در ترکیب‌های شیمیایی خود به صورت یون Mg^{2+} حضور دارد. فرمول شیمیایی یون سیلیکات نیز به صورت SiO_4^{4-} است. بنابراین فرمول شیمیایی ترکیب یونی منیزیم سیلیکات به صورت Mg_2SiO_4 نمایش داده می‌شود.

بررسی سایر گزینه‌ها:

۱) به‌طور کلی با طی کردن یک دوره از چپ به راست، شعاع اتمی کاهش پیدا می‌کند. شیب کاهش شعاع اتمی در بین فلزها بیشتر از نافلزها بوده و بیشترین تفاوت شعاع اتمی دو عنصر متوالی مربوط به عناصر موجود در گروه‌های ۱۳ و ۱۴ جدول تناوبی است؛ بنابراین بیشترین تفاوت شعاع اتمی عناصر در دوره سوم مربوط به عناصر آلومینیم و سیلیسیم است. نمودار زیر شعاع اتمی عناصر موجود در دوره سوم را نمایش می‌دهد:



۲) با طی کردن یک دوره از چپ به راست، شعاع اتمی کاهش پیدا می‌کند؛ بنابراین فسفر در بین نافلزهای دوره سوم، بیشترین شعاع اتمی را دارد. از طرفی کمترین واکنش‌پذیری در بین عناصر یک دوره، مربوط به گاز نجیب آن دوره است. آرگون با عدد اتمی ۱۸، گاز نجیب موجود در دوره سوم است. پس از آرگون، فسفر معادل با نافلزی از تناوب سوم است که کمترین واکنش‌پذیری را دارد.

۳) عناصر فلزی در واکنش‌های شیمیایی تنها می‌توانند الکترون از دست بدهند. شبه‌فلزها نیز تنها با به اشتراک گذاشتن الکترون در واکنش‌های شیمیایی شرکت می‌کنند. نافلزها نیز می‌توانند با گرفتن یا به اشتراک گذاشتن الکترون‌های ظرفیتی خود، در واکنش‌های شیمیایی شرکت کنند. توجه داریم که بین این دو عنصر، هیچ نافلزی حضور ندارد.

روند تغییر شعاع اتمی

در یک دوره با حرکت از چپ به راست، تعداد لایه‌های الکترونی ثابت بوده ولی تعداد پروتون‌های هسته افزایش پیدا می‌کند. با افزایش تعداد پروتون‌های موجود در هسته، جاذبه روی لایه‌های الکترونی افزایش پیدا کرده و شعاع اتمی کاهش پیدا می‌کند. در یک گروه نیز با حرکت از سمت بالا به پایین، تعداد لایه‌های الکترونی افزایش پیدا کرده و شعاع افزایش پیدا می‌کند. با افزایش شعاع اتمی و در نتیجه افزایش فاصله هسته از لایه آخر الکترونی، اتم راحت‌تر می‌تواند الکترون‌های ظرفیتی خود را از دست بدهد. پس می‌توان گفت در یک گروه از بالا به پایین خاصیت فلزی افزایش و خاصیت نافلزی کاهش پیدا می‌کند.



۸۶- مقدار ۱۰ گرم FeO ناخالص به مخلوطی از سدیم و مس به جرم ۱۵ گرم اضافه می‌کنیم. اگر با انجام کامل واکنش و مصرف کل FeO ، جرم جامدهای فلزی موجود در این مخلوط به ۱۶ گرم برسد، درصد خلوص نمونه اولیه FeO چند درصد بوده است؟ (ناخالصی، نوعی نافلز بوده و در واکنش شرکت نمی‌کند. $g.mol^{-1}$: $O = 16, Na = 23, Fe = 56, Cu = 64$)

(۱) ۶۸ (۲) ۳۶ (۳) ۷۲ (۴) ۵۴


(متوسط - محاسباتی - استاندارد ۱ - صفحه ۲۳ - ۱۱۰۱)

پاسخ: گزینه ۳

به‌طور طبیعی فلزی با واکنش‌پذیری بیشتر، می‌تواند با ترکیب فلزی با واکنش‌پذیری کمتر واکنش داده و آن فلز را از ترکیبش جدا کند. مقایسه واکنش‌پذیری فلزهای آهن، مس و سدیم به‌صورت زیر است:

مس > آهن > سدیم : واکنش‌پذیری

بنابراین می‌توان گفت فلز سدیم موجود در مخلوط برخلاف مس موجود در آن با نمونه FeO واکنش می‌دهد. معادله موازنه‌شده واکنش سدیم و FeO به‌صورت زیر است:



با هر بار انجام واکنش، ۲ مول سدیم (معادل ۴۶ گرم سدیم) از مخلوط فلزی جدا شده و ۱ مول فلز آهن (معادل ۵۶ گرم آهن) به این مخلوط افزوده می‌شود؛ بنابراین به‌ازای مصرف هر مول FeO و تولید یک مول آهن در این واکنش، جرم مخلوط عناصر فلزی به اندازه ۱۰ گرم افزایش پیدا می‌کند. در مرحله بعد مقدار FeO مصرف شده را محاسبه می‌کنیم. توجه داریم که با انجام این واکنش، جرم عناصر فلزی به اندازه ۱ گرم افزایش پیدا کرده است. بر این اساس داریم:


$$? g FeO = 1 g \text{ افزایش جرم عناصر فلزی } \times \frac{1 \text{ mol } FeO}{10 g \text{ افزایش جرم عناصر فلزی}} \times \frac{72 g FeO}{1 \text{ mol } FeO} = 7/2 g$$

در پایان درصد خلوص FeO را محاسبه می‌کنیم:

$$\text{درصد خلوص} = \frac{\text{جرم خالص}}{\text{جرم ناخالص}} \times 100 = \frac{7/2}{10} \times 100 = 72 \text{ درصد}$$

واکنش‌پذیری فلزها

به‌طور کلی، در هر واکنش شیمیایی که به‌صورت طبیعی و خودبه‌خودی انجام می‌شود، واکنش‌پذیری فراورده‌ها از واکنش‌پذیری واکنش‌دهنده‌ها کمتر است. بر اساس این قاعده، با استفاده از عناصر فلزی واکنش‌پذیرتر می‌توانیم سایر عناصر فلزی را از ترکیبات حاوی آن‌ها خارج کنیم. به‌عنوان مثال، چون واکنش‌پذیری فلز سدیم در مقایسه با واکنش‌پذیری فلز آهن بیشتر است، با استفاده از فلز سدیم می‌توانیم فلز آهن را بر اساس واکنش خودبه‌خودی زیر از آهن (III) اکسید خارج کنیم. معادله این واکنش به‌صورت زیر است:



۸۷- کدام یک از موارد زیر درست است؟ ($H = 1 g.mol^{-1}$)

- الف - میزان گرانروی آلکان‌های راست‌زنجیر، با قدرت نیروی بین مولکولی آن‌ها رابطه مستقیم دارد.
 - ب - هر مول از ترکیب با فرمول C_8H_{14} ، برای سیرشدن به‌یقین با ۴ گرم گاز هیدروژن واکنش می‌دهد.
 - ج - با استفاده از مقایسه ویژگی‌های فیزیکی پنتان و ۲-پنتن، می‌توان این دو ماده را از یکدیگر تشخیص داد.
 - د - با افزایش جرم مولی اجزای نفت خام در حین پالایش، ارتفاع خروج آن‌ها در برج تقطیر جزء به جزء کاهش می‌یابد.
- (۱) «الف» و «ج» (۲) «الف» و «د» (۳) «ب» و «ج» (۴) «ب» و «د»

(متوسط - مفهومی - استاندارد ۱ - صفحه ۴۵ - ۱۱۰۱)


پاسخ: گزینه ۲

عبارت‌های (الف) و (د) درست هستند.

بررسی موارد:

(الف) با افزایش شمار اتم‌های کربن در آلکان‌های راست‌زنجیر، جرم مولی آن‌ها افزایش پیدا می‌کند. با افزایش جرم مولی این ترکیب‌های مولکولی، نیروی بین مولکولی آن‌ها قوی‌تر شده و گرانروی و نقطه جوش آن‌ها افزایش پیدا می‌کند.

پ برای سیر شدن یک مولکول هیدروکربن، به ازای هر پیوند دوگانه و سه گانه به ترتیب ۱ و ۲ مولکول گاز هیدروژن مصرف می شود. اگر ترکیبی با فرمول شیمیایی C_8H_{14} دارای ۲ پیوند دوگانه و یا یک پیوند سه گانه باشد، هر مول از آن در واکنش با ۲ مول گاز هیدروژن که معادل ۴ گرم از آن است، به ترکیبی سیر شده با فرمول شیمیایی C_8H_{18} تبدیل می شود. معادله واکنش انجام شده به صورت زیر است:




توجه داریم که اگر هیدروکربن مورد نظر در ساختار خود دارای یک حلقه و یک پیوند دوگانه باشد، برای سیر شدن تنها به واکنش با ۱ مولکول گاز هیدروژن نیاز دارد. همچنین اگر این هیدروکربن در ساختار خود ۲ حلقه داشته باشد، سیر شده بوده و نمی تواند با گاز هیدروژن وارد واکنش شود.

ج پنتان و ۲-پنتن، هر دو مایع هستند و از نظر ظاهری نیز تفاوتی ندارد، بنابراین نمی توان با استفاده از ویژگی های فیزیکی این دو ماده، آن ها را از یکدیگر تشخیص داد. توجه داریم که ۲-پنتن برخلاف پنتان، نوعی هیدروکربن سیر نشده بوده و می تواند با گاز هیدروژن یا بخار برم واکنش دهد؛ بنابراین برای تشخیص این دو ماده از یکدیگر باید ویژگی های شیمیایی آن ها را مقایسه کنیم.

د با افزایش جرم مولی اجزای نفت خام پالایش شده، نقطه جوش آن ها افزایش پیدا کرده و ارتفاع خروج آن ها در حین تقطیر جزء به جزء کاهش پیدا می کند.

مقایسه اجزای تشکیل دهنده نفت خام



آلکان ها

هیدروکربن ها دسته ای از ترکیب های آلی هستند که در ساختار خود فقط هیدروژن و کربن دارند. این هیدروکربن ها به دو دسته **حلقوی** و **زنجیری** طبقه بندی می شوند. یک دسته از هیدروکربن های زنجیری، آلکان ها هستند. آلکان ها، هیدروکربن های سیر شده با فرمول عمومی C_nH_{2n+2} هستند. این هیدروکربن ها به دلیل سیر شده بودن، تمایلی به انجام واکنش شیمیایی ندارند اما در صورت تنفس بیش از حد بخارهای آن ها، درصد اکسیژن ورودی به ریه ها **کاهش** می یابد. از این رو، باعث **تنگی نفس** و حتی **مرگ** می شود. توجه داریم که آلکان ها ناقطبی بوده و در حلال هایی مانند آب حل نمی شوند؛ بنابراین می توان از آلکان های مایع به عنوان پوشش برای فلزات در معرض خوردگی استفاده کرد. آلکان ها در زندگی روزانه کاربردهای ویژه ای دارند. برای مثال، تینر همان هگزان (C_6H_{14}) است که نوعی آلکان بوده و به عنوان رقیق کننده رنگ ها از آن استفاده می شود.



۸۸- مخلوطی از دو گاز بوتان و ۱-بوتن به جرم ۱۰۰ گرم در اختیار داریم. اگر این مخلوط را با مقدار کافی گاز هیدروژن وارد واکنش کنیم، جرم بوتان موجود در مخلوط نهایی به ۷۱/۶ گرم می رسد. اگر بازده واکنش برابر ۲۸ درصد باشد، چند درصد جرمی مخلوط

اولیه را ۱-بوتن تشکیل داده است؟ ($C = 12, H = 1 : g.mol^{-1}$)


۲۵ (۴)

۷۵ (۳)

۶۰ (۲)

۴۰ (۱)

آلکان‌ها از جمله هیدروکربن‌های سیرشده بوده و با گاز هیدروژن واکنش نمی‌دهند. از طرفی آلکن‌ها از جمله هیدروکربن‌های سیرنشده بوده و هر مولکول آن‌ها برای سیرشدن با یک مولکول گاز هیدروژن واکنش می‌دهد. معادله واکنش گاز ۱-بوتن با مولکول هیدروژن به صورت زیر است:



فرض می‌کنیم در مخلوط اولیه x گرم ۱-بوتن حضور دارد. در این صورت جرم بوتان موجود در این مخلوط برابر با $100 - x$ گرم خواهد بود. در قدم اول، مقدار نظری بوتان تولید شده در این واکنش را محاسبه می‌کنیم:

$$? g C_4H_{10} = x g C_4H_8 \times \frac{1 \text{ mol } C_4H_8}{56 g C_4H_8} \times \frac{1 \text{ mol } C_4H_{10}}{1 \text{ mol } C_4H_8} \times \frac{58 g C_4H_{10}}{1 \text{ mol } C_4H_{10}} = \frac{58}{56} x g$$

در مرحله بعد، مقدار عملی بوتان تولید شده را به دست می‌آوریم:

$$\text{بازده} = \frac{\text{مقدار عملی}}{\text{مقدار نظری}} \times 100 \Rightarrow \text{مقدار عملی} = \frac{\text{بازده} \times \text{مقدار نظری}}{100} = \frac{58}{56} x \times \frac{28}{100} = 0.29x g$$

در ادامه با استفاده از جرم کل بوتان موجود در مخلوط نهایی، مقدار مجهول را پیدا می‌کنیم:

$$\text{جرم بوتان تولید شده} + \text{جرم اولیه بوتان} = 100 \Rightarrow 0.29x + (100 - x) = 100 - 0.71x = 71/6 \Rightarrow x = 40 g$$

بر این اساس، می‌توان گفت در مخلوط اولیه ۶۰ گرم بوتان وجود داشته و طی این فرایند نیز ۱۱/۶ گرم بوتان تولید شده است. در پایان درصد جرمی ۱-بوتن در مخلوط اولیه را محاسبه می‌کنیم:

$$\text{درصد جرمی} = \frac{40}{100} \times 100 = 40 \text{ درصد}$$

بازده شیمیایی

واکنش‌های شیمیایی همیشه مطابق آنچه انتظار می‌رود پیش نمی‌روند، زیرا ممکن است واکنش‌دهنده‌ها ناخالص باشند یا ممکن است واکنش به طور کامل انجام نشود، حتی گاهی نیز هم‌زمان با آن واکنش‌های ناخواسته دیگری انجام می‌شود. با این توصیف، مقدار واقعی فراورده از مقدار مورد انتظار کمتر است. در واقع بازده درصدی واکنش‌های شیمیایی از ۱۰۰ کمتر است. در مسائل مختلف از طریق فرمول زیر می‌توانیم بازده درصدی واکنش را محاسبه کنیم:

$$\text{بازده واکنش} = \frac{\text{مقدار عملی}}{\text{مقدار نظری}} \times 100$$

توجه داریم برای تبدیل مول یک فراورده به فراورده دیگر و همچنین یک واکنش‌دهنده به واکنش‌دهنده دیگر، بازده تأثیری نخواهد داشت!



۸۹- کدام یک از گزینه‌های زیر درست است؟

- ۱) با داشتن ظرفیت گرمایی دو نمونه، می‌توان مجموع انرژی ذرات موجود در آن‌ها را مقایسه کرد.
- ۲) اگر انرژی گرمایی دو نمونه از گاز کلر برابر باشد، میانگین انرژی جنبشی ذرات آن‌ها نیز قطعاً برابر است.
- ۳) با مخلوط کردن دو نمونه مختلف، دمای مخلوط پایانی، به مخلوطی با ظرفیت گرمایی بالاتر نزدیک‌تر خواهد بود.
- ۴) با انتقال انرژی برابر به دو نمونه آب و روغن با جرم برابر، میانگین انرژی جنبشی ذرات آب بیشتر افزایش پیدا می‌کند.

دمای یک نمونه، نشان‌دهنده میانگین انرژی جنبشی یا میانگین تندی ذرات سازنده آن نمونه است. برای محاسبه دمای تعادلی نمونه حاصل از مخلوط کردن دو ماده مختلف با یکدیگر، از رابطه زیر استفاده می‌کنیم:

$$\overbrace{\theta}^{\text{دمای تعادل}} = \frac{m_1 c_1 \theta_1 + m_2 c_2 \theta_2}{m_1 c_1 + m_2 c_2} = \frac{C_1 \theta_1 + C_2 \theta_2}{C_1 + C_2}$$

با توجه به قواعد میانگین‌گیری، دمای مخلوط نهایی یا همان دمای تعادل، به دمای اولیه مخلوطی با ظرفیت گرمایی (C) بزرگ‌تر، نزدیک‌تر خواهد بود.

بررسی سایر گزینه‌ها:

۱) برای مقایسه مجموع انرژی ذرات سازنده (انرژی کل یا همان آنتالپی) دو نمونه مختلف، باید نوع ذرات، شمار ذرات و دمای نمونه‌ها را با یکدیگر مقایسه کنیم. توجه داریم که ظرفیت گرمایی یک نمونه، مقدار انرژی لازم برای تغییر دمای آن نمونه را مشخص می‌کند و نمی‌توان با استفاده از آن، به مقدار انرژی کل آن نمونه پی برد.

۲) برای مقایسه انرژی گرمایی دو نمونه، نیاز به دانستن نوع ذرات، شمار ذرات و دمای نمونه داریم؛ بنابراین دو نمونه مشخص شده، می‌توانند شمار ذرات و دمای متفاوت داشته باشند اما انرژی گرمایی آن‌ها با یکدیگر برابر باشد.

۳) برای محاسبه انرژی مبادله شده در اثر تغییر دما، از رابطه زیر استفاده می‌کنیم:

$$Q = mc\Delta\theta = C\Delta\theta \Rightarrow \Delta\theta = \frac{Q}{C}$$


همان‌طور که می‌دانیم، ظرفیت گرمایی ویژه آب از روغن بیشتر است. با توجه به برابر بودن جرم دو نمونه، می‌توان گفت ظرفیت گرمایی نمونه آب نیز بیشتر از نمونه روغن است. با توجه به رابطه ذکر شده، مقدار تغییر دمای نمونه، با ظرفیت گرمایی آن نمونه رابطه عکس دارد؛ بنابراین می‌توان گفت، با دادن انرژی برابر به نمونه‌هایی از آب و روغن با جرم برابر، تغییر دمای نمونه آب، کم‌تر از تغییر دمای نمونه روغن خواهد بود.

ظرفیت گرمایی (C) و ظرفیت گرمایی ویژه (c)

ظرفیت گرمایی (C)، مقدار گرمای لازم برای افزایش دمای یک ماده به اندازه 1°C یا 1K است. این کمیت به جرم و جنس جسم بستگی دارد. یکای این کمیت، معادل با $1^\circ\text{C}^{-1} \cdot \text{J}$ یا $1\text{K}^{-1} \cdot \text{J}$ است. ظرفیت گرمایی از رابطه $C = m \times c$ محاسبه می‌شود. ظرفیت گرمایی ویژه (c)، مقدار گرمای لازم برای افزایش دمای یک گرم از ماده به اندازه 1°C یا 1K است. این کمیت فقط به جنس ماده وابسته است. همچنین یکای این کمیت، معادل با $1^\circ\text{C}^{-1} \cdot \text{J} \cdot \text{g}^{-1}$ یا $1\text{K}^{-1} \cdot \text{J} \cdot \text{g}^{-1}$ است. با توجه به توضیحات داده شده، برای افزایش دمای یکسان دو نمونه ماده با ظرفیت گرمایی (C) برابر، انرژی یکسانی لازم است؛ اما برای افزایش دمای یکسان دو نمونه با جرم برابر، نمونه‌ای با گرمای ویژه (c) بالاتر، انرژی بیشتری نیز نیاز دارد.



۹۰- با توجه به معادله واکنش‌های زیر، انرژی لازم برای تولید 360 گرم فلز جیوه مذاب، از تجزیه کامل چند گرم پتاسیم کلرات (KClO_3) به دست می‌آید؟ $(H_g = 200, K = 39, Cl = 35.5, O = 16 : g \cdot \text{mol}^{-1})$



۴۴۱ (۴)

۲۴۵ (۳)

۱۲۲/۵ (۲)

۳۶۷/۵ (۱)


(آسان - محاسباتی - سریع - صفحه ۶۴ - ۱۱۰۲)

پاسخ: گزینه ۴

معادله‌های گرمایشی واکنش‌های انجام شده به صورت زیر است:



$$\Delta H = -90\text{kJ}$$



$$\Delta H = 180\text{kJ}$$

در قدم اول، مقدار انرژی لازم برای تولید 360 گرم جیوه را محاسبه می‌کنیم:

$$? \text{ kJ} = 360 \text{ g Hg} \times \frac{1 \text{ mol Hg}}{200 \text{ g Hg}} \times \frac{180 \text{ kJ}}{2 \text{ mol Hg}} = 162 \text{ kJ}$$

در ادامه با برابر قرار دادن انرژی مبادله شده در دو واکنش، مقدار پتاسیم کلرات مصرف شده را به دست می‌آوریم:

$$? \text{ g KClO}_3 = 162 \text{ kJ} \times \frac{2 \text{ mol KClO}_3}{90 \text{ kJ}} \times \frac{122.5 \text{ g KClO}_3}{1 \text{ mol KClO}_3} = 441 \text{ g}$$

همان‌طور که مشخص است، واکنش تجزیه پتاسیم کلرات و جیوه (II) اکسید، به ترتیب از جمله واکنش‌های گرماده و گرماگیر هستند.

واکنش‌های گرماگیر و گرماده

مقایسه واکنش‌های گرماگیر و گرماده به صورت زیر است:



گرماشیمی (ترموشیمی)

هر واکنش شیمیایی می‌تواند با تغییر رنگ، تولید رسوب، آزاد شدن گاز و حتی ایجاد جرقه و گرما همراه باشد، اما یک ویژگی بنیادی و مشترک همه واکنش‌های شیمیایی دادوستد و تبادل انرژی با محیط اطراف است. بررسی و مطالعه گرمای مبادله شده در واکنش‌ها موجب پیدایش شاخه ترموشیمی (گرماشیمی) از علم شیمی شد. این شاخه از علم شیمی گرمای واکنش‌های شیمیایی از لحاظ کمی و کیفی، تغییر این گرما و تأثیر آن بر حالت فیزیکی مواد را بررسی می‌کند. همچنین به خاطر داشته باشید که اگر یک واکنش را با آنتالپی آن واکنش بیان کنند، به آن واکنش ترموشیمیایی گفته می‌شود.



۹۱- کدام یک از گزینه‌های زیر نادرست است؟

- ۱) با قوی‌تر شدن نیروی بین مولکولی آلکان‌ها، ارزش سوختی آن‌ها کاهش پیدا می‌کند.
- ۲) گرمای حاصل از سوختن یک گرم H_2 ، بیشتر از گرمای حاصل از سوختن یک گرم H_2 است.
- ۳) در واکنش سوختن دو نمونه اتانول و اتن با جرم برابر، مقدار انرژی آزاد شده از ماده سیر نشده، کمتر است.
- ۴) اگر سوختن متان را به جای دمای $150^\circ C$ ، در شرایط استاندارد انجام دهیم، مقدار انرژی مبادله شده تغییر پیدا می‌کند.

پاسخ: گزینه ۳ (متوسط - خط به خط و مفهومی - استاندارد) - صفحه ۷۳ - ۱۱۰۲

برای محاسبه مقدار انرژی حاصل از واکنش سوختن، می‌توان ارزش سوختی را در جرم ماده سوختنی ضرب کرد. در این رابطه داریم:

$$\text{جرم سوخت} \times \text{ارزش سوختی} = \text{انرژی آزاد شده} \Rightarrow \text{ارزش سوختی} = \frac{\text{انرژی آزاد شده}}{\text{جرم سوخت}}$$

ارزش سوختی یک ماده از رابطه زیر نیز محاسبه می‌شود:

$$\text{ارزش سوختی} = \frac{|\Delta H_{\text{آنتالپی سوختن}}|}{\text{جرم مولی}}$$

همان‌طور که مشخص است، ارزش سوختی با اندازه آنتالپی سوختن رابطه مستقیم و با جرم مولی نمونه رابطه عکس دارد. مقایسه بین اندازه آنتالپی سوختن مواد آلی مختلف (هم‌کربن) به صورت زیر است:

$$\text{آلکین} > \text{الکل} > \text{آلکن} > \text{آلکان} : |\Delta H_{\text{سوختن}}|$$


اندازه آنتالپی سوختن اتن در مقایسه با اتانول بزرگ‌تر بوده و جرم مولی آن نیز کمتر از اتانول است؛ بنابراین می‌توان گفت ارزش سوختی اتن بیشتر از اتانول است. با توجه به بیشتر بودن ارزش سوختی اتن در مقایسه با اتانول، می‌توان گفت در اثر سوختن جرم برابری از این دو ماده آلی، انرژی آزاد شده از سوختن اتن بیشتر خواهد بود.

بررسی سایر گزینه‌ها:

- ۱) با افزایش جرم مولی آلکان‌ها، نیروی بین مولکولی آن‌ها افزایش پیدا کرده و ارزش سوختی آن‌ها کاهش پیدا می‌کند؛ بنابراین می‌توان گفت در بین آلکان‌ها، متان بیشترین ارزش سوختی را دارد.
- ۲) سوختن هیدروژن نوعی واکنش گرماده بوده و با از دست دادن انرژی همراه است. در واکنش‌های گرماده، با افزایش انرژی واکنش‌دهنده‌ها یا کاهش انرژی فراورده‌ها، مقدار انرژی آزاد شده افزایش پیدا می‌کند. توجه داریم که انرژی ۱ گرم H در مقایسه با ۱ گرم گاز هیدروژن بیشتر است.

انواع واکنش‌های شیمیایی

در رابطه با انواع واکنش‌های شیمیایی داریم:



- ۴) سوختن متان نوعی واکنش گرماده بوده و با آزاد شدن انرژی همراه است. اگر این واکنش را به‌جای دمای بالا، در شرایط استاندارد انجام دهیم، انرژی مواد فراورده کاهش پیدا می‌کند و حتی حالت فیزیکی آن‌ها نیز دچار تغییر می‌شود. با کاهش سطح انرژی مواد فراورده در واکنش‌های گرماده، مقدار انرژی تولید شده افزایش پیدا می‌کند.



۹۲- سرعت متوسط فرایند اکسایش گلوکز برابر با $2 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{h}^{-1}$ و بازده این واکنش برابر با ۷۵٪ است. اگر با گذشت ۹۰ دقیقه از شروع واکنش، ۱۱۸۸ گرم CO_2 در این واکنش تولید شود، حجم ظرف برابر چند لیتر بوده است؟

($O = ۱۶, C = ۱۲ : \text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$)

۳ (۴)

۴ (۳)


۲ (۲)

۵ (۱)

(متوسط - محاسباتی - استاندارد - صفحه ۸۸ - ۱۱۰۲)

پاسخ: گزینه ۲

معادله موازنه شده واکنش اکسایش گلوکز به‌صورت زیر است:



ابتدا با توجه به بازده، مقدار نظری گاز کربن‌دی‌اکسید را محاسبه می‌کنیم:

$$\text{بازده} = \frac{\text{مقدار عملی}}{\text{مقدار نظری}} \times ۱۰۰ \Rightarrow \text{مقدار نظری} = \frac{\text{مقدار عملی} \times ۱۰۰}{\text{بازده}} = \frac{۱۱۸۸ \times ۱۰۰}{۷۵} = ۱۵۸۴ \text{ g}$$

در ادامه با استفاده از سرعت متوسط واکنش، سرعت تولید گاز کربن‌دی‌اکسید را به‌دست می‌آوریم:

$$\bar{R}_{\text{واکنش}} = \frac{R_{\text{CO}_2}}{\text{ضریب استوکیومتری CO}_2} \Rightarrow R_{\text{CO}_2} = \bar{R}_{\text{واکنش}} \times \text{ضریب استوکیومتری CO}_2 = ۲ \times ۶ = ۱۲ \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{h}^{-1}$$

در پایان با استفاده از سرعت تولید گاز کربن دی اکسید، حجم ظرف را محاسبه می کنیم:

$$\bar{R}_{CO_2} = \frac{\overbrace{|\Delta[CO_2]|}^{\text{تغییرات غلظت مولار}}}{\underbrace{\Delta t}_{\text{زمان سپری شده}}} \Rightarrow ۱۲ = \frac{\frac{۱۵۸۴ g}{۴۴ g \cdot mol^{-1}}}{۹۰ min \times \frac{۱ h}{۶۰ min}} = \frac{\frac{۳۶ mol}{V}}{۱/۵ h} \Rightarrow V = ۲ L$$


همانطور که مشخص است، حجم ظرف استفاده شده برای این واکنش، ۲ لیتر بوده است.

سرعت متوسط واکنش

برای محاسبه سرعت متوسط مصرف یا تولید مواد شرکت کننده در یک واکنش شیمیایی، باید از کمیت های قابل اندازه گیری مواد شرکت کننده در آن واکنش مانند جرم، فشار، غلظت و یا حجم استفاده کنیم. رابطه سرعت متوسط مصرف یا تولید یک ماده در یک واکنش شیمیایی به صورت زیر است:

$$\bar{R} = \frac{|n_2 - n_1|}{\Delta t} = \frac{|\Delta n|}{\Delta t}$$

در این رابطه، R معادل با سرعت متوسط مصرف یا تولید یک ماده، Δt بیانگر طول یک بازه زمانی و Δn معادل تغییر مقدار کمیت مورد نظر در طول آن بازه زمانی است. به علاوه می دانیم که سرعت متوسط مصرف یا تولید مواد شرکت کننده در یک واکنش، متناسب با ضرایب استوکیومتری آن ها خواهد بود؛ به عبارت دیگر، اگر ضرایب استوکیومتری مواد شرکت کننده در واکنش یکسان نباشد، سرعت متوسط مصرف یا تولید آن ها نیز متفاوت از یکدیگر خواهد بود. از این رو، شیمی دان ها برای درک آسان تر روند پیشرفت واکنش ها در واحد زمان، از یک مفهوم کاربردی به نام سرعت واکنش استفاده می کنند. سرعت واکنش، از تقسیم سرعت متوسط مصرف یا تولید هر یک از مواد شرکت کننده در واکنش بر ضریب استوکیومتری آن ماده در معادله واکنش به دست می آید. برای مثال معادله زیر را در نظر بگیرید:




برای محاسبه سرعت متوسط واکنش در بازه زمانی Δt به صورت زیر عمل می کنیم:

$$\bar{R}_{\text{واکنش}} = \frac{|\Delta n_A|}{۲ \times \Delta t} = \frac{|\Delta n_B|}{۱ \times \Delta t} = \frac{|\Delta n_C|}{۳ \times \Delta t} = \frac{|\Delta n_D|}{۲ \times \Delta t} \Rightarrow \bar{R}_{\text{واکنش}} = \frac{\bar{R}_A}{۲} = \frac{\bar{R}_B}{۱} = \frac{\bar{R}_C}{۳} = \frac{\bar{R}_D}{۲}$$



۹۳- کدام یک از عبارت های زیر درباره ترکیب داده شده درست است؟



($C = ۱۲, H = ۱ : g \cdot mol^{-1}$)

الف - این مولکول با مولکول های خود و مولکول های آب پیوند هیدروژنی برقرار می کند.

ب - در واکنش این ترکیب و مقدار کافی از یک دی اسید، نوعی پلی آمید تشکیل خواهد شد.

ج - هر اتم کربن موجود در آن، یک، دو و یا سه پیوند اشتراکی با اتم های N تشکیل داده است.

د - درصد جرمی اتم های کربن در این ترکیب آلی، ۸ برابر درصد جرمی اتم های هیدروژن آن است.

(۱) «الف» و «ب» (۲) «الف» و «ج» (۳) «ب» و «د» (۴) «ج» و «د»

(متوسط - مفهومی و محاسباتی - استاندارد ۱ - صفحه ۱۱۷ - ۱۱۰۳)


پاسخ: گزینه ۴

عبارت های (ج) و (د) درست هستند.

بررسی موارد:

الف) اگر یک مولکول، اتم هیدروژن متصل به اتم های نیتروژن، اکسیژن یا فلئور داشته باشد، می تواند با مولکول های خود و مولکول های آب پیوند هیدروژنی تشکیل دهد. در ساختار ترکیب آلی نمایش داده شده، اتم هیدروژن متصل به FON حضور نداشته و به همین دلیل، ذرات این ماده نمی توانند با مولکول های خود پیوند هیدروژنی تشکیل دهند. توجه داریم که برای ایجاد پیوند هیدروژنی میان ترکیب های آلی با مولکول های آب، وجود اتم اکسیژن در ساختار ترکیب آلی کافی است. برای مثال، استون می تواند با مولکول های آب برخلاف مولکول های خود پیوند هیدروژنی تشکیل دهد. به همین دلیل این ترکیب آلی در آب بسیار محلول است.

ب) معادله کلی تولید پلی آمیدها به صورت زیر است:



از واکنش نوعی ترکیب آلی از دسته دی‌اسیدها با نوعی ترکیب آلی از دسته دی‌آمین‌ها، پلی‌آمیدها تشکیل می‌شوند. توجه داریم که اتم‌های نیتروژن موجود در ساختار مولکول دی‌آمین، باید حداقل به یک اتم هیدروژن متصل باشند. این در حالی است که در ترکیب آلی ذکر شده، اتم‌های نیتروژن موجود در گروه‌های عاملی آمینی، تنها با اتم‌های کربن پیوند اشتراکی برقرار کرده‌اند.

همان‌طور که در ساختار ترکیب آلی مشخص است، هر کدام از اتم‌های کربن موجود در ساختار این ترکیب آلی، با یک، دو یا سه پیوند اشتراکی به اتم‌های نیتروژن اطراف خود متصل شده‌اند. توجه داریم که هر پیوند دوگانه، دو پیوند شمرده می‌شود.

فرمول شیمیایی این ترکیب آلی به صورت $C_8H_{12}N_4O_2$ است. برای محاسبه شمار اتم‌های هیدروژن یک ترکیب آلی می‌توانیم از رابطه زیر استفاده کنیم:

$$\text{تعداد } X_{\text{هالوژن}} - \text{تعداد } N + 4 \times (\text{تعداد پیوند سه‌گانه}) - 2 \times (\text{تعداد حلقه} + \text{تعداد پیوند دوگانه}) - 2 = (2 \times \text{تعداد } C) + \text{شمار } H$$

$$= (8 \times 2) + 2 - (\underbrace{5}_{\text{سه پیوند دوگانه و دو حلقه}} \times 2) + \underbrace{4}_{\text{شمار اتم‌های نیتروژن}} = 12$$

حال نسبت درصد جرمی اتم‌های کربن به اتم‌های هیدروژن را محاسبه می‌کنیم:

$$\frac{\text{نسبت درصد جرمی کربن به هیدروژن}}{\text{درصد جرمی کربن}} = \frac{\text{جرم اتم‌های کربن}}{\text{جرم مولی مولکول}} \times 100 = \frac{\text{جرم اتم‌های کربن}}{\text{جرم اتم‌های هیدروژن}} = \frac{8 \times 12}{12 \times 1} = 8$$




۹۴- مقدار ۱۸۴ گرم اتانول در واکنش با مقدار کافی از یک اسید، نوعی استر با فرمول شیمیایی $C_7H_{14}O_2$ تولید می‌کند. فرمول شیمیایی اسید مصرف شده در این واکنش و جرم آب تولید شده کدام است؟ ($O = 16, C = 12, H = 1 : g.mol^{-1}$)

(۱) $C_5H_{10}O_2 - 72$ (۲) $C_6H_{12}O_2 - 144$ (۳) $C_5H_{10}O_2 - 144$ (۴) $C_6H_{12}O_2 - 72$

(آسان - مفهومی و محاسباتی - سریع - صفحه ۱۱۵ - ۱۱۰۳)

پاسخ: گزینه ۱


استرها گروهی از مواد آلی هستند که از واکنش الکل‌ها و کربوکسیلیک اسیدها حاصل می‌شوند. معادله واکنش تولید این دسته از مواد آلی به صورت زیر است:



معادله ساختار این فرایند را به صورت زیر نیز می‌توان نشان داد:




همان‌طور که مشخص است، مجموع شمار اتم‌های کربن موجود در الکل و کربوکسیلیک اسید، با شمار اتم‌های کربن موجود در استر برابر است. الکل سازنده این استر، معادل با اتانول است، بنابراین شمار اتم‌های کربن موجود در کربوکسیلیک اسید سازنده این استر برابر ۵ است. پس می‌توان گفت معادله واکنش انجام شده به صورت زیر است:



در مرحله بعد جرم آب تولید شده را محاسبه می‌کنیم:

$$? g H_2O = 184 g C_7H_6O \times \frac{1 \text{ mol } C_7H_6O}{46 g C_7H_6O} \times \frac{1 \text{ mol } H_2O}{1 \text{ mol } C_7H_6O} \times \frac{18 g H_2O}{1 \text{ mol } H_2O} = 72 g$$




استرها دسته‌ای از ترکیب‌های آلی هستند که در ساختار خود یک یا چند گروه استری ($-COO-$) دارند. استرها را اغلب به‌عنوان عامل طعم و بوی میوه‌ها، گل‌ها، شکوفه‌ها و عطرها می‌شناسند. این مواد آلی از واکنش اسیدهای آلی (کربوکسیلیک اسیدها) و الکل‌ها حاصل می‌شوند. برای تهیه استرها نیاز به محیط اسیدی قوی (معمولاً سولفوریک اسید) است. معادله این واکنش به‌صورت زیر است:



از استرهای معروف می‌توان به اتیل بوتانوات (عامل طعم و بوی آناناس)، اتیل اتانوات (حلال چسب)، متیل بوتانوات (عامل طعم و بوی سیب)، پنتیل اتانوات (عامل طعم و بوی موز) و اتیل هپتانوات (عامل طعم و بوی انگور) اشاره کرد. نام همه استرها به قالب کلی «آلکیل آلکانوات» است. بخش «آلکیل»، مربوط به تعداد کربن‌های الکل سازنده و بخش «آلکانوات» نیز مربوط به تعداد کربن‌های اسید آلی سازنده است. استرهای تک عاملی سیر شده بدون حلقه با اسیدهای آلی با همین ویژگی‌ها ایزومر هستند. دقت کنید که نقطه جوش و انحلال‌پذیری اسید آلی در آب از استر ایزومر خود به دلیل برقراری پیوند هیدروژنی بیشتر است.




۹۵- از سوختن مقداری از یک استر سه عاملی با زنجیرهای هیدروکربنی سیر شده یکسان، 1320 گرم کربن‌دی‌اکسید و 522 گرم بخار آب تولید شده است. فرمول شیمیایی اسید چرب سازنده این استر کدام است؟ ($O = 16, C = 12, H = 1 : g.mol^{-1}$)




(متوسط - مفهومی و محاسباتی - استاندارد - صفحه ۵ - ۱۲۰۱)

پاسخ: گزینه ۲

استرهای سه عاملی از جمله ترکیب‌های آلی بوده و فرمول شیمیایی آن‌ها به‌صورت $C_nH_mO_6$ است. ساختار کلی این مواد به‌صورت زیر است:



اگر زنجیرهای هیدروکربنی این مولکول‌ها سیر شده باشند، فرمول شیمیایی آن‌ها به‌صورت $C_nH_{2n-4}O_6$ خواهد بود؛ بنابراین معادله موازنه شده سوختن این ترکیب آلی به‌صورت زیر است:



در مرحله بعد، مول کربن‌دی‌اکسید و بخار آب تولید شده را محاسبه می‌کنیم:


$$CO_2 : \text{مول} = \frac{\text{جرم}}{\text{جرم مولی}} = \frac{1320}{44} = 30 \text{ mol}$$

$$H_2O : \text{مول} = \frac{\text{جرم}}{\text{جرم مولی}} = \frac{522}{18} = 29 \text{ mol}$$

با توجه به ضرایب مواد در معادله موازنه شده واکنش سوختن ترکیب استری، نسبت مول بخار آب تولید شده به مول کربن‌دی‌اکسید تولید شده برابر $\frac{n-2}{n}$ است. از طرفی طبق محاسبات انجام شده، نسبت مورد نظر در واکنش سوختن استر داده شده برابر $\frac{29}{30}$ است. حال با برابر قرار دادن این دو مقدار، n را پیدا می‌کنیم. داریم:

$$\frac{n-2}{n} = \frac{29}{30} \Rightarrow 30n - 60 = 29n \Rightarrow n = 60$$


با توجه به محاسبات انجام شده، فرمول شیمیایی استر سه عاملی، به‌صورت $C_{60}H_{116}O_6$ است. حال معادله واکنش آن با مقدار کافی آب و تولید الکل و اسید چرب سازنده را می‌نویسیم. داریم:



فرمول شیمیایی اسید چرب سازنده این ماده، به‌صورت $C_{19}H_{38}O_2$ است.

تبدیل فرمول شیمیایی استر سه عاملی، اسید چرب و صابون به یکدیگر

چربی‌ها مخلوطی از اسیدهای چرب و استرهای بلند زنجیر هستند که بخش ناقطبی آن‌ها بر بخش قطبی‌شان غلبه دارد و در نتیجه نیروی بین مولکولی غالب در آن‌ها از نوع واندروالسی است. ساختار ذرات موجود در چربی‌ها را می‌توان به صورت زیر نشان داد:



برای یافتن فرمول شیمیایی اسید چرب حاصل از آبکافت استر سه عاملی، به صورت زیر عمل کنید:

۱) برای محاسبه شمار اتم‌های کربن اسید چرب، شمار اتم‌های کربن استر را منهای ۳ کرده و حاصل را تقسیم بر ۳ کنید. برای مثال اگر استر ۵۷ اتم کربن داشته باشد، اسید چرب حاصل، ۱۸ $(\frac{57-3}{3})$ اتم کربن خواهد داشت.

۲) برای محاسبه شمار اتم‌های هیدروژن اسید چرب، شمار اتم‌های هیدروژن استر را منهای ۲ کرده و حاصل را تقسیم بر ۳ کنید. برای مثال اگر استر ۱۱۰ اتم هیدروژن داشته باشد، اسید چرب حاصل، ۳۶ $(\frac{110-2}{3})$ اتم هیدروژن خواهد داشت.

۳) شمار اتم‌های اکسیژن اسید چرب برابر ۲ است.

توجه داشته باشید برای یافتن فرمول صابون حاصل از اسید چرب، باید یکی از اتم‌های هیدروژن آن را کم کرده و در انتهای فرمول، نماد کاتیون را قرار دهید. برای مثال فرمول شیمیایی صابون جامد حاصل از واکنش $C_{17}H_{35}O_2$ با سدیم هیدروکسید، $C_{17}H_{33}O_2Na$ است.



۹۶- کدام یک از عبارات‌های زیر درست است؟

الف - کاغذ pH در یک مخلوط حاوی آب و صابون، آبی رنگ می‌شود.

ب - افزودن آنزیم به صابون، سرعت پاک کردن رسوب ایجاد شده در کتری را افزایش می‌دهد.

ج - با حل شدن یک نمونه صابون در آب، اتم‌های اکسیژن صابون در مجاورت اتم‌های اکسیژن آب قرار می‌گیرند.

د - با افزودن نمک‌های فسفات به صابون، قدرت پاک‌کنندگی آن در آب دریا به پاک‌کننده‌های غیرصابونی نزدیک می‌شود.

۱) «الف» و «ج» ۲) «الف» و «د» ۳) «ب» و «ج» ۴) «ب» و «د»

(آسان - خط به خط و مفهومی - سریع ۵ - صفحه ۱۲ - ۱۲۰۱)

پاسخ: گزینه ۲

عبارات‌های (الف) و (د) درست هستند.

بررسی موارد:

الف) صابون خاصیت بازی داشته و با حل شدن در یک نمونه آب، غلظت یون هیدروکسید را افزایش می‌دهد. با افزایش غلظت یون

هیدروکسید در یک محلول آبی، مقدار pH محلول افزایش پیدا کرده و رنگ کاغذ pH در این محلول، آبی خواهد بود.

پ) افزودن آنزیم به صابون، قدرت پاک‌کنندگی آن را افزایش می‌دهد، اما توجه داریم که صابون‌ها و پاک‌کننده‌های غیرصابونی، توانایی از

بین بردن رسوب ایجاد شده بر روی کتری را ندارند. این مواد، به سختی به دیواره ظرف چسبیده و بر این اساس، برای زدودن این

رسوب‌ها، به پاک‌کننده‌های خورنده نیاز داریم.

ج) فرمول ساختاری صابون به صورت زیر است:



صابون (نمک اسید چرب)

با حل شدن یک نمونه صابون در آب، آنیون و کاتیون سازنده آن از یکدیگر جدا شده و در آب پخش می‌شوند. اتم‌های اکسیژن موجود

در آنیون، بار منفی داشته و توسط سر مثبت مولکول آب یعنی اتم‌های هیدروژن، آب‌پوشیده می‌شوند.

صابون‌ها در مجاورت با آب سخت، با دو یون کلسیم و منیزیم موجود در این نمونه از آب، رسوب سفیدرنگی ایجاد می‌کنند که بر روی لباس دیده می‌شود. با افزودن ترکیب‌های حاوی فسفات به صابون‌ها، یون‌های فسفات با کاتیون‌های موجود در آب سخت واکنش داده و رسوب ایجاد می‌کنند؛ بنابراین صابون می‌تواند خاصیت پاک‌کنندگی خود را حفظ کند. این در حالی است که پاک‌کننده‌های غیرصابونی با یون‌های موجود در آب واکنش نمی‌دهند؛ بنابراین می‌توان گفت با افزودن یون فسفات به صابون‌ها، قدرت پاک‌کنندگی آن‌ها به پاک‌کننده‌های غیرصابونی نزدیک‌تر می‌شود.

عوامل مؤثر بر قدرت پاک‌کنندگی صابون

- صابون‌های مختلف، همه لکه‌های موجود بر روی پارچه‌ها را به یک اندازه از بین نمی‌برند. در واقع، هر چقدر که یک پاک‌کننده صابونی بتواند مقدار بیشتری از آلاینده‌ها و چربی‌های روی لباس را بزدايد، قدرت پاک‌کنندگی بیشتری دارد. عوامل مؤثر بر قدرت پاک‌کنندگی صابون، به شرح زیر هستند:
- (۱) **میزان سختی آب:** صابون‌ها در مجاورت با آب سخت، با دو یون کلسیم و منیزیم موجود در این نمونه از آب، رسوب سفیدرنگی ایجاد می‌کنند که بر روی لباس دیده می‌شود. در این حالت، قدرت پاک‌کنندگی صابون به شدت کاهش می‌یابد. واکنش صابون‌های جامد با یون‌های Ca^{2+} و Mg^{2+} به صورت زیر است:

$$2RCOONa + CaCl_2 \rightarrow (RCOO)_2Ca + 2NaCl$$

$$2RCOONa + MgCl_2 \rightarrow (RCOO)_2Mg + 2NaCl$$
 - (۲) **جنس پارچه:** چسبندگی لکه‌های چربی بر روی لباس‌های نخی یا همان پنبه‌ای، کمتر از پارچه‌های پلی‌استری است. بر این اساس، می‌توان گفت صابون بر روی لکه‌های ایجاد شده بر سطح پارچه‌های نخی اثر بیشتری دارد.
 - (۳) **آنزیم:** آنزیم نوعی کاتالیزگر است که فرایندهای تجزیه مواد موجود در لکه‌ها را تسريع می‌بخشد و این مواد را به مواد ساده‌تر تبدیل می‌کند. اضافه کردن آنزیم به صابون، قدرت پاک‌کنندگی صابون را افزایش می‌دهد.
 - (۴) **دما:** علاوه بر این که در دماهای بالاتر، ساختار چربی‌های موجود بر روی سطح لباس سست می‌شود، افزایش دما سرعت انجام هر واکنش شیمیایی را نیز افزایش می‌دهد. پس افزایش دما نیز قدرت پاک‌کنندگی صابون را افزایش می‌دهد.
 - (۵) **افزودنی‌های شیمیایی:** اضافه کردن جوش شیرین به صابون، موجب ایجاد خاصیت بازی و افزایش قدرت پاک‌کنندگی آن می‌شود. افزودن نمک‌های فسفات به صابون نیز قدرت پاک‌کنندگی آن را در مواجهه با آب سخت افزایش می‌دهد.



۹۷- کدام یک از گزینه‌های زیر درست است؟ ($Cl = 35/5, O = 16, C = 12, H = 1 : g.mol^{-1}$)

- (۱) تنها با داشتن ثابت یونش دو اسید می‌توان خاصیت اسیدی محلول‌های حاوی این دو اسید را مقایسه کرد.
- (۲) در غلظت برابر بازها، $[H^+]$ در محلول حاوی آمونیاک در مقایسه با محلول حاوی سدیم هیدروکسید کمتر است.
- (۳) اگر pH دو محلول اسیدی هم‌حجم، برابر باشد، اسید قوی‌تر برای خنثی شدن به جرم بیشتری از $NaOH$ نیاز دارد.
- (۴) با حل کردن جرم برابر CH_3COOH و HCl در حجم یکسان از آب، pH محلول حاوی HCl پایین‌تر خواهد بود.

پاسخ: گزینه ۴

(متوسط - مفهومی - استاندارد) - صفحه ۳۰ - ۱۲۰۱

اتانویک اسید از دسته کربوکسیلیک اسیدها بوده و نوعی اسید ضعیف به شمار می‌رود. درجه یونش اسیدهای ضعیف کمتر از ۱ است. از طرفی هیدروکلریک اسید، از جمله اسیدهای قوی بوده و درجه یونش آن برابر یک است. جرم مولی اتانویک اسید، بزرگ‌تر از هیدروکلریک اسید است؛ بنابراین در جرم برابر، مول حل‌شده هیدروکلریک اسید بیشتر از اتانویک اسید خواهد بود. در این رابطه داریم:

$$\text{جرم مولی} = \frac{\text{جرم}}{\text{مول}}$$

از طرفی با توجه به مقایسه درجه یونش این دو اسید، با حل شدن این دو ترکیب مولکولی در آب، درصد بیشتری از مولکول‌های هیدروکلریک اسید یونش پیدا کرده و در آب یون هیدرونیوم تولید می‌کنند. پس می‌توان گفت غلظت یون هیدرونیوم در محلول حاوی هیدروکلریک اسید بیشتر خواهد بود. در این رابطه داریم:

$$[H^+] = \frac{M}{\text{ب}} \times \frac{a}{\text{ب}}$$

غلظت یون هیدرونیوم غلظت اولیه اسید درجه یونش اسید

از طرفی با افزایش غلظت یون هیدرونیوم در محلول‌های اسیدی، pH آن‌ها کاهش پیدا می‌کند؛ بنابراین pH محلول حاوی هیدروکلریک اسید در مقایسه با محلول حاوی اتانوئیک اسید قطعاً کمتر خواهد بود. در رابطه با فرایند یونش داریم:




بررسی سایر گزینه‌ها:

❶ خاصیت اسیدی محلول‌ها با غلظت یون هیدرونیوم آن‌ها رابطه مستقیم دارد. برای مقایسه غلظت یون هیدرونیوم دو محلول، علاوه بر ثابت یونش، به غلظت اولیه اسید حل شده نیز نیاز داریم.

❷ آمونیاک نوعی باز ضعیف و سدیم هیدروکسید نوعی باز قوی است؛ بنابراین غلظت یون هیدروکسید در محلول حاوی سدیم هیدروکسید بیشتر خواهد بود. با توجه به رابطه $[H^+] \times [OH^-] = 10^{-14}$ ، غلظت یون هیدروکسید در محلول، با غلظت یون هیدرونیوم آن رابطه عکس دارد؛ بنابراین می‌توان گفت غلظت یون هیدرونیوم در محلول حاوی آمونیاک بیشتر است.

❸ برابر بودن pH دو محلول، به معنای برابر بودن غلظت یون هیدرونیوم محلول‌ها است. از طرفی همان‌طور که می‌دانیم، درجه یونش اسید ضعیف کمتر از ۱ بوده و درجه یونش اسید قوی برابر ۱ است؛ بنابراین برای داشتن محلول‌هایی هم‌حجم با غلظت یون هیدرونیوم برابر، مول اسید ضعیف حل شده باید بیشتر از مول اسید قوی باشد. از طرفی برای مقایسه جرم باز مورد نیاز برای خنثی کردن دو محلول اسیدی، باید مول اسید اولیه حل شده در آن‌ها را مقایسه کنیم. مول اسید ضعیف حل شده بیشتر از اسید قوی بوده و بنابراین جرم باز مورد نیاز آن برای خنثی شدن نیز بیشتر خواهد بود. باید مقایسه قدرت اسیدهای ضعیف مطرح شده در کتاب درسی را حفظ کنید:



۹۸- کلمات داده شده در کدام گزینه، جمله زیر را به‌درستی تکمیل می‌کند؟

در سلول گالوانی روی-مس، جهت حرکت الکترون‌ها با جهت حرکت یون‌های یکسان بوده و با جایگزین کردن تیغه آند آن با فلز لیتیم، مقدار نیروی الکتروموتوری سلول پیدا می‌کند.

- (۱) Zn^{2+} - کاهش (۲) Zn^{2+} - افزایش (۳) Cu^{2+} - کاهش (۴) Cu^{2+} - افزایش

(آسان - مفهومی - سریع ۵ - صفحه ۴۹ - ۱۲۰۲)

پاسخ: گزینه ۲

با استفاده از دو نیم‌سلول و یک دیواره متخلخل می‌توان نوعی سلول گالوانی ساخت. از سلول گالوانی می‌توان برای تبدیل انرژی شیمیایی موجود در عناصر به انرژی الکتریکی استفاده کرد. قدرت کاهندگی فلز روی در مقایسه با مس بیشتر بوده و بنابراین در این سلول، نیم‌سلول‌های روی و مس به‌ترتیب معادل با نیم‌سلول آند و کاتد هستند. در سلول‌های گالوانی جهت حرکت الکترون همانند جهت حرکت کاتیون‌های موجود در نیم‌سلول آند، از آند به کاتد است؛ بنابراین پاسخ قسمت اول سؤال، یون Zn^{2+} است. از طرفی می‌دانیم که لیتیم در مقایسه با روی قدرت کاهندگی بیشتری داشته و پتانسیل کاهشی استاندارد آن کمتر است. با کاهش پتانسیل استاندارد آند یا افزایش پتانسیل استاندارد کاتد، اختلاف پتانسیل استاندارد دو نیم‌سلول افزایش پیدا کرده و در نتیجه نیروی الکتروموتوری سلول نیز افزایش پیدا می‌کند.

از سلول‌های گالوانی برای تبدیل انرژی شیمیایی ذخیره شده در فلزهای مختلف به انرژی الکتریکی استفاده می‌شود. هر سلول گالوانی از کنار هم قرار گرفتن اجزای مختلفی تشکیل شده است که باید نام و وظیفه هر قسمت را در ذهن داشته باشیم. این اجزا به شرح زیر هستند:


✓ **آند:** به الکترود یا همان تیغه‌ای که نیم‌واکنش اکسایش در مجاورت آن اتفاق می‌افتد، آند گفته می‌شود. از آنجا که تیغه آند در یک سلول گالوانی، اکسید شده و کاتیون‌های حاصل از آن وارد محلول می‌شوند، به مرور زمان از جرم این تیغه کاسته شده و به اصطلاح، جرم تیغه آندی به مرور زمان کاهش می‌یابد.

✓ **الکترولیت آندی:** به الکترولیت یا محلولی که تیغه آند در آن قرار دارد، الکترولیت آندی گفته می‌شود. کاتیون‌های تولیدشده بر اثر اکسایش تیغه آند، در قالب یون‌های آب‌پوشیده وارد این محلول می‌شوند.

✓ **کاتد:** الکترودی است که نیم‌واکنش کاهش در مجاورت آن اتفاق می‌افتد. از آنجا که در مجاورت کاتد یک سلول گالوانی، نیم‌واکنش کاهش انجام شده و اتم‌های فلزی حاصل از این فرایند به تیغه کاتدی می‌چسبند، به مرور زمان جرم تیغه کاتدی افزایش پیدا می‌کند.

✓ **الکترولیت کاتدی:** الکترولیت یا محلولی است که تیغه کاتد در آن قرار دارد. کاتیون‌های موجود در این محلول به مرور زمان کاهش یافته و به تیغه کاتد می‌چسبند، پس غلظت کاتیون در این محلول به تدریج کاهش پیدا می‌کند.

✓ **دیواره متخلخل:** در یک سلول گالوانی، به مرور زمان فلز به کاررفته در آند اکسایش پیدا کرده و کاتیون‌های حاصل از این فرایند، وارد الکترولیت آندی می‌شوند. با ادامه این فرایند، کاتیون‌ها در الکترولیت آندی تجمع پیدا کرده و این محلول بار مثبت پیدا می‌کند. تجمع بار مثبت در این نیم‌سلول، الکترون‌ها را به سمت خود جذب کرده و از حرکت آن‌ها در مدار خارجی جلوگیری می‌کند. در سمت کاتدی نیز، غلظت آنیون‌ها بیشتر از کاتیون‌های نیم‌سلول شده و مانع از وارد شدن الکترون به نیم‌سلول می‌شوند. دیواره متخلخل با به جریان انداختن یون‌ها (حرکت آنیون‌ها به سمت آند و کاتیون‌ها به سمت کاتد)، باعث خنثی ماندن دو الکترولیت می‌شود. تصویر زیر، نمایی از یک سلول گالوانی نشان می‌دهد:



۹۹- تیغه آهنی به جرم ۱۰ گرم را وارد ۵۰۰ میلی‌لیتر محلول ۰/۲ مولار مس (II) سولفات می‌کنیم. اگر با انجام کامل واکنش و مصرف کامل مس (II) سولفات موجود در محلول، جرم تیغه به ۷/۶ گرم برسد، چند درصد از فلز تولید شده در واکنش، روی تیغه آهنی رسوب کرده است؟ ($Cu = 64, Fe = 56 : g.mol^{-1}$)

۱۰۰ (۴)

۸۰ (۳)


۶۰ (۲)

۵۰ (۱)


(متوسط - محاسباتی - استاندارد) - صفحه ۴۳ - ۱۲۰۲

پاسخ: گزینه ۱


فلز آهن در مقایسه با مس قدرت کاهندگی بیشتری داشته و در سری الکتروشیمیایی در موقعیت پایین‌تری دارد. در رابطه با قدرت کاهندگی و اکسندگی عناصر مختلف، داریم:



بنابراین آهن می‌تواند با یون مس (II) به صورت طبیعی واکنش دهد. معادله واکنش انجام شده به صورت زیر است:



توجه داریم که یون سولفات در این واکنش به‌عنوان یون ناظر بوده و می‌توان آن را از معادله واکنش حذف کرد. در این صورت معادله واکنش شیمیایی انجام شده به‌صورت زیر است:



ابتدا با توجه به مقدار $CuSO_4$ موجود در محلول، جرم آهن مصرف شده را محاسبه می‌کنیم:

$$? g Fe = 0.5 L \text{ محلول} \times \frac{0.2 mol CuSO_4}{1 L \text{ محلول}} \times \frac{1 mol Fe}{1 mol CuSO_4} \times \frac{56 g Fe}{1 mol Fe} = 5.6 g$$

در مرحله بعد، جرم فلز مس تولید شده را به‌دست می‌آوریم:

$$? g Cu = 0.5 L \text{ محلول} \times \frac{0.2 mol CuSO_4}{1 L \text{ محلول}} \times \frac{1 mol Cu}{1 mol CuSO_4} \times \frac{64 g Cu}{1 mol Cu} = 6.4 g$$

با مصرف ۵/۶ گرم از فلز آهن موجود در تیغه، جرم آن از ۱۰ گرم به ۴/۴ گرم می‌رسد. در ادامه با رسوب مقداری از مس تولید شده روی تیغه آهنی، جرم آن به ۷/۶ گرم رسیده است؛ بنابراین می‌توان گفت جرم فلز مس رسوب کرده روی تیغه آهنی برابر ۳/۲ گرم است. در این رابطه داریم:

$$m = 7.6 - 4.4 = 3.2 g$$

از ۶/۴ گرم فلز مس تولید شده، ۳/۲ گرم آن روی سطح تیغه رسوب کرده است. در پایان درصد فلز مس رسوب کرده روی تیغه آهنی را به‌دست می‌آوریم:

$$\%50 = \frac{3.2}{6.4} \times 100 = \text{درصد فلز مس رسوب کرده روی تیغه آهنی}$$



۱۰۰- کدام یک از موارد زیر درست است؟ ($O = 16, N = 14, H = 1 : g \cdot mol^{-1}$)



- الف - واکنش انجام شده در کاتد سلول سوختی و کاتد سلول برقکافت آب یکسان است.
 ب - در سلول سوختی هیدروژن-اکسیژن، همانند سلول سوختی متان، گاز گلخانه‌ای تولید می‌شود.
 ج - فراورده تولید شده در کاتد سلول برقکافت آب، به‌عنوان واکنش‌دهنده در آند سلول سوختی کاربرد دارد.
 د - کاغذ pH در سمتی از سلول برقکافت آب که حجم گاز تولید شده آن بیشتر است، به رنگ قرمز دیده می‌شود.
- (۱) «الف» و «ج» (۲) «الف» و «د» (۳) «ب» و «ج» (۴) «ب» و «د»

(متوسط - مفهومی - سریع ۱ - صفحه ۵۴ - ۱۲۰۲)


پاسخ: گزینه ۳

عبارت‌های (ب) و (ج) درست هستند.

بررسی موارد:



نیم‌واکنش‌ها و واکنش کلی انجام شده در سلول برقکافت آب نیز به‌صورت زیر است:




توجه داریم که در کاتد سلول‌های گالوانی و الکترولیتی، نیم‌واکنش کاهش انجام می‌شود. همان‌طور که مشخص است، نیم‌واکنش کاهش انجام شده در این سلول‌ها متفاوت است.

پ) در سلول سوختی هیدروژن، بخار آب و در سلول سوختی متان، گاز کربن دی‌اکسید و بخار آب تولید می‌شود. بخار آب همانند کربن دی‌اکسید از جمله گازهای گلخانه‌ای است.

فرآورده‌های تولید شده در کاتد سلول برقکافت آب، یون هیدروکسید و گاز هیدروژن است. گاز هیدروژن به‌عنوان سوخت، در سمت آند سلول سوختی هیدروژن-اکسیژن کاربرد دارد.


معادله کلی واکنش انجام شده در سلول برقکافت آب به‌صورت زیر است:




با توجه به ضرایب استوکیومتری مواد در معادله واکنش، حجم گاز هیدروژن تولید شده در کاتد، دو برابر حجم گاز اکسیژن تولید شده در آند است. در کاتد این سلول، علاوه بر گاز هیدروژن، یون هیدروکسید نیز تولید می‌شود. با افزایش غلظت یون هیدروکسید در محلول آبی، pH افزایش پیدا کرده و رنگ کاغذ pH آبی تا بنفش خواهد بود.

سلول سوختی هیدروژن - اکسیژن

شکل زیر ساختار سلول سوختی هیدروژن - اکسیژن را نشان می‌دهد:



سلول سوختی نوعی سلول گالوانی است که شیمی‌دان‌ها برای تأمین انرژی و کاهش آلودگی محیط زیست پیشنهاد می‌دهند. این سلول‌ها افزون بر کارایی بیشتر، می‌توانند ردیای کربن‌دی‌اکسید را کاهش دهند و منبع انرژی سبز به حساب می‌آیند. رایج‌ترین سلول سوختی، سلول هیدروژن - اکسیژن است. دستگاهی که در آن گاز هیدروژن با گاز اکسیژن به‌صورت کنترل شده واکنش می‌دهد و بخش قابل توجهی از انرژی شیمیایی به انرژی الکتریکی تبدیل می‌شود. مطابق شکل، هر سلول سوختی سه جزء اصلی دارد به‌طوری‌که شامل یک غشا، الکترود آند و الکترود کاتد است. در این سلول، آند و کاتد دارای کاتالیزگرهایی هستند که به نیم‌واکنش‌های اکسایش و کاهش سرعت می‌بخشند. واکنش کلی در چنین سلولی به‌صورت زیر است:



صرف‌نظر از حالت فیزیکی H_2O ، واکنش کلی در این سلول را می‌توان عکس واکنش کلی برقکافت آب در نظر گرفت. مطابق شکل بالا جهت جریان H^+ در غشای مبادله‌کننده از سمت آند به کاتد است.

۱۰۱- کدام یک از گزینه‌های زیر درست است؟

- (۱) با توجه به مدل دریای الکترونی، فلزها از جمله رساناهای یونی به‌شمار می‌روند.
- (۲) اگر A یک فلز قلیایی خاکی باشد، آنتالپی فروپاشی AO ، کوچک‌تر از لیتیم سولفید است.
- (۳) با افزایش شعاع در آنیون‌های حاصل از عناصر دوره سوم، چگالی بار آن‌ها کاهش پیدا می‌کند.
- (۴) با استفاده از مدل دریای الکترونی، می‌توان چکش‌خواری عناصر فلزی را برخلاف واکنش‌پذیری آن‌ها را توجیه کرد.

پاسخ: گزینه ۴

(متوسط - مفهومی - سریع - صفحه ۸۴ - ۱۲۰۳)

با استفاده از مدل دریای الکترونی، می‌توان برخی از ویژگی‌های فیزیکی فلزها از جمله رسانایی و چکش‌خواری آن‌ها را توجیه کرد. توجه داریم که واکنش‌پذیری از جمله ویژگی‌های شیمیایی عناصر است و به کمک مدل دریای الکترونی توجیه نمی‌شود.

تصویر زیر، نمایی از توجیه این دو ویژگی بر اساس مدل دریای الکترونی را نشان می‌دهد:




بررسی سایر گزینه‌ها:

عناصر فلزی و کربن (گرافیت)، از جمله رساناهای الکترونی هستند. محلول‌های آبی حاوی یون نیز در دسته رساناهای یونی طبقه‌بندی می‌شوند.


انواع رسانایی مواد

نمودار زیر انواع رسانایی مواد را نمایش می‌دهد:




به فلزهای موجود در گروه دوم جدول تناوبی، فلزهای قلیایی خاکی گفته می‌شود. این عناصر با از دست دادن دو الکترون و تشکیل کاتیون A^{2+} ، در ساختار ترکیب‌های یونی قرار می‌گیرند. برای مقایسه آنتالپی فروپاشی دو ترکیب یونی، ابتدا مجموع اندازه بار یون‌های آنها را مقایسه می‌کنیم. مجموع اندازه بار آنیون و کاتیون (مجموع قدر مطلق بارها) در اکسید فلز قلیایی خاکی و لیتیم سولفید، به ترتیب برابر ۴ و ۳ است؛ بنابراین آنتالپی فروپاشی اکسید فلز قلیایی خاکی بزرگ‌تر است.

۳) آنیون‌های حاصل از نافلزهای دوره سوم جدول تناوبی، یون‌های فسفید (P^{3-})، سولفید (S^{2-}) و کلرید (Cl^{-}) هستند. با پیمایش یک دوره از چپ به راست، شعاع آنیون‌ها کاهش پیدا می‌کند؛ بنابراین مقایسه شعاع این ۳ یون به صورت زیر است:



از طرفی با افزایش اندازه بار الکتریکی یون، چگالی بار آن افزایش پیدا می‌کند؛ بنابراین می‌توان گفت مقایسه چگالی بار این ۳ یون به صورت زیر است:




همان‌طور که مشخص است، در بین آنیون‌های دوره سوم جدول تناوبی، با افزایش شعاع، چگالی بار نیز افزایش پیدا می‌کند.

دریای الکترونی

بر اساس مدل دریای الکترونی، ساختار فلزها آرایش منظمی از کاتیون‌ها در سه بعد است که در فضای میان آن‌ها سست‌ترین الکترون‌های موجود در اتم، دریایی را ساخته‌اند و در آن آزادانه جابه‌جا می‌شوند. دریای الکترونی عاملی است که چیدمان کاتیون‌ها را در شبکه بلوری فلز حفظ می‌کند. از این مدل برای توجیه برخی ویژگی‌های فیزیکی فلزها از جمله رسانایی و چکش‌خواری استفاده می‌شود.

آنتالپی فروپاشی

به انرژی لازم برای فروپاشی شبکه بلوری یک مول جامد یونی در فشار ثابت و تبدیل آن به یون‌های گازی مجزا، آنتالپی فروپاشی شبکه گفته می‌شود. آنتالپی فروپاشی شبکه جامدهای یونی را در مقیاس کیلوژول بر مول گزارش می‌کنند. به عنوان مثال، معادله زیر، واکنش فروپاشی شبکه بلور سدیم کلرید جامد را نشان می‌دهد:



در این واکنش، یک ترکیب یونی جامد به یون‌های گازی تبدیل شده است. برای مقایسه آنتالپی فروپاشی شبکه بلور مواد یونی، ابتدا به مجموع قدر مطلق بار یون‌های ترکیب دقت می‌کنیم و سپس شعاع یون‌های تشکیل‌دهنده ترکیب را مقایسه می‌کنیم. هر چه مجموع قدر مطلق بار یون‌ها بیشتر باشد، آنتالپی فروپاشی شبکه نیز بیشتر است و هر چه شعاع یون‌های سازنده کمتر باشد، باز هم آنتالپی فروپاشی شبکه بیشتر خواهد بود.



۱۰۲- کدام یک از موارد زیر درست است؟

- الف - تنها دلیل کاربرد تیتانیم در موتور جت، مقاومت آن در برابر واکنش با سایر مواد است.
 - ب - تفاوت شمار الکترون‌های موجود در زیرلایه $3d$ دو فلز به کار رفته در آلیاژ نیتینول برابر ۶ است.
 - ج - اکسیدی از تیتانیم که کاتیون آن به آرایش گاز نجیب رسیده است، به عنوان رنگ‌دانه سفید کاربرد دارد.
 - د - اگر گرمای ویژه تیتانیم و فولاد برابر باشد، انرژی لازم برای ذوب فولاد در دمای اتاق، بیشتر از نمونه هم جرم تیتانیم است.
- (۱) «الف» و «ج» (۲) «الف» و «د» (۳) «ب» و «ج» (۴) «ب» و «د»

(متوسط - مفهومی - استاندارد ۵) - صفحه ۸۸ - ۱۲۰۳


پاسخ: گزینه ۳

عبارت‌های (ب) و (ج) درست هستند.

بررسی موارد:


الف) هنگامی که موتور جت کار می‌کند همه اجزای سازنده (ثابت و متحرک)، دمای بالایی دارند؛ بنابراین مهم‌ترین علت کاربرد این فلز در موتور جت، نقطه ذوب بالای آن است. علاوه بر این، تیتانیم چگالی کمی دارد و باعث می‌شود موتور جت سبک‌تر باشد.

پ) آلیاژ نیتینول از ترکیب دو فلز تیتانیم و نیکل تولید می‌شود. آرایش الکترونی این دو عنصر به صورت زیر است:



همان‌طور که مشخص است، تفاوت شمار الکترون‌های موجود در زیرلایه $3d$ این دو عنصر برابر ۶ است.

از ترکیب یونی TiO_2 به عنوان رنگ دانه سفید در صنعت استفاده می شود. آرایش الکترونی یون تیتانیوم (IV) در این ترکیب یونی به صورت زیر است:



همان طور که مشخص است، آرایش الکترونی این یون همانند گاز نجیب قبل از خود یعنی آرگون است.

دمای ذوب یک نمونه از تیتانیوم بالاتر از یک نمونه فولاد است؛ بنابراین اگر گرمای ویژه این دو نمونه فلزی برابر باشد، برای ذوب نمونه تیتانیوم نیاز به مصرف انرژی بیشتری داریم. جدول زیر مقایسه ای از ویژگی های فولاد و تیتانیوم را نشان می دهد:

ویژگی	تیتانیوم	فولاد
نقطه ذوب ($^{\circ}C$)	بالتر (۱۶۶۷)	پایین تر (۱۵۳۵)
چگالی ($g \cdot mL^{-1}$)	کم تر (۴/۵۱)	بالتر (۷/۹۰)
واکنش با ذرات موجود در آب دریا	ناچیز	متوسط
مقاومت در برابر خوردگی	عالی	ضعیف
مقاومت در برابر سایش	عالی	عالی

رنگ دانه ها

جزء سازنده اصلی یک ماده رنگی که به آن رنگ می بخشد، رنگ دانه نام دارد. در واقع، رنگ دانه های موجود در یک ماده با جذب یا بازتاب برخی از پرتوهای مرئی، سبب ایجاد رنگ های مختلف می شوند. به عنوان مثال، رنگ سبز درختان و رنگ سرخ گل رز به خاطر وجود رنگ دانه ها است. تیتانیوم (IV) اکسید، آهن (III) اکسید و دوده، از جمله رنگ دانه های معدنی هستند که به ترتیب رنگ های سفید، قرمز و سیاه را ایجاد می کنند. انسان های گذشته این مواد را از منابع طبیعی همچون گیاهان، جانوران و برخی از کانی ها تهیه می کردند.




۱۰۳- کدام یک از گزینه های زیر نادرست است؟

- در خودروهای دیزلی، از آمونیاک به عنوان کاتالیزگر واکنش حذف اکسیدهای نیتروژن استفاده می شود.
- با استفاده از کاتالیزگر مناسب در یک واکنش، مقدار تبادل گرما در یک بازه زمانی افزایش پیدا می کند.
- در خودروهای دارای مبدل کاتالیستی، حذف نیتروژن مونوکسید سخت تر از کربن مونوکسید انجام می شود.
- با به کار بردن کاتالیزگر در یک واکنش، اختلاف سطح انرژی مواد واکنش دهنده و قله انرژی کاهش پیدا می کند.


پاسخ: گزینه ۱

(متوسط - مفهومی - سریع - صفحه ۱۰۲ - ۱۲۰۴)

با استفاده از مبدل کاتالیستی می توان از ورود آلاینده های تولید شده در خودروهای بنزینی به هواکره جلوگیری کرد. بررسی ها نشان می دهد که با استفاده از این نوع مبدل ها نمی توان گازهای NO و NO_2 خروجی از خودروهای دیزلی را به گاز نیتروژن تبدیل کرد. در این مبدل با ورود آمونیاک و انجام واکنش زیر، گازهای NO و NO_2 به گاز N_2 تبدیل شده و تا حدود زیادی از ورود گازهای NO و NO_2 به هواکره جلوگیری می شود.



همان طور که مشخص است، آمونیاک از جمله واکنش دهنده های این واکنش است. این در حالی است که کاتالیزگرها سرعت انجام واکنش های شیمیایی را افزایش داده و در پایان به صورت مصرف نشده باقی می مانند. واکنش های انجام شده در این مبدل ها به صورت زیر است:



بررسی سایر گزینه‌ها:




- ۲) کاتالیزورها سرعت انجام واکنش و تبادل انرژی در واکنش‌های شیمیایی را افزایش می‌دهند؛ بنابراین مقدار تبادل گرما در یک بازه زمانی افزایش پیدا می‌کند. البته توجه داریم که مقدار نهایی گرمای تولید شده در واکنش، دچار هیچ تغییری نمی‌شود.
- ۳) انرژی فعال‌سازی حذف نیتروژن مونوکسید، بیشتر از انرژی فعال‌سازی حذف کربن مونوکسید است؛ بنابراین انرژی اولیه لازم برای حذف نیتروژن مونوکسید بیشتر از انرژی لازم برای حذف کربن مونوکسید است.
- ۴) کاتالیزورها با کاهش فاصله انرژی واکنش‌دهنده‌ها و قله انرژی، سرعت انجام واکنش‌ها را افزایش داده و در پایان دست‌نخورده باقی می‌مانند. توجه داریم که کاتالیزورها بر آنتالپی واکنش، تفاوت انرژی واکنش‌دهنده‌ها و فراورده‌ها و انرژی هر یک از این مواد تأثیری ندارند.

 کاتالیزورها

- کاتالیزورها موادی هستند که سرعت انجام واکنش‌ها را افزایش می‌دهند. این مواد در واکنش شرکت کرده و با تغییر مسیر انجام واکنش، موجب کاهش انرژی فعال‌سازی و به دنبال آن افزایش سرعت واکنش می‌شوند. اگر چه کاتالیزورها ابتدا در واکنش شرکت می‌کنند، اما دوباره تولید شده و مقدار آن‌ها عملاً در طول مراحل انجام شدن واکنش ثابت باقی می‌ماند. بر این اساس، کاتالیزورها می‌توانند در واکنش مورد نظر بارها استفاده شوند. کاتالیزگر چندین ویژگی دارد:
- اغلب به صورت اختصاصی عمل می‌کند؛ یعنی تنها برای همان واکنش شیمیایی در نقش کاتالیزگر است و روی سایر واکنش‌ها تأثیری ندارد. البته کاتالیزگر یک واکنش، کاتالیزگر واکنش برگشت همان واکنش نیز خواهد بود.
 - در شرایط انجام واکنش، پایداری گرمایی و شیمیایی دارد و در حضور آن واکنش ناخواسته انجام نمی‌شود؛ یعنی کاتالیزگر در شرایط واکنش مصرف نمی‌شود.
 - کاتالیزگر بیشترین سطح انرژی مواد (مواد تشکیل شده در قله نمودار انرژی) را کاهش می‌دهد و به دنبال آن انرژی فعال‌سازی واکنش‌های رفت و برگشت کاهش و سرعت هر دو واکنش را افزایش می‌دهد.
 - کاتالیزگر بر آنتالپی واکنش، سطح انرژی واکنش‌دهنده‌ها و فراورده‌ها، مقدار نهایی فراورده تولید شده و مقدار ثابت تعادل واکنش تأثیری ندارد.

 مبدل کاتالیستی

مبدل کاتالیستی وسیله‌ای است که بر روی مسیر گاز خروجی از موتور خودرو قرار گرفته و باعث کاهش آلاینده‌ها می‌شود. در این قطعه کاتالیزگرهای واکنش‌های حذف آلاینده‌ها و تبدیل آن‌ها به مواد پایدارتر و بی‌خطر وجود دارند تا در مدت زمان کم و دمای پایین، مانع از ورود بخش عمده‌ای از این آلاینده‌ها به هوا شود. در مبدل کاتالیستی خودروهای بنزینی، کاتالیزگرها معادل با سه فلز رودیم (Rh)، پالادیم (Pd) و پلاتین (Pt) بوده که بر روی سطح سرامیک توری شکل قرار دارند. البته در این مبدل‌ها، برای افزایش کارایی می‌توان سرامیک را به صورت مش (دانه) در آورد تا سطح تماس آن با آلاینده‌ها افزایش یابد. واکنش‌های انجام‌شده در این قطعه به صورت زیر است:



هر سه واکنش مطرح‌شده گرماده بوده و به دلیل انرژی فعال‌سازی بالا، در دمای پایین و بدون حضور کاتالیزگر به کندی انجام می‌شوند. توجه داریم که کاتالیزگرهای موجود در مبدل‌های کاتالیستی، بارها و بارها در واکنش‌های مربوط به حذف آلاینده‌ها شرکت می‌کنند و مصرف نمی‌شوند؛ اما این کاتالیزگرها گاهی با برخی از مواد افزودنی موجود در سوخت‌ها وارد واکنش شده و کارایی خود را از دست می‌دهند. در این شرایط، کارایی مبدل کاتالیستی کاهش پیدا کرده و این مبدل دیگر قابل استفاده نیست.



۱۰۴- مقدار ۲۶ گرم گاز هیدروژن و ۲۵۲ گرم گاز نیتروژن را وارد یک مخزن ۴ لیتری می‌کنیم تا فرایند هابر انجام شود. اگر پس از ایجاد تعادل، گازی با نقطه جوش پایین‌تر، ۲۵ درصد حجم مخزن را شامل شود، ثابت تعادل واکنش کدام است؟

($N = 14, H = 1 : g.mol^{-1}$)

۴/۵ (۴)

۳ (۳)


۱/۵ (۲)

۶ (۱)

(متوسط - محاسباتی - استاندارد) - صفحه ۱۰۵ - ۱۲۰۴

پاسخ: گزینه ۲

معادله موازنه‌شده فرایند هابر به صورت زیر است:



مول اولیه گازهای نیتروژن و هیدروژن وارد شده به ظرف واکنش به ترتیب برابر با ۹ و ۱۳ است. فرض می‌کنیم تا رسیدن به تعادل، x مول از گاز نیتروژن مصرف شود. بر این اساس، داریم:

ماده	N_2	H_2	NH_3
مقدار اولیه (mol)	۹	۱۳	۰
تغییر مقدار (mol)	$-x$	$-3x$	$2x$
مقدار تعادلی (mol)	$9 - x$	$13 - 3x$	$2x$

همان‌طور که می‌دانیم، در بین این سه گاز، نقطه جوش هیدروژن از دو گاز دیگر پایین‌تر بوده و سخت‌تر میعان می‌شود. از طرفی در شرایط یکسان، درصد حجمی گازها معادل درصد مولی آن‌ها است؛ بنابراین داریم:

$$\text{درصد مولی گاز هیدروژن} = \frac{\text{مول گاز هیدروژن}}{\text{مول کل گازها}} \times 100 \Rightarrow 25 = \frac{13 - 3x}{22 - 2x} \times 100 \Rightarrow x = 3$$

بر این اساس داریم:

ماده	N_2	H_2	NH_3
مقدار تعادلی (mol)	۶	۴	۶


در پایان ثابت تعادل واکنش را به دست می‌آوریم:

$$K = \frac{[NH_3]^2}{[H_2]^3 \times [N_2]^1} = \frac{(n_{NH_3})^2}{(n_{H_2})^3 \cdot (n_{N_2})^1} \times V^{\Delta n} = \frac{6^2}{4^3 \times 6^1} \times 4^2 = 1/5 L^2 \cdot mol^{-2}$$

Δn = مجموع ضرایب گازی فراورده‌ها - مجموع ضرایب گازی واکنش‌دهنده‌ها

فرایند هابر

فرایند هابر روشی برای تولید آمونیاک از عناصر سازنده با استفاده از واکنش تعادلی زیر است:



این واکنش به علت انرژی فعال‌سازی زیاد، سرعت کمی داشته و برای انجام این واکنش باید دما را افزایش داد. در نقطه مقابل، با توجه به گرماده بودن واکنش، افزایش دما موجب کاهش پیشرفت واکنش و برگشت تعادل به سمت واکنش‌دهنده‌ها می‌شود؛ پس دمای واکنش را نمی‌توان بسیار بالا برد. به این منظور هابر از سه راهکار برای تولید به صرفه‌تر آمونیاک استفاده کرد:

۱) اضافه کردن کاتالیزگر: با اضافه شدن فلز آهن به محیط واکنش، مقدار E_a واکنش کاهش یافته و سرعت واکنش افزایش می‌یابد. توجه داریم که کاتالیزگر، هیچ تأثیری روی مقدار ثابت تعادل و درصد پیشرفت آن ندارد.

۲) افزایش فشار مخلوط واکنش: در این فرایند، فشار را افزایش می‌دهند. با توجه به شمار مولکول‌های گازی کمتر در سمت فراورده، افزایش فشار موجب رفتن تعادل به سمت واکنش رفت و افزایش پیشرفت واکنش در جهت تولید آمونیاک می‌شود. همچنین افزایش فشار سرعت انجام این واکنش را افزایش خواهد داد.

۳) خارج کردن آمونیاک از ظرف: پس از رسیدن به تعادل، مخلوط تعادلی از ظرف واکنش خارج و تا دمای $-40^\circ C$ سرد می‌شود. با توجه به نقطه جوش بیشتر آمونیاک نسبت به واکنش‌دهنده‌ها، آمونیاک زودتر از دو ماده دیگر به حالت مایع درآمده و از مخلوط جدا می‌شود. همچنین گاز باقی‌مانده که شامل گاز نیتروژن و هیدروژن است، مجدداً به ظرف بازگردانده می‌شود.

• با توجه به توضیحات داده شده، شرایط بهینه تولید آمونیاک در فرایند هابر معادل با دمای $450^\circ C$ ، فشار ۲۰۰ اتمسفر و حضور فلز آهن به عنوان کاتالیزگر است. در این شرایط نیز پیشرفت واکنش کمتر از ۱۰۰ درصد بوده (به تقریب ۴۴ درصد) و درصد حجمی (درصد مولی) آمونیاک در مخلوط گازی تعادل ۲۸ درصد است.

ثابت تعادل

رابطه مربوط به محاسبه مقدار ثابت تعادل واکنش $aA(g) + bB(g) \rightarrow cC(g) + dD(g)$ برابر است با:

$$K = \frac{[C]^c [D]^d}{[A]^a [B]^b}$$

اگر به جای غلظت‌ها، بخواهیم از مقدار مواد موجود در واکنش استفاده کنیم، رابطه زیر را به کار می‌بریم:

$$K = \frac{(n_C)^c \times (n_D)^d}{(n_A)^a \times (n_B)^b} \times V^{(a+b)-(c+d)}$$

در واقع در رابطه بالا، توان حجم ظرف واکنش (V) برابر مجموع ضرایب مواد گازی یا محلول در واکنش‌دهنده‌ها منهای مجموع ضرایب مواد گازی یا محلول در سمت فراورده‌ها است.



۱۰۵- کدام یک از عبارات‌های زیر درست است؟

الف - تولید پرک، مرحله‌ای از بازیافت شیمیایی پلی‌اتیلن ترفتالات است.

ب - یکی از مواد واکنش‌دهنده تولید دی‌اسید و دی‌الکل سازنده پلی‌اتیلن ترفتالات، یکسان است.

ج - برای تولید متانول در روش غیرمستقیم، از اکسید پایدارتر کربن به‌عنوان واکنش‌دهنده استفاده می‌شود.

د - با تبدیل پارازایلن به مونومر استفاده شده در تولید PET، میانگین عدد اکسایش اتم‌های کربن افزایش پیدا می‌کند.

(۱) «الف» و «ج» (۲) «الف» و «د» (۳) «ب» و «ج» (۴) «ب» و «د»

(متوسط - مفهومی - استاندارد ۱ - صفحه ۱۲۱ - ۱۲۰۴)

پاسخ: گزینه ۴

عبارات‌های (ب) و (د) درست هستند.

بررسی موارد:

الف) یکی از راه‌های بازیافت فیزیکی مواد پلاستیکی این است که آن‌ها را پس از شست‌وشو و تمیز کردن، ذوب کرده و دوباره از آن‌ها برای تولید وسایل و ابزار دیگر استفاده می‌کنند. البته پس از شست‌وشوی مواد پلاستیکی می‌توان آن‌ها را خرد کرده و به تکه‌های کوچک به نام پرک تبدیل و در تولید مواد پلاستیکی دیگر استفاده کرد. توجه داریم که تبدیل مواد پلاستیکی به پرک از جمله روش‌های فیزیکی بازیافت به‌شمار می‌رود.


پ) اکسنده استفاده شده برای تولید دی‌اسید (ترفتالیک اسید) و دی‌الکل (اتیلن گلیکول) سازنده پلی‌اتیلن ترفتالات، پتاسیم پرمنگنات است. توجه داریم که شرایط تولید اتیلن گلیکول در مقایسه با شرایط تولید ترفتالیک اسید راحت‌تر بوده و با غلظت پایین‌تر اکسنده و بازده بالاتر انجام می‌شود.

ج) برای تولید متانول از روش غیر مستقیم، از کربن مونوکسید به‌عنوان واکنش‌دهنده استفاده می‌شود. توجه داریم که کربن مونوکسید، اکسید ناپایدارتر کربن بوده و منظور از اکسید پایدارتر کربن، همان کربن دی‌اکسید است.


د) با تبدیل پارازایلن به ترفتالیک اسید، عدد اکسایش دو اتم کربن موجود در ساختار آن، از ۳- به ۳+ تغییر پیدا می‌کند؛ بنابراین می‌توان گفت مجموع عدد اکسایش اتم‌های کربن و در نتیجه میانگین عدد اکسایش آن‌ها نیز افزایش پیدا می‌کند.

متانول

متانول ساده‌ترین عضو خانواده الکل‌ها است. این ماده، مایعی بی‌رنگ و بی‌بو بوده و بسیار سمی و کشنده است. این ماده را می‌توان از تخمیر چوب تهیه کرد. در صنعت این ماده را از واکنش میان گازهای کربن مونوکسید و هیدروژن در حضور کاتالیزگر تولید می‌کنند:




کربن مونوکسید و هیدروژن مصرف‌شده در این واکنش را می‌توان از واکنش گاز متان و بخار آب در حضور کاتالیزگر به‌دست آورد:



دو فرایند بالا در مجموع موجب تولید متانول از گاز متان به شیوه غیرمستقیم خواهند شد. در این فرایند ابتدا واکنشی میان گاز متان و بخار آب در دمای حدود $450 - 550^\circ C$ انجام خواهد شد و موجب تولید گازهای CO و H_2 می‌شود. در نهایت این دو گاز در دمای $350^\circ C$ و فشار ۳۰ تا ۵۰ اتمسفر با یکدیگر واکنش می‌دهند و متانول تولید می‌کنند. در این فرایند، $\frac{1}{3}$ گاز هیدروژن تولیدشده در مرحله اول، در مرحله دوم مصرف نمی‌شود و به‌عنوان فراورده جانبی این روش در نظر گرفته می‌شود. با توجه به هزینه‌بر بودن تأمین شرایط انجام این واکنش‌ها و همچنین تولید گاز CO در این فرایند، شیمی‌دان‌ها در حال


پژوهش بر روش تولید متانول از گاز متان به شیوه مستقیم هستند. در این روش با واکنش میان گاز متان و اکسیژن در حضور کاتالیزگر، متانول بدون واسطه تولید می‌شود. معادله این واکنش شیمیایی به صورت زیر است:



منابع تأمین متان در این دو روش، گاز مشعل، گاز طبیعی و زیست‌گاز خواهد بود.

تولید ترفتالیک اسید

فرایند اکسایش پارازایلن به ترفتالیک اسید **دشوار** بوده و با وجود غلظت بالای یون پرمنگنات در محلول، تنها با **افزایش** دمای مخلوط واکنش، شرایط تبدیل **پارازایلن** به **ترفتالیک اسید** تأمین می‌شود؛ بنابراین انرژی فعال‌سازی این واکنش **بالا** است. توجه داریم که در این واکنش، یون MnO_4^- به MnO_2 تبدیل شده و عدد اکسایش منگنز از $+7$ به $+4$ کاهش می‌یابد. معادله واکنش انجام شده به صورت زیر است:




همان‌طور که مشخص است، طی این فرایند عدد اکسایش دو اتم کربن از -3 به $+3$ رسیده است. بر این اساس، می‌توان گفت در این واکنش، عدد اکسایش هر یک از اتم‌های کربن به اندازه ۶ واحد (مجموعاً به اندازه ۱۲ واحد برای ۲ اتم کربن) افزایش پیدا کرده است. پارازایلن یک هیدروکربن حلقوی سیرنشده و آروماتیک با فرمول شیمیایی C_8H_{10} است که از **تقطیر نفت خام** به دست می‌آید.



برای مطالعه بیشتر، این چند تا تست اضافه رو هم براتون گذاشتیم که علاوه بر آزمون، یک محک دوباره برای خودتون باشه!

۱- اگر در واکنش ۱۰۲ گرم از فلئورید فلز A با مقدار کافی سود سوزآور محلول در آب طبق معادله موازنه نشده زیر، ۱۲۶ گرم ماده محلول در آب تولید شود، عنصر A معادل کدام یک از فلزهای زیر می تواند باشد؟

($Fe = ۵۶, Sc = ۴۵, Ca = ۴۰, Mg = ۲۴, Na = ۲۳, F = ۱۹, O = ۱۶, H = ۱ : g.mol^{-1}$)



(۱) آهن (۲) منیزیم (۳) کلسیم (۴) اسکاندیم

۲- جرم برابر از نخستین و دومین عضو خانواده آلکان ها را در اختیار داریم. اگر با سوزاندن آن ها در شرایط استاندارد، اختلاف حجم گازهای تولید شده در دو واکنش برابر ۲۲/۴ لیتر باشد، مجموع جرم گاز اکسیژن مصرف شده در این دو واکنش، برابر چند گرم بوده است؟ ($O = ۱۶, C = ۱۲, H = ۱ : g.mol^{-1}$)

(۱) ۲۲۰۴ (۲) ۱۴۶۸ (۳) ۱۸۵۶ (۴) ۱۱۳۲

۳- ۶۰۰ میلی لیتر محلول ۲ مولار لیتیم سولفات، ۸۰۰ میلی لیتر محلول لیتیم فلئورید ($d = ۱/۰۴ g.mL^{-1}$) و مقداری آب، مخلوط شده و یک محلول ۲/۵ لیتری به دست می آید. اگر غلظت یون لیتیم در محلول ایجاد شده ۱/۶ مولار باشد، درصد جرمی لیتیم فلئورید در محلول اولیه کدام بوده و با استفاده از ۸/۹۶ لیتر گاز فلئور در شرایط استاندارد، نمک موجود در چند لیتر از این محلول تهیه می شود؟

($S = ۳۲, F = ۱۹, O = ۱۶, Li = ۷ : g.mol^{-1}$)

(۱) ۰/۴ - ۵ (۲) ۰/۲ - ۱۰ (۳) ۰/۲ - ۵ (۴) ۰/۴ - ۱۰

۴- کدام یک از عبارتهای زیر درست است؟ ($O = ۱۶, C = ۱۲ : g.mol^{-1}$)

(۱) در جرم برابر از پلی اتن سنگین و سبک، شمار اتمهای کربن در پلی اتن سنگین بیشتر است.

(۲) مونومر به کار رفته در تولید نوعی از پلاستیکهای سبز، سیر شده بوده و فاقد پیوند دوگانه است.

(۳) به دلیل بیشتر بودن جرم مولی پروپن در مقایسه با اتن، جرم مولی پلی پروپن نیز به یقین بیشتر از پلی اتن است.

(۴) در ساختار مولکولی پلی پروپن، برخلاف پلی اتن سنگین، برخی از اتمهای کربن به ۳ اتم هیدروژن متصل شده اند.

۵- محلولی از سود به حجم ۳ لیتر در اختیار داریم. در ابتدا، ۸ گرم هیدروفلئوریک اسید و سپس ۲۷ گرم دی نیتروژن پنتاکسید به این محلول آبی می افزاییم. اگر پس از اضافه کردن این مواد، یک محلول خنثی به دست بیاید، مقدار تغییر pH محلول در

این فرایند برابر با چند واحد بوده است؟ ($Na = ۲۳, F = ۱۹, O = ۱۶, N = ۱۴, H = ۱ : g.mol^{-1}$)

(۱) ۴/۵ (۲) ۵ (۳) ۷ (۴) ۶/۵


محل انجام محاسبات



برای مطالعه بیشتر، این چند تا تست اضافه رو هم براتون گذاشتیم که علاوه بر آزمون، یک محک دوباره برای خودتون باشه!

۱- اگر در واکنش ۱۰۲ گرم از فلئورید فلز A با مقدار کافی سود سوزآور محلول در آب طبق معادله موازنه نشده زیر، ۱۲۶ گرم ماده محلول در آب تولید شود، عنصر A معادل کدام یک از فلزهای زیر می تواند باشد؟

($Fe = ۵۶, Sc = ۴۵, Ca = ۴۰, Mg = ۲۴, Na = ۲۳, F = ۱۹, O = ۱۶, H = ۱ : g.mol^{-1}$)



(۴) اسکاندیم

(۳) کلسیم


(۲) منیزیم

(۱) آهن

(سخت - محاسباتی - استاندارد) - صفحه ۸۰ - ۱۰۰۲

پاسخ: گزینه ۴

معادله موازنه شده واکنش انجام شده به صورت زیر است:



برای حل سؤال، ابتدا جرم مولی عنصر مجهول را برابر a فرض کرده و با استفاده از روابط استوکیومتری، نسبت جرم مولی این فلز به ظرفیت آن (n) را محاسبه می کنیم. در این رابطه، داریم:

$$۱۲۶ g NaF = ۱۰۲ g AF_n \times \frac{۱ mol AF_n}{(a + ۱۹n)g AF_n} \times \frac{n mol NaF}{۱ mol AF_n} \times \frac{۴۲ g NaF}{۱ mol NaF}$$

$$\Rightarrow ۱۲۶ \times (a + ۱۹n) = ۴۲۸۴n \Rightarrow ۱۲۶a = ۱۸۹۰n \Rightarrow a = ۱۵n$$

برای حل این سؤال از روش تناسب نیز داریم:

$$\frac{AF_n \text{ جرم}}{\text{ضریب} \times \text{جرم مولی}} = \frac{NaF \text{ جرم}}{\text{ضریب} \times \text{جرم مولی}} \Rightarrow \frac{۱۰۲}{(a + ۱۹n) \times ۱} = \frac{۱۲۶}{۴۲ \times n} \Rightarrow a = ۱۵n$$

با توجه به محاسبات انجام شده، جرم مولی فلز مورد نظر، ۱۵ برابر ظرفیت آن است. این ویژگی صرفاً برای اسکاندیم صدق می کند. اسکاندیم نخستین عنصر واسطه جدول تناوبی بوده و در ترکیب های شیمیایی به صورت یون Sc^{3+} حضور پیدا می کند. جرم مولی این عنصر نیز برابر با ۴۵ گرم بر مول است. توجه داریم که برای حل این سؤال می توان از روش امتحان کردن گزینه ها نیز استفاده کرد.



۲- جرم برابر از نخستین و دومین عضو خانواده آلکان ها را در اختیار داریم. اگر با سوزاندن آن ها در شرایط استاندارد، اختلاف حجم گازهای تولید شده در دو واکنش برابر ۲۲/۴ لیتر باشد، مجموع جرم گاز اکسیژن مصرف شده در این دو واکنش، برابر چند گرم بوده است؟ ($O = ۱۶, C = ۱۲, H = ۱ : g.mol^{-1}$)

(۴) ۱۱۳۲

(۳) ۱۸۵۶



(۲) ۱۴۶۸

(۱) ۲۲۰۴

(سخت - محاسباتی - زمان بر) - صفحه ۸۰ - ۱۱۰۱

پاسخ: گزینه ۳

نخستین و دومین آلکان، به ترتیب معادل متان (CH_4) و اتان (C_2H_6) هستند. معادله موازنه شده سوختن این دو ترکیب مولکولی در شرایط استاندارد به صورت زیر است:



توجه داریم که در شرایط استاندارد، مولکول های آب به حالت مایع تولید شده و تنها گاز حاصل از واکنش، کربن دی اکسید است. در شرایط استاندارد، حجم هر مول گاز برابر ۲۲/۴ لیتر است؛ بنابراین می توان گفت اختلاف مول گاز کربن دی اکسید تولید شده در این دو واکنش برابر ۱ مول بوده است.

حال جرم هر یک از گازهای متان و اتان مصرف شده را برابر x فرض کرده و مول گاز کربن دی اکسید تولید شده را محاسبه می کنیم:

$$CH_4 : ? \text{ mol } CO_2 = x \text{ g } CH_4 \times \frac{1 \text{ mol } CH_4}{16 \text{ g } CH_4} \times \frac{1 \text{ mol } CO_2}{1 \text{ mol } CH_4} = \frac{x}{16} \text{ mol}$$

$$C_2H_6 : ? \text{ mol } CO_2 = x \text{ g } C_2H_6 \times \frac{1 \text{ mol } C_2H_6}{30 \text{ g } C_2H_6} \times \frac{4 \text{ mol } CO_2}{2 \text{ mol } C_2H_6} = \frac{x}{15} \text{ mol}$$

در مرحله بعد با استفاده از اختلاف مول گازهای تولید شده، جرم متان و اتان را محاسبه می کنیم:

$$C_2H_6 : ? \text{ g } CO_2 = x \text{ g } C_2H_6 \times \frac{1 \text{ mol } C_2H_6}{30 \text{ g } C_2H_6} \times \frac{4 \text{ mol } CO_2}{2 \text{ mol } C_2H_6} = \frac{x}{15} \text{ g}$$

با توجه به محاسبات انجام شده، مجموع جرم گاز اکسیژن مصرف شده در دو واکنش برابر ۱۸۵۶ گرم است.

$$CH_4 : ? \text{ g } O_2 = 240 \text{ g } CH_4 \times \frac{1 \text{ mol } CH_4}{16 \text{ g } CH_4} \times \frac{2 \text{ mol } O_2}{1 \text{ mol } CH_4} \times \frac{32 \text{ g } O_2}{1 \text{ mol } O_2} = 960 \text{ g}$$

$$C_2H_6 : ? \text{ g } O_2 = 240 \text{ g } C_2H_6 \times \frac{1 \text{ mol } C_2H_6}{30 \text{ g } C_2H_6} \times \frac{7 \text{ mol } O_2}{2 \text{ mol } C_2H_6} \times \frac{32 \text{ g } O_2}{1 \text{ mol } O_2} = 896 \text{ g}$$

با توجه به محاسبات انجام شده، مجموع جرم گاز اکسیژن مصرف شده در دو واکنش برابر ۱۸۵۶ گرم است.



جدول زیر جمع بندی ویژگی های متان را نمایش می دهد:



۳- ۶۰۰ میلی لیتر محلول ۲ مولار لیتیم سولفات، ۸۰۰ میلی لیتر محلول لیتیم فلوئورید ($d = 1/04 \text{ g.mL}^{-1}$) و مقداری آب، مخلوط شده و یک محلول ۲/۵ لیتری به دست می آید. اگر غلظت یون لیتیم در محلول ایجاد شده ۱/۶ مولار باشد، درصد جرمی لیتیم فلوئورید در محلول اولیه کدام بوده و با استفاده از ۸/۹۶ لیتر گاز فلوئور در شرایط استاندارد، نمک موجود در چند لیتر از این محلول تهیه می شود؟

$$(S = 32, F = 19, O = 16, Li = 7 : \text{g.mol}^{-1})$$

$$0/4 - 10 \quad (4)$$

$$0/2 - 5 \quad (3)$$

$$0/2 - 10 \quad (2)$$

$$0/4 - 5 \quad (1)$$

(سخت - محاسباتی - زمان بر - صفحه ۱۰۰ - ۱۰۰۳)

پاسخ: گزینه ۱

از تقسیم کردن مول یک ماده به حجم محلول، غلظت مولار حاصل می شود. برای حل این سؤال ابتدا با توجه به حجم محلول پایانی، مقدار مول یون لیتیم حل شده در آن را محاسبه می کنیم:

$$\text{مول} = \frac{\text{حجم}}{\text{غلظت}} \Rightarrow \text{مول} = \text{حجم} \times \text{غلظت} = 1/6 \times 2/5 = 4 \text{ mol}$$

در مرحله بعد مقدار یون لیتیم موجود در محلول حاوی لیتیم سولفات (Li_2SO_4) را به دست می آوریم. توجه داریم که مقدار یون لیتیم موجود در محلول نهایی حاصل جمع مقدار یون لیتیم موجود در محلول های حاوی لیتیم سولفات و لیتیم فلوئورید است. داریم:

$$Li_2SO_4 \text{ محلول} : \text{غلظت} = \frac{\text{مول}}{\text{حجم}} \Rightarrow \text{مول} = \text{حجم} \times \text{غلظت} = 2 \times 0.6 = 1.2 \text{ mol}$$

با توجه به محاسبات انجام شده، در محلول لیتیم سولفات، 1.2 مول از این ترکیب یونی حضور دارد. هر واحد از نمک لیتیم سولفات (Li_2SO_4)، 2 یون لیتیم در محلول آزاد می کند؛ بنابراین می توان گفت در این محلول 2.4 مول یون لیتیم حضور دارد. در این حالت، داریم:

$$\text{یون لیتیم موجود در محلول } LiF + \text{یون لیتیم موجود در محلول } Li_2SO_4 = \text{یون لیتیم موجود در محلول نهایی}$$

$$4 = 2.4 + x \Rightarrow x = 4 - 2.4$$

تا به اینجا کار متوجه شدیم که محلول لیتیم فلوئورید حاوی 1.6 مول یون لیتیم بوده است. حال می توانیم غلظت مولار این محلول را محاسبه کنیم:


$$\text{غلظت} = \frac{\text{مول}}{\text{حجم}} = \frac{1.6}{0.8} = 2 \text{ mol.L}^{-1}$$

در مرحله بعد با استفاده از فرمول زیر، درصد جرمی لیتیم فلوئورید حل شده را به دست می آوریم:

$$M_p = \frac{10 \times \overbrace{a}^{\text{درصد جرمی}} \times \overbrace{d}^{\text{چگالی محلول}}}{\text{جرم مولی}} \Rightarrow 2 = \frac{10 \times \text{درصد جرمی} \times 1.04}{26} \Rightarrow \text{درصد جرمی} = 5$$

غلظت مولار

معادله موازنه شده تولید لیتیم فلوئورید از گاز فلوئور و فلز لیتیم به صورت زیر است:



در پایان حجم محلول لیتیم فلوئورید تولید شده به ازای مصرف $8/96$ لیتر گاز فلوئور را محاسبه می کنیم. داریم:

$$? L \text{ محلول} = 8/96 L \text{ گاز} \times \frac{1 \text{ mol گاز}}{22.4 L \text{ گاز}} \times \frac{2 \text{ mol LiF}}{1 \text{ mol } F_2} \times \frac{1 L \text{ محلول}}{2 \text{ mol LiF}} = 0.4 L$$




۴- کدام یک از عبارات زیر درست است؟ ($0 = 16, C = 12 : g.mol^{-1}$)

- (۱) در جرم برابر از پلی اتن سنگین و سبک، شمار اتم های کربن در پلی اتن سنگین بیشتر است.
- (۲) مونومر به کار رفته در تولید نوعی از پلاستیک های سبز، سیر شده بوده و فاقد پیوند دوگانه است.
- (۳) به دلیل بیشتر بودن جرم مولی پروپن در مقایسه با اتن، جرم مولی پلی پروپن نیز به یقین بیشتر از پلی اتن است.
- (۴) در ساختار مولکولی پلی پروپن، برخلاف پلی اتن سنگین، برخی از اتم های کربن به ۳ اتم هیدروژن متصل شده اند.

(متوسط - مفهومی - استاندارد) - صفحه ۱۲۱ - ۱۱۰۳

پاسخ: گزینه ۴


پلی پروپن نوعی پلیمر افزایشی است که از به هم پیوستن مولکول های پروپن با فرمول شیمیایی C_3H_6 به یکدیگر حاصل می شود. واکنش تولید پلی پروپن به صورت زیر است:




ساختار مولکولی پلی پروپن نیز به صورت زیر است:



همان طور که مشخص است، برخی از اتم های کربن موجود در پلی پروپن، در قالب گروه های متیل قرار داشته و بر این اساس، با ۳ اتم هیدروژن پیوند اشتراکی (کووالانسی) برقرار کرده اند. پلی اتن نیز از متصل شدن مولکول های اتن به یکدیگر تولید می شود. واکنش تولید پلی اتن به صورت زیر است:



ساختار پلی اتن سنگین به صورت زیر است:




همان‌طور که مشخص است، هرکدام از اتم‌های کربن موجود در ساختار پلی‌اتن، تنها به ۲ اتم هیدروژن متصل شده‌اند. البته، در دو انتهای زنجیره هر پلیمر ممکن است اتم‌های کربنی یافت شوند که به سه اتم هیدروژن متصل شده‌اند اما چون زنجیره پلیمر بسیار بلند است به‌طور کلی، از این اتم‌های کربن می‌توان صرف نظر کرد.

بررسی سایر گزینه‌ها:

فرمول شیمیایی پلی اتن سنگین و سبک به صورت $(C_2H_4)_n$ نمایش داده می‌شود. اگر جرم این دو نوع پلیمر با یکدیگر برابر باشد، شمار مونومرهای موجود در این دو ترکیب و در نتیجه شمار اتم‌های کربن و هیدروژن آن‌ها برابر خواهد بود. مقایسه ویژگی‌های پلی اتن سنگین و سبک به صورت زیر است:

ویژگی	پلی اتن سبک	پلی اتن سنگین
چگالی	کمتر	بیشتر
ساختار	شاخه دار	بدون شاخه
نیروی بین مولکولی	وان دروالسی - ضعیف تر	وان دروالسی - قوی تر
استحکام	کمتر	بیشتر
نقطه جوش	پایین تر	بالا تر
ظاهر	شفاف	کدر
کاربرد	تولید کیسه های پلاستیکی	لوله های پلاستیکی، دبه های آب و بطری

مونومر به کاررفته در ساخت برخی از انواع پلاستیک‌های سبز، لاکتیک اسید است. این مونومر در ساختار خود گروه‌های عاملی کربوکسیل و الکلی دارد و به وجود گروه عاملی کربوکسیل، از روی نام این ماده نیز می‌توانیم پی ببریم. ساختار این ماده و پلیمر حاصل از آن به صورت زیر است:



مولکول‌های لاکتیک اسید

یلے لاکتیک اسید

توجه داریم که در ساختار گروه عاملی، کربوکسیل، پیوند دوگانه کربن-اکسیژن حضور دارد.


برای مقایسه جرم دو پلیمر، باید شمار مونومرهای تشکیل دهنده و جرم مولی مونومرها را با یکدیگر مقایسه کنیم. مونومر پلی پروپین در مقایسه با مونومر پلی اتن، جرم مولی بیشتری دارد اما بدون داشتن شمار مونومرهای شرکت کننده در واکنش پلیمری شدن، نمی توان جرم مولی پلیمرهای حاصل را با یکدیگر مقایسه کرد.

جدول زیر مونومر و کاربردهای برخی پلیمرهای افزایشی را نمایش می‌دهد:

نام پلیمر	نام مونومر	کاربرد
پلی‌اتن	اتن	کیسه‌های پلاستیکی - بطری پلاستیکی - لوله پلاستیکی
پلی‌سیانواتن	سیانواتن	پتو و پارچه
پلی‌پروپن	پروپن	تهیه و تولید سرنگ
پلی‌استیرن	استیرن	تولید ظرف یکبار مصرف
تفلون	تترافلوئورواتن	نخ دندان - کفی اتو - تولید ظروف نجسب
پلی‌وینیل کلرید	وینیل کلرید (کلرواتن)	کیسه‌های خون

انواع واکنش پلیمری شدن

اگر در زنجیره هیدروکربنی یک ترکیب آلی پیوند دوگانه وجود داشته باشد، آن ترکیب می‌تواند در واکنش پلیمری شدن شرکت کند. به این نوع واکنش، پلیمری شدن افزایشی گفته می‌شود؛ چراکه تمامی اتم‌های موجود در واکنش‌دهنده، به فراورده هدف منتقل شده و فراورده جانبی تولید نمی‌شود. پلیمرهای افزایشی اغلب تحت فشار و گرما تشکیل می‌شوند. تولید پلیمرهایی مانند پلی‌اتن، پلی‌پروپن، پلی‌استیرن، تفلون و ... از جمله این واکنش‌ها است. تصویر زیر، نمای کلی از این واکنش را نشان می‌دهد:



واکنش تولید شدن انواعی از پلیمرها (پلی‌استرها و پلی‌آمیدها) نیز با تولید فراورده جانبی همراه بوده و شماری از اتم‌های مواد واکنش‌دهنده‌ها، در ساختار فراورده جانبی (آب) قرار می‌گیرند.

پلیمر سبز

شیمی‌دان‌ها با انجام پژوهش‌های گسترده، موفق به ساخت دسته‌ای از پلیمرها شدند که توسط جانداران ذره‌بینی تجزیه می‌شوند. هرگاه این پلیمرها و کالاهای ساخته شده از آن‌ها در طبیعت رها شوند، پس از چند ماه به مولکول‌های ساده مانند آب و کربن‌دی‌اکسید تبدیل می‌شوند. چنین پلیمرهایی دوست‌دار محیط زیست بوده و به پلیمرهای سبز معروف هستند. این پلیمرها را از فراورده‌های کشاورزی مانند سیب‌زمینی، ذرت و نیل‌شکر تهیه می‌کنند، به‌طوری‌که نخست نشاسته موجود در این مواد را به لاکتیک اسید تبدیل کرده، سپس از واکنش پلیمری شدن آن در شرایط مناسب، پلی‌لاکتیک اسید تولید می‌کنند.



- ۵- محلولی از سود به حجم ۳ لیتر در اختیار داریم. در ابتدا، ۸ گرم هیدروفلوئوریک اسید و سپس ۲۷ گرم دی‌نیتروژن پنتاکسید به این محلول آبی می‌افزاییم. اگر پس از اضافه کردن این مواد، یک محلول خنثی به‌دست بیاید، مقدار تغییر pH محلول در این فرایند برابر با چند واحد بوده است؟ ($Na = 23, F = 19, O = 16, N = 14, H = 1 : g.mol^{-1}$)
- ۴/۵ (۱) ۵ (۲) ۷ (۳) ۶/۵ (۴)


(سخت - محاسباتی - زمان‌بر ۵ - صفحه ۲۵ - ۱۲۰۱)

پاسخ: گزینه ۴

یکی از واکنش‌های اسیدها و بازها، واکنش خنثی شدن است. به‌طور کلی، معادله این واکنش را می‌توان به‌صورت زیر نمایش داد:

$$H^+(aq) + OH^-(aq) \rightarrow H_2O(l)$$


معادله موازنه شده واکنش سدیم هیدروکسید و هیدروفلوئوریک اسید به‌صورت زیر است:




حال مول سدیم هیدروکسید مصرف شده در این واکنش را محاسبه می‌کنیم:

$$? \text{ mol NaOH} = 8 \text{ g HF} \times \frac{1 \text{ mol HF}}{20 \text{ g HF}} \times \frac{1 \text{ mol NaOH}}{1 \text{ mol HF}} = 0.4 \text{ mol}$$

دی‌نیتروژن پنتاکسید، از جمله اسیدهای دو عاملی بوده و با حل شدن در آب، به‌صورت زیر با آب واکنش می‌دهد:



معادله واکنش نیتریک اسید تولید شده در این واکنش و سدیم هیدروکسید به‌صورت زیر است:



برای هم‌ارزی دو معادله، می‌توانیم واکنش دوم را در ۲ ضرب کنیم تا ضریب نیتریک اسید به‌عنوان ماده مشترک در دو معادله، یکسان شود؛ بنابراین داریم:



در واقع، هر مول دی‌نیتروژن پنتاکسید می‌تواند ۲ مول سدیم هیدروکسید موجود در محلول را خنثی کند. در مرحله بعد مول سدیم هیدروکسید مصرف شده در این واکنش را به‌دست می‌آوریم:

$$? \text{ mol NaOH} = 27 \text{ g } N_2O_5 \times \frac{1 \text{ mol } N_2O_5}{108 \text{ g } N_2O_5} \times \frac{2 \text{ mol NaOH}}{1 \text{ mol } N_2O_5} = 0.5 \text{ mol}$$

با توجه به محاسبات انجام شده، در محلول اولیه ۰/۹ مول سدیم هیدروکسید (۰/۴ + ۰/۵) وجود داشته است. توجه داریم که سدیم هیدروکسید یک باز تک‌ظرفیتی بوده و هر واحد از آن با حل شدن در آب یک یون هیدروکسید تولید می‌کند؛ بنابراین می‌توان گفت در محلول اولیه ۰/۹ مول یون هیدروکسید وجود داشته است. حال غلظت یون هیدروکسید در محلول اولیه را محاسبه می‌کنیم:

$$\text{غلظت} = \frac{\text{مول}}{\text{حجم}} = \frac{0.9 \text{ mol}}{3 \text{ L}} = 0.3 \text{ mol.L}^{-1}$$

در قدم بعد، غلظت یون هیدروژن در محلول اولیه را محاسبه می‌کنیم:

$$[H^+] \times [OH^-] = 10^{-14} \Rightarrow [H^+] = \frac{10^{-14}}{[OH^-]} = \frac{10^{-14}}{0.3} = \frac{1}{3} \times 10^{-13} \text{ mol.L}^{-1}$$

در مرحله بعد برای محاسبه pH محلول داریم:

$$pH = -\log[H^+] = -\log \frac{1}{3} \times 10^{-13} = 13 + \log 3 = 13.5$$

با خنثی شدن کامل محلول، pH آن به ۷ می‌رسد؛ بنابراین تغییر pH محلول از ابتدا تا انتها برابر ۶/۵ واحد بوده است.

واکنش خنثی شدن اسید و باز




پاک‌کننده‌های صابونی و غیرصابونی، با مولکول‌ها و ذرات سازنده آلودگی‌ها وارد واکنش شیمیایی نشده و فقط براساس برهم‌کنش‌های بین ذره‌ای، سبب پاک‌شدن آلودگی‌ها می‌شوند. گروه دیگری از پاک‌کننده‌ها نیز وجود دارند که با ذرات سازنده آلودگی‌ها وارد واکنش شیمیایی شده و در کنار برهم‌کنش‌های بین ذره‌ای، از این طریق نیز سبب پاک‌شدن آلودگی‌ها می‌شوند. به این دسته از انواع شوینده‌ها، به اصطلاح پاک‌کننده‌های خورنده گفته می‌شود. در واقع، پاک‌کننده‌های خورنده، گروهی از پاک‌کننده‌ها هستند که بر مبنای واکنش میان اسیدها و بازها عمل می‌کنند.

محلول سفیدکننده ، محلول سود ، هیدروکلریک اسید → انواع پاک‌کننده‌های خورنده

واکنش خنثی‌شدن میان اسید و باز انجام می‌شود. در واقع در این واکنش، یون‌های هیدروژن تولیدشده از اسید با یون‌های هیدروکسید تولیدشده از باز واکنش می‌دهند. با توجه به مصرف شدن دو یون هیدروژن و هیدروکسید در این واکنش، فرایند یونش یا تفکیک یونی اسید و باز به‌طور کامل انجام می‌شود؛ پس قوی و ضعیف بودن اسید و باز، تأثیری بر فرایند خنثی شدن ندارد و این فرایند تنها به مول اسید و باز (n) و تعداد عوامل اسیدی و بازی موجود ساختار اسید و باز (a) بستگی دارد. بر این اساس، در رابطه با واکنش خنثی‌شدن داریم:

$$a_{\text{اسید}} \times n_{\text{اسید}} = a_{\text{باز}} \times n_{\text{باز}}$$

تعداد عوامل اسیدی یا همان ظرفیت اسید برابر تعداد هیدروژن‌های اسیدی است. تعداد عوامل بازی نیز در ساختار بازهای یونی برابر تعداد یون هیدروکسید موجود در آن ماده است. در رابطه با آمونیاک، ظرفیت باز برابر یک و ظرفیت بازی آمین‌ها نیز برابر شمار گروه‌های آمینی موجود در آن‌ها می‌باشد. تصویر زیر، نمایی از واکنش خنثی شدن اسید و باز را نشان می‌دهد:



بسته شبیه ساز کنکور

مارکوپولو منتشر شد!

✓ ۱۷ دوره کنکور سراسری از ۹۸ تا ۱۴۰۴؛ آپدیت شده و منطبق با

تفصیلات کنکور ۱۴۰۵

✓ پاسخنامه به سبک ماز؛ شامل بررسی دقیق گزینه‌ها، نکته‌ها،

جداول و گادرهای جمع‌بندی

✓ قابلیت تخمین رتبه و تراز کنکور سراسری؛ براساس نمرات

نهایی و درصدهای کنکور

✓ آزمون پیش‌بینی کنکور سراسری ۱۴۰۵ از نگاه طراحان ماز

✓ تحلیل پاسخنامه ویدیویی سؤالات کنکور توسط اساتید ماز

✓ بسته جامع آمادگی امتحانات نهایی خرداد ۱۴۰۵

• بانک کنکور به تفکیک درس به درس و مبحث به مبحث مناسب

دوران جمع‌بندی

• بانک کامل سؤالات شیمی و فیزیک کنکور تجربی مشترک با

رشته ریاضی



ثبت سفارش
از سایت مازمارکت
mazemarket.ir



اسکن کن!