


تعداد صفحه: ۳	مدت امتحان: ۱۲۰ دقیقه	رشته: ریاضی و فیزیک	سوالات امتحان شبه نهایی درس: حسابان ۱
نام و نام خانوادگی:	تاریخ امتحان: ۱۴۰۳/۲/۱	ساعت شروع: ۱۴ عصر	پایه یازدهم دوره دوم متوسطه نظری
مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش		دانش آموزان دبیرستان‌های دوره دوم متوسطه روزانه سراسر کشور در طرح سه نماسال ۱۴۰۳	
ردیف	سوالات (استفاده از ماشین حساب ساده بلامانع است)		
نمره			

۱	عبارت درست را با کلمه <u>درست</u> و عبارت نادرست را با کلمه <u>نادرست</u> مشخص کنید. الف) عدد $\sqrt{3} - 2\sqrt{2}$ برابر است با $\sqrt{2} - 1$. ب) توابع $f(x) = x$ و $g(x) = \sqrt{x^2}$ با هم برابر هستند. ج) توابع $f(x) = \log_2(x+1)$ و $g(x) = 2^{x+1}$ وارون هم هستند. د) مقدار $\sin 10^\circ$ عددی مثبت است.	۱
۱	جاهای خالی را با عبارت یا عدد مناسب پر کنید. الف) در نامعادله $ x-1 < 3$ ، مجموعه جواب بازه ----- است. ب) دامنه تابع $f(x) = \frac{x}{1-[x]}$ برابر است با ----- . ([] نماد جزء صحیح است) ج) اگر $0 < y < x$ ، آنگاه عدد 2^x از عدد 2^y ----- است. (بیشتر - کمتر) د) یک چندضلعی منتظم درون دایره‌ای به شعاع ۳ سانتیمتر محاط شده است. اگر تعداد اضلاع چندضلعی را افزایش دهیم مساحت آن به عدد ----- نزدیک می‌شود.	۲
۱	در دنباله حسابی، ۱۰، ۶، ۲ حداقل چند جمله اول آن را با هم جمع کنیم تا حاصل آن بیشتر از ۴۵۰ شود؟	۳
۱	اگر نمودار سهمی $y = ax^2 + bx + c$ به صورت زیر باشد، ضابطه سهمی را مشخص کنید. 	۴
۱/۲۵	معادله زیر را حل کنید: $\frac{1}{(x-2)^2} + \frac{2}{x-2} = 3$	۵
۱	فاصله نقطه $A(1, 0)$ از خط $x + y = k$ برابر $\sqrt{2}$ است. مقدار k را پیدا کنید.	۶

"ادامه سوالات در صفحه بعد"

ردیف	سؤالات (استفاده از ماشین حساب ساده بلامانع است)	نمره
سوالات امتحان شبه نهایی درس : حسابان ۱ رشته : ریاضی و فیزیک مدت امتحان: ۱۲۰ دقیقه تعداد صفحه: ۳ پایه یازدهم دوره دوم متوسطه نظری ساعت شروع : ۱۴ عصر تاریخ امتحان: ۱۴۰۳/۲/۱ نام و نام خانوادگی: دانش آموزان دبیرستان های دوره دوم متوسطه روزانه سراسر کشور در طرح سه نماسال ۱۴۰۳ مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش		
۷	نمودار تابع f را چنان رسم کنید که همه شرایط زیر را داشته باشد: الف) دامنه آن $[-۴, ۵]$ باشد، ب) به هر عدد کمتر از صفر، قدرمطلق آن را نسبت دهد، پ) به هر عدد در بازه $[۰, ۱]$ ، مربع آن را نسبت دهد، ت) در سایر نقاط دامنه ثابت باشد و $f(۵) = ۲$.	۱/۲۵
۸	اگر $f = \{(1, 2), (3, 4), (2, 5)\}$ و $g = \{(1, 0), (4, 0), (2, 3)\}$ الف) تابع $f + g$ را بنویسید. ب) دامنه تابع $\frac{f}{g}$ را بنویسید.	۱
۹	فرض کنیم $f(x) = \sqrt{4-x}$ و $g(x) = x^2 + 3$ الف) دامنه تابع $f \circ g$ را با استفاده از تعریف بدست آورید، ب) ضابطه تابع $f \circ g$ را به دست آورید.	۱/۵
۱۰	اگر $f(x) = \sqrt{x-3}$ ، مقدار $f^{-1}(2)$ را محاسبه کنید.	۰/۷۵
۱۱	اگر نمودار تابع $f(x) = 2 + \log_a x$ از نقطه $(\frac{1}{3}, -2)$ عبور کند، آن گاه مقدار a را به دست آورید.	۰/۷۵
۱۲	معادله $\log_3(x-1) + \log_3(\frac{x}{2} + 1) = 2$ را حل کنید.	۱/۲۵
۱۳	حاصل عبارت زیر را بیابید. $A = \log_3\left(\frac{9}{\sqrt[4]{27}}\right) + \log_{10} 1$	۱
۱۴	نمودار تابع $f(x) = 1 - \sin x $ را در بازه $[0, 2\pi]$ رسم کنید و برد آن را تعیین کنید.	۱
۱۵	اگر $\sin \alpha = \frac{4}{5}$ ، $\cos \beta = \frac{-12}{13}$ و α زاویه ای حاده و انتهای کمان روبرو به زاویه β در ربع سوم باشد، حاصل $\sin(\alpha - \beta)$ را بدست آورید.	۱/۲۵
۱۶	اگر $\sin \alpha = \frac{1}{5}$ ، حاصل عبارت $\sin(4\pi + \alpha) + \sin(\alpha - \pi) + 2 \cos(\frac{3\pi}{4} + \alpha)$ را بدست آورید.	۱/۲۵
"ادامه سوالات در صفحه بعد"		

تعداد صفحه: ۳	مدت امتحان: ۱۲۰ دقیقه	رشته: ریاضی و فیزیک	سوالات امتحان شبه نهایی درس: حسابان ۱
نام و نام خانوادگی:	تاریخ امتحان: ۱۴۰۳/۲/۱	ساعت شروع: ۱۴ عصر	پایه یازدهم دوره دوم متوسطه نظری


مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش
دانش آموزان دبیرستان‌های دوره دوم متوسطه روزانه سراسر کشور در طرح سه نماسال ۱۴۰۳

ردیف	سوالات (استفاده از ماشین حساب ساده بلامانع است)	نمره
------	---	------

۱۷	مقدار $\sin(۲۲/۵^\circ)$ را محاسبه کنید.	۰/۷۵
----	--	------

۱۸	تابع f با ضابطه $f(x) = \frac{[x]-۲}{x-۲}$ را در نظر بگیرید. با کامل کردن جدول زیر، مقدار $\lim_{x \rightarrow ۲^+} f(x)$ را در صورت وجود به دست آورید. ([] نماد جزء صحیح است)	۱										
	<table border="1"> <tr> <td>x</td> <td>۲/۱</td> <td>۲/۰۱</td> <td>۲/۰۰۱</td> <td>$\longrightarrow ۲$</td> </tr> <tr> <td>$f(x)$</td> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>?</td> </tr> </table>	x	۲/۱	۲/۰۱	۲/۰۰۱	$\longrightarrow ۲$	$f(x)$?	
x	۲/۱	۲/۰۱	۲/۰۰۱	$\longrightarrow ۲$								
$f(x)$?								

۱۹	<p>نمودار تابع f به صورت زیر است.</p> <p>الف) دامنه این تابع شامل همسایگی محذوف کدام نقطه است؟</p> <p>ب) حدود زیر را در صورت وجود باید. ([] نماد جزء صحیح است)</p> <p>(۱) $\lim_{x \rightarrow -۲^+} [f(x)]$</p> <p>(۲) $\lim_{x \rightarrow ۱^-} f(x)$</p> <p>(۳) $\lim_{x \rightarrow -۲} f(x)$</p>	۱
----	--	---



۲۰	موفق و پیروز باشید.	جمع نمره
----	---------------------	----------

مدت امتحان: ۱۲۰ دقیقه		ساعت شروع: ۱۴		رشته: ریاضی و فیزیک		راهنمای تصحیح امتحان شبه نهایی درس: حسابان ۱	
تاریخ امتحان: ۱۴۰۳/۲/۱				پایه یازدهم ریاضی دوره دوم متوسطه نظری			
مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش http://aee.medu.gov.ir				دانش آموزان دبیرستان‌های دوره دوم متوسطه روزانه سراسر کشور در طرح سه نماسال ۱۴۰۳			
ردیف	راهنمای تصحیح						نمره
۱	الف) درست (۰/۲۵)	(مشابه کار در کلاس ۲ صفحه ۱۹ کتاب)		ب) نادرست (۰/۲۵)	(مشابه کار در کلاس صفحه ۴۱ کتاب)		۱
	ج) نادرست (۰/۲۵)	(مشابه توضیحات صفحه ۸۱ کتاب)		د) نادرست (۰/۲۵)	(مشابه توضیحات صفحه ۹۳ کتاب)		
۲	الف) $-2 < x < 4$ (۰/۲۵)	(مشابه فعالیت صفحه ۲۵)		ب) $R - [1, 2)$ یا $(-\infty, 1) \cup [2, +\infty)$ (۰/۲۵)	(مفاهیم پایه و مشابه صفحه ۵۱)		۱
	ج) بیشتر (۰/۲۵)	(مشابه کار در کلاس صفحه ۷۷)		د) 9π (۰/۲۵)	(مشابه فعالیت صفحه ۱۱۴)		
۳	$S_n > 450 \rightarrow \frac{n}{2} [2(2) + 4(n-1)] > 450 \rightarrow 2n^2 > 450 \rightarrow n^2 > 225 \rightarrow n > 15$ <p style="text-align: center;">(نمره ۰/۲۵) (نمره ۰/۵)</p> <p>حداقل ۱۶ جمله را باید با هم جمع کنیم. (نمره ۰/۲۵)</p> <p>(مشابه تمرین ۵ صفحه ۶ کتاب)</p>						۱
۴	<p>۲ و ۴ صفرهای تابع هستند.</p> $y = a(x-2)(x-4) \xrightarrow{(0,2)} 2 = a(0-2)(0-4) \rightarrow a = \frac{1}{4}$ <p style="text-align: center;">(نمره ۰/۲۵) (نمره ۰/۲۵) (نمره ۰/۲۵)</p> $y = \frac{1}{4}(x-2)(x-4) \rightarrow y = \frac{1}{4}x^2 - \frac{3}{2}x + 2$ <p style="text-align: center;">(نمره ۰/۲۵)</p> <p>(مشابه مثال صفحه ۱۱ کتاب)</p> <p style="color: red;">به راه حل درست دیگر نمره به تناسب تعلق گیرد.</p>						۱
۵	$t = \frac{1}{x-2} \rightarrow t^2 + 2t - 3 = 0 \rightarrow t = -3, 1$ <p style="text-align: center;">(نمره ۰/۲۵) (نمره ۰/۵)</p> $\frac{1}{x-2} = -3 \rightarrow x = \frac{5}{3}$ <p style="text-align: center;">(نمره ۰/۲۵)</p> $\frac{1}{x-2} = 1 \rightarrow x = 3$ <p style="text-align: center;">(نمره ۰/۲۵)</p> <p>(مشابه کار در کلاس صفحه ۱۹ کتاب)</p> <p style="color: red;">به راه حل درست دیگر نمره به تناسب تعلق گیرد.</p>						۱/۲۵

راهنمای تصحیح امتحان شبه نهایی درس: حسابان ۱		رشته: ریاضی و فیزیک	ساعت شروع: ۱۴	مدت امتحان: ۱۲۰ دقیقه
پایه یازدهم ریاضی دوره دوم متوسطه نظری		تاریخ امتحان: ۱۴۰۳/۲/۱		
دانش آموزان دبیرستان‌های دوره دوم متوسطه روزانه سراسر کشور در طرح سه نماسال ۱۴۰۳		مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش http://aee.medu.gov.ir		
ردیف	راهنمای تصحیح	نمره		
	(مشابه مثال صفحه ۶۸ کتاب)			
۱۰	$\underbrace{2 = \sqrt{x-3}}_{(نمره ۰/۵)} \rightarrow \underbrace{x-3 = 4}_{(نمره ۰/۲۵)} \rightarrow x = 7$ <p>(مشابه توضیحات صفحه ۵۸ کتاب)</p> <p>به راه حل درست دیگر نمره به تناسب تعلق گیرد.</p>	۰/۷۵		
۱۱	$\underbrace{\frac{1}{3} \rightarrow -2 = 2 + \log_a \frac{1}{3}}_{(نمره ۰/۲۵)} \rightarrow \underbrace{\log_a \frac{1}{3} = -4}_{(نمره ۰/۲۵)} \rightarrow a^{-4} = \frac{1}{3} \rightarrow a = \sqrt[4]{3}$ <p>(مشابه توضیحات صفحه ۸۳ کتاب)</p> <p>به راه حل درست دیگر نمره به تناسب تعلق گیرد.</p>	۰/۷۵		
۱۲	$\log_3(x-1) + \log_3\left(\frac{x}{3} + 1\right) = 2 \rightarrow (x-1)\left(\frac{x}{3} + 1\right) = 3^2 \quad (نمره ۰/۵)$ $\rightarrow \frac{x^2}{3} + \frac{x}{3} - 1 = 9 \rightarrow x^2 + x - 20 = 0 \rightarrow \underbrace{x = 4}_{(نمره ۰/۲۵)} \text{ ق ق } , \underbrace{x = -5}_{(نمره ۰/۵)}$ <p>(مشابه فعالیت صفحه ۸۸ کتاب)</p>	۱/۲۵		
۱۳	$\frac{9}{\sqrt[4]{27}} = \frac{3^2}{3^{2/4}} = 3^{5/4} \quad (نمره ۰/۲۵)$ $A = \log_3 \frac{9}{\sqrt[4]{27}} + \log_3 0.01 = \underbrace{\frac{5}{4}}_{(نمره ۰/۲۵)} + \underbrace{(-3)}_{(نمره ۰/۲۵)} = -\frac{7}{4} \quad (نمره ۰/۲۵)$ <p>(مشابه کار در کلاس صفحه ۸۷ و تمرین ۵ صفحه ۹۰ کتاب)</p> <p>به راه حل درست دیگر نمره به تناسب تعلق گیرد.</p>	۱		

مدت امتحان: ۱۲۰ دقیقه	ساعت شروع: ۱۴	رشته: ریاضی و فیزیک	راهنمای تصحیح امتحان شبه نهایی درس: حسابان ۱
تاریخ امتحان: ۱۴۰۳/۲/۱		پایه یازدهم ریاضی دوره دوم متوسطه نظری	
مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش http://aee.medu.gov.ir		دانش آموزان دبیرستان های دوره دوم متوسطه روزانه سراسر کشور در طرح سه نماسال ۱۴۰۳	
نمره	راهنمای تصحیح		ردیف
۱	<p style="text-align: right;">رسم هر نمودار (۰/۲۵) نمره</p> <p style="text-align: right;">$R = [0, 1]$ (نمره ۰/۲۵)</p> <p style="text-align: right;">در صورتی که نمودار نهایی به درستی رسم شده است، ۰/۲۵ نمره کامل تعلق گیرد.</p> <p style="text-align: right;">(مشابه تمرین ۱ و ۲ صفحه ۱۰۹ کتاب)</p>		۱۴
۱/۲۵	$\sin \alpha = \frac{4}{5} \xrightarrow{\text{حاده } \alpha} \cos \alpha = \sqrt{1 - \left(\frac{4}{5}\right)^2} = \frac{3}{5} \quad (\text{نمره } ۰/۲۵)$ $\cos \beta = -\frac{12}{13} \xrightarrow{\text{در ربع سوم } \beta} \sin \beta = -\sqrt{1 - \left(-\frac{12}{13}\right)^2} = -\frac{5}{13} \quad (\text{نمره } ۰/۵)$ $\sin(\alpha - \beta) = \sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta \quad (\text{نمره } ۰/۲۵)$ $= \left(\frac{4}{5}\right)\left(-\frac{12}{13}\right) - \left(\frac{3}{5}\right)\left(-\frac{5}{13}\right) = \frac{-48 + 15}{65} = \frac{-33}{65} \quad (\text{نمره } ۰/۲۵)$ <p style="text-align: right;">(مشابه مثال صفحه ۶۸ کتاب)</p> <p style="text-align: right;">به راه حل درست دیگر نمره به تناسب تعلق گیرد</p>		۱۵

مدت امتحان: ۱۲۰ دقیقه	ساعت شروع: ۱۴	رشته: ریاضی و فیزیک	راهنمای تصحیح امتحان شبه نهایی درس: حسابان ۱									
تاریخ امتحان: ۱۴۰۳/۲/۱		پایه یازدهم ریاضی دوره دوم متوسطه نظری										
مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش http://aee.medu.gov.ir		دانش آموزان دبیرستان های دوره دوم متوسطه روزانه سراسر کشور در طرح سه نماسال ۱۴۰۳										
نمره	راهنمای تصحیح			ردیف								
۱/۲۵	$\sin(\alpha - \pi) = -\sin(\pi - \alpha) = -\sin \alpha \quad (\text{نمره } ۰/۲۵)$ $\cos\left(\frac{3\pi}{2} + \alpha\right) = \cos\left(\pi + \frac{\pi}{2} + \alpha\right) = -\cos\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) = \sin \alpha \quad (\text{نمره } ۰/۲۵)$ $\sin(4\pi + \alpha) + \sin(\alpha - \pi) + 2\cos\left(\frac{3\pi}{2} + \alpha\right) = \underbrace{\sin \alpha}_{(\text{نمره } ۰/۲۵)} - \sin \alpha + 2 \sin \alpha = \underbrace{2 \sin \alpha}_{(\text{نمره } ۰/۲۵)}$ $= \frac{2}{5} \quad (\text{نمره } ۰/۲۵)$			۱۶								
۰/۷۵	$\cos 45^\circ = 1 - 2 \sin^2 22/5^\circ \quad (\text{نمره } ۰/۲۵)$ $\rightarrow \frac{\sqrt{2}}{2} = 1 - 2 \sin^2 22/5^\circ \quad (\text{نمره } ۰/۲۵)$ $\rightarrow \sin 22/5^\circ = \frac{\sqrt{2-\sqrt{2}}}{2} \quad (\text{نمره } ۰/۲۵)$			۱۷								
(مشابه تمرین ۲ صفحه ۱۱۲ کتاب)												
به راه حل درست دیگر نمره به تناسب تعلق گیرد.												
۱	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>x</td> <td>۲/۱</td> <td>۲/۰۱</td> <td>۲/۰۰۱</td> <td>$\rightarrow 2$</td> </tr> <tr> <td>$f(x)$</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> </tr> </table>	x	۲/۱	۲/۰۱	۲/۰۰۱	$\rightarrow 2$	$f(x)$	۰	۰	۰	۰	۱۸
x	۲/۱	۲/۰۱	۲/۰۰۱	$\rightarrow 2$								
$f(x)$	۰	۰	۰	۰								
هر جای خالی (نمره ۰/۲۵)												
(مشابه تمرین ۲ صفحه ۱۲۱ کتاب)												
۱	<p style="text-align: center;">(الف) ۱</p> <p style="text-align: center;">(ب)</p> <p style="text-align: center;">(۱) ۳ (۲) ۱ (۳) وجود ندارد</p>			۱۹								
هر مورد (نمره ۰/۲۵)												
(مشابه تمرین ۶ صفحه ۱۲۹ کتاب)												
با آرزوی موفقیت در پناه مهربان دانا برای شما همکار محترم												